



Biro Pengawasan Farmaseutikal Kebangsaan
National Pharmaceutical Control Bureau
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

Ruj.Kami : (100) dlm.BPFK/17/FV/4-34
Tarikh : 31 JAN 2012

AstraZeneca Sdn Bhd
Level 12, Surian Tower,
1, Jalan PJU 7/3,
Mutiara Damansara,
47810 Petaling Jaya,
Selangor.

Tuan/Puan,

RISALAH MAKLUMAT UBAT PENGGUNA (RiMUP)

1. NAMA PRODUK: Seperti Di Lampiran A

Saya merujuk kepada perkara diatas.

2. Semakan telah dibuat bagi draf Risalah Maklumat Ubat Pengguna (RiMUP) untuk ubat-ubat seperti yang dilampirkan dan didapati risalah ini mematuhi garis panduan yang ditetapkan dan boleh digunakan.
3. Pihak tuan/puan perlu mengemukakan permohonan variasi bagi mengemaskini RiMUP melalui sistem QUEST dan melampirkan surat kelulusan ini dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat ini.

Sekian Terima Kasih

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(ROKIAH ISAHAK)

Ketua Penolong Pengarah Kanan
Seksyen Farmakovigilans
b.p. Timbalan Pengarah
Pusat Pasca Pendaftaran Produk
Biro Pengawasan Farmaseutikal Kebangsaan
Kementerian Kesihatan Malaysia

sk. Ketua Seksyen Variasi



Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan
National Pharmaceutical Control Bureau
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

LAMPIRAN A

BIL	NAMA PRODUK	NO. PENDAFTARAN
1	Tenoret 50	MAL19871033A
2	Plendil 2.5mg	MAL19940655A
3	Plendil 5mg	MAL19972986A
4	Plendil 10mg	MAL19972985A
5	Tenoretic	MAL19871032A
6	Crestor 5mg	MAL20051356AR
7	Crestor 10mg	MAL20041089AR
8	Crestor 20mg	MAL20051357AR
9	Nexium MUPS 20mg	MAL20020238AR
10	Nexium MUPS 40mg	MAL20020239AR
11	Oxis Turbuhaler 4.5mcg/dos	MAL19991002A
12	Oxis Turbuhaler 9mcg/dos	MAL19991003A
13	Tenormin 50mg	MAL19870055AR
14	Tenormin 100mg	MAL19870056AR
15	Seroquel XR Extended Release Tablet 50mg	MAL09011462A
16	Seroquel XR Extended Release Tablet 200mg	MAL09011463A
17	Seroquel XR Extended Release Tablet 300mg	MAL09011464A
18	Seroquel XR Extended Release Tablet 400mg	MAL09011465A
19	Losex MUPS 10mg Tablet	MAL19992064A
20	Losex MUPS 20mg Tablet	MAL19992065A
21	Bricanyl Turbuhaler 0.5mg/dose	MAL19900213A
22	Rhinocort Aqua 64mcg/dos	MAL20000013A

PATIENT INFORMATION LEAFLET

Tenormin tablet 50mg, 100mg

atenolol

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.
- If any of the side effects get serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

What Tenormin is used for

Tenormin is used to:

- Treat high blood pressure (hypertension).
- Treat uneven heart beats (arrhythmias).
- Help prevent chest pain (angina).
- Protect the heart in the early treatment after a heart attack (myocardial infarction).

How Tenormin works

Tenormin contains a medicine called atenolol. This belongs to a group of medicines called beta-blockers. It works by making your heart beat more slowly and with less force.

Before you take Tenormin

When you must not take it

Do not take Tenormin if:

- You are allergic (hypersensitive) to atenolol or any of the other ingredients of Tenormin 50 mg & 100mg Tablets.
- You have ever had any of the following heart problems:
 - heart failure which is not under control (this usually makes you breathless and causes your ankles to swell)
 - second- or third-degree heart block (a condition which may be treated by a pacemaker)
 - very slow or very uneven heart beats, very low blood pressure or very poor circulation.
- You have a tumour called phaeochromocytoma that is not being treated. This is usually near your kidney and can cause high blood pressure. If you are being treated for phaeochromocytoma, your doctor will give you another medicine, called an alpha-blocker, to take as well as Tenormin.
- You have been told that you have higher than normal levels of acid in your blood (metabolic acidosis).

Do not take Tenormin if any of the above apply to you. If you are not sure, talk to your doctor or pharmacist before taking Tenormin.

Before you start to take it

Check with your doctor or pharmacist before taking Tenormin if:

- You have asthma, wheezing or any other similar breathing problems, or you get allergic reactions, for example to insect stings. If you have ever had asthma or wheezing, do not take this medicine without first checking with your doctor.
- You have a type of chest pain (angina) called Prinzmetal's angina.
- You have poor blood circulation or controlled heart failure.
- You have first-degree heart block.
- You have diabetes. Your medicine may change how you respond to having low blood sugar. You may feel your heart beating faster.
- You have thyrotoxicosis (a condition caused by an overactive thyroid gland). Your medicine may hide the symptoms of thyrotoxicosis.
- You have problems with your kidneys. You may need to have some check-ups during your treatment.

If you are not sure if any of the above apply to you, talk to your doctor or pharmacist before taking Tenormin.

Taking other medicines

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking, or have recently taken, any other medicines. This includes medicines that you buy without a prescription and herbal medicines. This is because Tenormin can affect the way some other medicines work and some medicines can have an effect on Tenormin.

In particular, tell your doctor if you are taking any of the following medicines:

- Clonidine (for high blood pressure or migraine). If you are taking clonidine and Tenormin together, do not stop taking clonidine unless your doctor tells you to do so. If you have to stop taking clonidine, your doctor will give you careful instructions about how to do it.
- Verapamil, diltiazem and nifedipine (for high blood pressure or chest pain).
- Disopyramide, quinidine or amiodarone (for an uneven heart beat).
- Digoxin (for heart problems).
- Adrenaline, also known as epinephrine (a medicine that stimulates the heart).
- Ibuprofen or indometacin (for pain and inflammation).
- Insulin or medicines that you take by mouth for diabetes.
- Medicines to treat nose or sinus congestion or other cold remedies (including those you can buy in the pharmacy).

How to take Tenormin

How much to take

Adults

- High blood pressure (hypertension): the usual dose is 50 mg to 100 mg a day.
- Chest pain (angina): the usual dose is 100 mg a day or 50 mg twice a day.
- Uneven heart beats (arrhythmias): the usual dose is 50 mg to 100 mg a day.
- The early treatment of a heart attack (myocardial infarction): the usual dose is 50 mg to 100 mg a day.

Elderly people

If you are an elderly person, your doctor may decide to give you a lower dose, particularly if you have problems with your kidneys.

People with severe kidney problems

If you have severe kidney problems your doctor may decide to give you a lower dose.

Children

Your medicine must not be given to children.

When to take it

Always take Tenormin exactly as your doctor has told you. You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

- Your doctor will tell you how many tablets to take each day and when to take them. Read the label on the carton to remind you what the doctor said.
- Swallow your Tenormin tablet whole with a glass of water.
- Try to take your tablet at the same time each day.

How long to take it

Do not stop taking Tenormin without talking to your doctor. In some cases, you may need to stop taking it gradually.

If you forget to take it

If you forget to take a dose, take it as soon as you remember. However, if it is almost time for the next dose, skip the missed dose. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

If you take too much (overdose)

If you take more Tenormin than prescribed by your doctor, talk to a doctor or go to a hospital straight away. Take the medicine pack with you so that the tablets can be identified.

While you are using Tenormin

Things you must do

Continue taking your medication as advised by your doctor or pharmacist.

Things you must not do

Do not stop taking your medication unless instructed by your doctor or pharmacist.

Things to be careful of

Operations

If you go into hospital to have an operation, tell the anaesthetist or medical staff that you are taking Tenormin. This is because you can get low blood pressure (hypotension) if you are given certain anaesthetics while you are taking Tenormin.

Pregnancy and breast-feeding

Talk to your doctor before taking Tenormin if you are pregnant, may become pregnant or are breast-feeding.

Driving and using machines

Your medicine is not likely to affect you being able to drive or use any tools or machines. However, it is best to wait to see how your medicine affects you before trying these activities.

If you feel dizzy or tired when taking this medicine, do not drive or use any tools or machines.

Important information about some of the ingredients of Tenormin

Tenormin 50 mg & 100mg Tablets contain Sunset Yellow Lake (E110). This may cause allergic reactions.

Side effects

Like all medicines, Tenormin can cause side effects, although not everybody gets them.

Allergic reactions:

If you have an allergic reaction, see a doctor straight away. The signs may include raised lumps on your skin (weals), or swelling of your face, lips, mouth, tongue or throat.

Other possible side effects:

Common (affects less than 1 in 10 people)

- You may notice that your pulse rate becomes slower while you are taking the tablets. This is normal, but if you are concerned please tell your doctor about it.
- Cold hands and feet.
- Diarrhoea.
- Feeling sick (nausea).
- Feeling tired.

Uncommon (affects less than 1 in 100 people)

- Disturbed sleep.

Rare (affects less than 1 in 1,000 people)

- Heart block (which can cause dizziness, abnormal heart beat, tiredness or fainting).
- Numbness and spasm in your fingers which is followed by warmth and pain (Raynaud's disease).
- Mood changes.
- Nightmares.
- Feeling confused.
- Changes in personality (psychoses) or hallucinations.
- Headache.
- Dizziness (particularly when standing up).
- Tingling of your hands.
- Being unable to get an erection (impotence).
- Dry mouth.
- Dry eyes.
- Disturbances of vision.
- Thinning of your hair.
- Skin rash.
- Reduced numbers of platelets in your blood (this may make you bruise more easily).
- Purplish marks on your skin.
- Jaundice (causing yellowing of your skin or the whites of your eyes).

Very rare (affects less than 1 in 10,000 people)

- Changes to some of the cells or other parts of your blood. Your doctor may take blood samples every so often to check whether Tenormin has had any effect on your blood.

Conditions that may get worse

If you have any of the following conditions, they may get worse when you start to take your medicine. This happens rarely affecting less than 1 in 1,000 people.

- Psoriasis (a skin condition characterised by itchy scales).
- Being short of breath or having swollen ankles (if you have heart failure).
- Asthma or breathing problems.
- Poor circulation.

Do not be concerned by this list of side effects. You may not get any of them. If any of the side effects get serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

Storage and Disposal of Tenormin

Keep your medicine in a safe place where children cannot see or reach it. Your medicine could harm them.

Do not store above 25°C. Store your tablets in the original package. Keep the blister strip in the carton. This will protect your medicine from light and moisture.

Do not use your tablets after the expiry date which is stated on the blister strip and carton. The expiry date refers to the last day of that month.

Product description

Tenormin 50 mg Tablets are orange. They are scored down the middle on one side. They come in packs (blister strips) containing 28 tablets.

Tenormin 100 mg Tablets are orange. They come in packs (blister strips) containing 28 tablets.

Ingredients

The active substance is atenolol. Each tablet contains 50 mg or 100mg (milligrams) of atenolol.

The other ingredients are gelatin (bovine source), magnesium carbonate, magnesium stearate, methylhydroxypropylcellulose, sodium laurilsulfate, maize starch, titanium dioxide (E171), Macrogol, Sunset Yellow Lake (E110) and talc.

Malaysian registration numbers:

Tenormin 50mg: MAL19870055AR

Tenormin 100mg: MAL19870056AR

Manufacturer

AstraZeneca UK Limited, Macclesfield, Cheshire, United Kingdom

Date of revision

The text was revised in August 2011

CV.000-676-467.2.0

RISALAH MAKLUMAT UNTUK PESAKIT

Tablet Tenormin 50mg, 100mg

atenolol

Bacalah seluruh risalah ini dengan teliti sebelum anda mula menggunakan ubat ini.

- Simpan risalah ini. Anda mungkin perlu membacanya lagi.
- Jika anda ragu-ragu, tanyalah doktor atau ahli farmasi.
- Ubat ini dipreskripsikan untuk anda. Jangan beri orang lain. Ubat ini boleh memudaratkan mereka, walaupun simptom mereka sama seperti simptom anda.
- Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda perhatikan kesan sampingan yang tidak tersenarai di dalam risalah ini, beritahulah doktor atau ahli farmasi.

Kegunaan Tenormin

Tenormin digunakan untuk:

- Merawat tekanan darah yang tinggi (hipertensi).
- Merawat degupan jantung yang tidak sekata (aritmia).
- Mencegah sakit dada (angina).
- Melindungi jantung dalam rawatan awal selepas serangan jantung (penginfarkan miokardium).

Cara Tenormin bertindak

Tenormin mengandungi sejenis ubat yang digelar atenolol. Ubat ini tergolong dalam kumpulan ubat yang digelar penyekat beta. Ubat ini bertindak dengan mengurangkan kelajuan dan kekuatan degupan jantung.

Sebelum anda memakan Tenormin

Larangan menggunakan ubat ini

Jangan makan Tenormin jika:

- Anda alah (hipersensitif) terhadap atenolol atau terhadap mana-mana ramuan tablet Tenormin 50 mg & 100 mg yang lain.
- Jika anda pernah mengalami mana-mana masalah jantung yang berikut:
 - kegagalan jantung yang tidak dapat dikawal (ini biasanya akan menyebabkan sesak nafas dan bengkak pada pergelangan kaki)
 - sekat jantung tahap kedua atau ketiga (masalah yang boleh dirawat dengan perentak jantung)
 - degupan jantung yang sangat perlahan atau yang sangat tidak sekata, tekanan darah yang sangat rendah atau peredaran darah yang sangat buruk
- Anda mempunyai tumor yang digelar feokromositoma yang tidak dirawat. Tumor ini biasanya tumbuh berhampiran ginjal dan boleh menyebabkan tekanan darah yang tinggi. Jika anda dirawat kerana mempunyai feokromositoma, doktor akan memberi anda suatu ubat lain yang digelar penyekat alfa untuk dimakan selain Tenormin.
- Anda diberitahu bahawa aras asid di dalam darah anda lebih tinggi daripada aras normal (asidosis metabolik).

Jangan makan Tenormin jika anda mengalami mana-mana masalah tadi. Jika anda kurang pasti, bincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum memakan Tenormin.

Sebelum anda mula menggunakannya

Minta nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum memakan Tenormin jika:

- Anda menghidap asma, nafas berdehit atau masalah pernafasan yang lain seumpamanya, atau anda mengalami tindak balas alergi, misalnya terhadap sengat serangga. Jika anda pernah menghidap asma atau nafas berdehit, jangan makan ubat ini tanpa menanya doktor dahulu.
- Anda mengalami sejenis sakit dada (angina) yang digelar angina Prinzmetal.
- Anda mengalami peredaran darah yang kurang baik atau kegagalan jantung yang terkawal.
- Anda menghidap sekat jantung tahap pertama.
- Anda menghidap diabetes. Ubat anda mungkin mengubah gerak balas anda terhadap gula darah yang rendah. Anda mungkin merasakan bahawa jantung anda berdegup dengan lebih pantas.
- Anda menghidap tirotoksikosis (sejenis penyakit yang disebabkan oleh gelenjar tiroid yang terlebih aktif). Ubat anda mungkin akan menyembunyikan simptom-simptom tirotoksikosis.
- Anda mengalami masalah pada ginjal. Anda mungkin perlu menjalani beberapa pemeriksaan semasa tempoh rawatan anda.

Jika anda kurang pasti sama ada anda mengalami mana-mana masalah tadi, bincanglah dengan doktor atau ahli farmasi sebelum memakan Tenormin.

Menggunakan ubat lain

Beritahu doktor anda atau ahli farmasi jika anda sedang atau baru-baru ini telah memakan ubat lain. Ini merangkumi ubat yang anda beli tanpa preskripsi dan juga ubat-ubatan herba. Ini kerana Tenormin boleh menjejaskan tindakan sesetengah jenis ubat dan sesetengah jenis ubat boleh menjejaskan tindakan Tenormin.

Khususnya, beritahulah doktor jika anda memakan mana-mana ubat yang berikut:

- Clonidine (untuk merawat tekanan darah tinggi atau migrain). Jika anda memakan clonidine bersama-sama Tenormin, jangan berhenti memakan clonidine melainkan diarahkan oleh doktor. Jika anda perlu berhenti memakan clonidine, doktor akan memberi anda arahan yang teliti tentang cara berhenti.
- Verapamil, diltiazem dan nifedipine (untuk merawat tekanan darah tinggi atau sakit dada).
- Disopyramide, quinidine atau amiodarone (untuk merawat degupan jantung yang tidak sekata).
- Digoxin (untuk merawat masalah jantung).
- Adrenaline, juga digelar epinephrine (sejenis ubat yang merangsang jantung).
- Ibuprofen atau indometacin (untuk merawat rasa sakit dan radang).
- Insulin atau ubat yang anda makan untuk merawat diabetes.
- Ubat untuk merawat hidung atau sinus yang tersumbat atau penawar selesema yang lain (termasuk ubat yang boleh anda beli di farmasi).

Cara memakan Tenormin

Jumlah yang perlu dimakan

Orang dewasa

- Tekanan darah yang tinggi (hipertensi): dos yang biasanya diberikan ialah 50 mg hingga 100 mg sekali sehari.
- Sakit dada (angina): Dos yang biasanya diberikan ialah 100 mg sekali sehari atau 50 mg dua kali sehari.
- Degupan jantung yang tidak sekata (aritmia): dos yang biasanya diberikan ialah 50 mg hingga 100 mg sekali sehari.

- Rawatan awal serangan jantung (penginfarkan miokardium): dos yang biasanya diberikan ialah 50 mg hingga 100 mg sekali sehari.

Warga emas

Jika anda sudah berusia lanjut, doktor mungkin akan menetapkan dos yang lebih rendah, terutamanya jika anda mengalami masalah pada ginjal (buah pinggang).

Pesakit yang mempunyai masalah yang teruk pada ginjal

Jika anda ada masalah yang teruk pada ginjal, doktor mungkin akan menetapkan dos yang lebih rendah.

Kanak-kanak

Ubat ini tidak boleh diberikan kepada kanak-kanak.

Waktu memakannya

Makanlah Tenormin tepat-tepat seperti yang diarahkan oleh doktor. Tanyalah doktor atau ahli farmasi jika anda kurang pasti.

- Doktor akan memberitahu anda bilangan tablet yang perlu anda makan setiap hari dan waktu memakannya. Bacalah label pada karton untuk mengingatkan diri anda tentang kata-kata doktor.
- Telan tablet Tenormin bulat-bulat dengan segelas air.
- Cubalah memakan ubat anda pada masa yang sama setiap hari.

Tempoh menggunakan ubat ini

Jangan berhenti memakan Tenormin tanpa berbincang dengan doktor. Dalam keadaan yang tertentu, anda perlu berhenti memakan ubat ini secara beransur-ansur.

Jika anda terlupa memakannya

Jika anda terlupa memakan satu dos, makanlah sebaik sahaja anda ingat. Walau bagaimanapun, jika waktunya sudah hampir dengan waktu dos yang seterusnya, abaikan sahaja dos yang tertinggal itu. Jangan makan dua dos untuk menggantikan dos yang terlupa dimakan itu.

Jika anda memakan terlalu banyak (terlebih dos)

Jika anda telah memakan lebih banyak Tenormin daripada yang diarahkan oleh doktor, beritahu doktor atau pergi ke hospital dengan segera. Bawa pek ubat ini bersama-sama anda supaya tablet tersebut boleh dikenal pasti.

Semasa anda memakan Tenormin

Perkara-perkara yang mesti anda lakukan

Teruskan memakan ubat ini seperti yang telah diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi.

Perkara-perkara yang tidak boleh anda lakukan

Jangan berhenti memakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi.

Perkara-perkara yang perlu anda awasi

Pembedahan

Jika anda dimasukkan ke hospital untuk menjalani pembedahan, beritahu pakar anestesia (pakar bius) atau kakitangan perubatan bahawa anda memakan Tenormin. Ini kerana anda boleh

mengalami tekanan darah yang rendah (hipotensi) jika anda diberi ubat anestetik yang tertentu sementara anda masih memakan Tenormin.

Kehamilan dan menyusukan anak dengan susu badan

Beritahu doktor sebelum anda memakan Tenormin jika anda hamil, bercadang untuk menjadi hamil, atau sedang menyusukan anak dengan susu badan.

Memandu dan mengendalikan jentera

Ubat ini tidak dijangka akan menjejaskan keupayaan anda memandu mahupun mengendalikan apa-apa alat atau jentera. Walau bagaimanapun, sebaik-baiknya tunggulah dan perhatikan dahulu kesan ubat ini terhadap anda sebelum anda cuba melakukannya.

Jika anda berasa pening atau penat apabila memakan ubat ini, jangan pandu kenderaan dan jangan kendalikan apa-apa alat atau jentera.

Maklumat penting tentang beberapa ramuan Tenormin

Tablet Tenormin 50 mg & 100mg mengandungi Sunset Yellow Lake (E110). Ini boleh menyebabkan tindak balas alergi.

Kesan sampingan

Sama seperti semua ubat lain, Tenormin boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidaklah semua orang akan mengalaminya.

Tindak balas alergi:

Jika anda mengalami tindak balas alergi, pergilah berjumpa doktor dengan segera. Tanda-tandanya mungkin berupa benjol-benjol pada kulit (bilur), atau bengkak pada muka, bibir, mulut, lidah atau tekak.

Kesan-kesan sampingan lain yang boleh berlaku:

Lazim berlaku (menjejaskan kurang daripada 1 dalam 10 orang)

- Anda mungkin mendapati bahawa kadar nadi anda bertambah perlahan semasa anda memakan tablet ini. Ini normal, tetapi jika anda bimbang, beritahu doktor.
- Tangan dan kaki terasa sejuk.
- Cirit-birit.
- Loya.
- Berasa letih.

Tidak lazim berlaku (menjejaskan kurang daripada 1 dalam 100 orang)

- Tidur tidak nyenyak.

Jarang-jarang sekali berlaku (menjejaskan kurang daripada 1 dalam 1,000 orang)

- Sekat jantung (yang boleh menyebabkan pening, degupan jantung yang abnormal, rasa letih atau pitam).
- Rasa kebas dan spasma pada jari, diikuti dengan rasa panas dan sakit (penyakit Raynaud).
- Perubahan ragam angin.
- Mengigau.
- Berasa keliru.
- Perubahan personaliti (psikosis) atau halusinasi.
- Sakit kepala.
- Pening (terutamanya apabila bangun untuk berdiri).
- Rasa gelenyar pada tangan.

- Tidak boleh mencapai ereksi (mati pucuk).
- Mulut kering.
- Mata kering.
- Gangguan penglihatan.
- Rambut semakin jarang.
- Ruam pada kulit.
- Bilangan platelet dalam darah berkurangan (ini boleh membuatkan anda lebih mudah mendapat lebam).
- Tanda keungu-unguan pada kulit.
- Jaundis (menyebabkan kulit atau putih mata menjadi kuning).

Sangat jarang-jarang sekali berlaku (menjejaskan kurang daripada 1 dalam 10,000 orang)

- Perubahan pada sesetengah sel darah atau bahagian lain darah. Doktor mungkin akan kerap mengambil sampel darah untuk memastikan sama ada Tenormin ada kesan terhadap darah anda.

Penyakit yang boleh melarat

Jika anda menghidap mana-mana penyakit yang berikut, penyakit anda itu mungkin melarat apabila anda mula memakan ubat ini. Ini jarang-jarang sekali berlaku dan menjejaskan kurang daripada 1 dalam 1,000 orang.

- Psoriasis (sejenis penyakit kulit yang menyebabkan kulit mengelupas dan gatal).
- Sesak nafas atau bengkak pada pergelangan kaki (jika anda menghidap kegagalan jantung).
- Asma (lelah) atau masalah pernafasan.
- Peredaran darah yang kurang baik.

Jangan risau akan senarai kesan sampingan ini. Anda mungkin tidak akan mengalami mana-mana satu pun. Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda perhatikan kesan sampingan yang tidak tersenarai di dalam risalah ini, beritahulah doktor atau ahli farmasi.

Cara Menyimpan Dan Membuang Tenormin

Simpan ubat ini di tempat yang selamat, jauh daripada pandangan dan capaian kanak-kanak. Ubat ini boleh memudaratkan mereka.

Jangan simpan pada suhu yang melebihi 25°C. Simpan tablet ini di dalam bungkusannya yang asal. Simpan papan lepuh di dalam karton. Ini akan melindungi ubat daripada cahaya dan lembapan.

Jangan gunakan tablet ini selepas tarikh luputnya yang tertera pada papan lepuh dan pada kartonnya. Tarikh luput merujuk pada hari terakhir bulan yang dinyatakan itu.

Keterangan tentang produk

Tablet Tenormin 50 mg berwarna jingga. Tablet ini bergaris lekuk pada sebelah permukaannya. Tablet ini disediakan di dalam pek (papan lepuh) yang mengandungi 28 tablet.

Tablet Tenormin 100 mg berwarna jingga. Tablet ini disediakan di dalam pek (papan lepuh) yang mengandungi 28 tablet.

Bahan

Bahannya yang aktif ialah atenolol. Setiap tablet mengandungi 50 mg atau 100mg (miligram) atenolol.

Bahan-bahannya yang lain ialah gelatin (sumber bovin), magnesium karbonat, magnesium stearat, metilhidroksipropilselulosa, natrium laurilsulfat, kanji jagung, titanium dioksida (E171), Makrogol, Sunset Yellow Lake (E110) dan talkum.

Nombor pendaftaran Malaysia:

Tenormin 50mg: MAL19870055AR

Tenormin 100mg: MAL19870056AR

Pengilang

AstraZeneca UK Limited, Macclesfield, Cheshire, United Kingdom

Tarikh semakan

Teks disemak semula pada bulan Ogos 2011

CV.000-676-467.2.0