

# **ANLODIN Tablet**

Amlodipine 5mg, 10mg

## **What is in this leaflet**

This leaflet answers some common questions about ANLODIN tablet. It does not contain all the available information. Please talk to healthcare professionals for further information.

## **What ANLODIN Tablet is used for**

It is used for treatment of high blood pressure, myocardial ischemia and angina either in monotherapy or combination therapy with other related drugs.

## **How ANLODIN Tablet works**

ANLODIN is a calcium ion influx inhibitor that inhibits the entering of calcium ions into cardiac and vascular smooth muscle. This results in a direct relaxant effect on vascular smooth muscle.

## **Before you use ANLODIN Tablet**

### **When you must not take it**

When you are allergic to amlodipine besylate.

### **Before you start to take it**

Tell your doctor if you are using any other medicines.

### **Taking other medicines**

Tell your doctor if you are taking any other medication. There may be an interaction between other groups of drugs.

## **How to take Anlodin Tablet**

### **How much to take**

For hypertension and angina, the usual initial dose is 5mg once daily, may be increased to a maximum of 10mg once daily based on individual patient's response. No dose adjustments are needed with concomitant administration of thiazide diuretics, beta blockers and angiotensin-converting enzyme inhibitors.

### **When to take it**

ANLODIN Tablet should be taken according to doctor's instruction.

### **How long to take it**

ANLODIN should be taken according to doctor's prescription.

### **If you forgot to take it**

If you miss a dose of ANLODIN and you are taking it regularly, take it as soon as possible. If several hours have passed or if it is nearing time for the next dose, do not double the dose to catch up, unless advised by your health care provider. Do not take 2 doses at once.

### **If you take too much**

Quickly seek for medical attention if you think that you or anyone else have taken too much ANLODIN.

## **While you are using ANLODIN Tablet**

### **Things you must do**

Take the tablet according to doctor's prescription.

### **Things you must not do**

Do not stop taking this medicine or change the dosing regimen without instruction of your doctor. Do not give ANLODIN to anyone else, even if they have the same condition as you.

## **Things to be careful of**

Should be used with caution in patient with impaired renal function, patients with impaired hepatic function, children and elderly.

## **Side effects**

*Commonly observed:* headache, edema, fatigue, nausea, flushing and dizziness.

*Less commonly observed:* itching, rash, shortness of breath, weakness, muscle cramps, stomach upset, and overgrowth of gum tissue.

*Rarely observed:* skin disorder due to allergy or infection.

## **After using ANLODIN Tablet**

### **Storage**

Store below 30°C, protect from light & moisture.

### **Disposal**

Tell your doctor or pharmacist if you stop taking the tablets or the tablets have passed their expiry date. Ask them what to do with any tablets that are left over.

## **Product description**

### **What it looks like**

5mg: White color octagon shape tablet, one side is impressed with a score in the middle, "YSP" on the top and "5" on the bottom.

10mg: White color octagon shape tablet, one side is impressed with a score in the middle, "YSP" on the top and "10" on the bottom.

### **Ingredients**

Amlodipine Besylate

Sodium Starch Glycolate

Silicon Dioxide

Cellulose

Magnesium Stearate

Lactose

### **MAL no.**

MAL 09051562A (5mg)

MAL 09051556A (10mg)

### **Manufacturer**

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor D.E., Malaysia.

## **Marketing Authorization Holder**

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

## **Date of revision :**

17<sup>th</sup> November 2011

## **ANLODIN Tablet**

Amlodipine 5mg, 10mg

### **Apakah yang ada pada risalah ini**

Risalah ini ditulis untuk menjawab soalan-soalan yang kerap ditanya tentang ANLODIN Tablet. Risalah ini hanya mengandungi sebahagian maklumat. Sila rujuk kepada ahli profesional kesihatan untuk keterangan lanjut.

### **Apakah kegunaan ANLODIN Tablet**

ANLODIN digunakan untuk rawatan tekanan darah tinggi, myocardial ischemia dan angina secara terapi mono ataupun terapi kombinasi dengan ubatan lain yang berkaitan.

### **Bagaimana ANLODIN Tablet berfungsi**

ANLODIN ialah perencat ion kalsium yang menghalang kemasukan ion kalsium ke dalam sel otot jantung dan salur darah yang akan megakibatkan pegendum sel otot saluran darah secara langsung.

### **Sebelum Mengambil ANLODIN Tablet**

#### **Bila tidak boleh mengambil**

Jika anda alah dengan amlodipine besylate.

#### **Sebelum mula mengambil**

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat. Interaksi akan berlaku jika ANLODIN digunakan bersama dengan ubat yang lain.

#### **Jika mengambil ubat-ubat lain**

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat. Interaksi akan berlaku jika ANLODIN digunakan bersama dengan ubat yang lain.

### **Cara menggunakan ANLODIN Tablet**

#### **Berapa banyak harus diambil**

Dos permulaan umum untuk hipertensi dan angina adalah 5mg sekali sehari, boleh ditambahkan kepada dos maximum 10mg sekali sehari bergantung kepada reaksi pesakit. Pelarasan dos tidak diperlukan dengan pengambilan thiazide diuretics, beta blockers dan angiotensin-converting enzyme inhibitors.

#### **Bila perlu diambil**

Ia perlu diambil mengikut arahan doktor.

#### **Berapa lama perlu diambil**

Ia perlu diberikan berdasarkan kepada preskripsi doktor.

#### **Jika terlupa mengambil**

Jika anda terlupa satu dos dan anda mengambil ubat ini secara berterusan, ambil dos itu secepat mungkin. Jika sudah beberapa jam selepas masa makan ubat berlalu ataupun sudah mendekati masa pengambilan dos yang kedua, jangan mengambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa, kecuali dinasihat oleh doktor. Jangan mengambil 2 dos pada masa yang sama.

#### **Jika mengambil terlebih (terlebih dos)**

Minta perhatian perubatan dengan segera jika anda atau orang lain telah mengambil dos yang berlebihan.

### **Semasa menggunakan ANLODIN Tablet**

#### **Perkara yang perlu dilakukan**

Ikut preskripsi doktor anda semasa mengambil ubat ini.

#### **Perkara yang tidak boleh dilakukan**

Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah pengambilan dos tanpa arahan doktor. Jangan memberi ubat ini kepada sesiapa walaupun simptom mereka serupa dengan anda.

### **Perkara yang perlu diberi perhatian**

Perhatian perlu diberi jika diguna oleh pesakit dengan kemerosotan fungsi ginjal, kemerosotan fungsi hati, kanak-kanak dan orang tua.

### **Kesan-sesan sampingan**

*Kesan sampingan umum:* sakit kepala, edema, keletihan, loya, kemerah-merahan pada muka dan pening.

*Kesan sampingan yang kurang umum:* kegatalan, ruam, susah bernafas, lemah, kekejangan otot, masalah penghadaman, dan Bengkak tusi gusi.

*Kesan sampingan yang jarang dilihat:* penyakit kulit disebabkan kealahan atau jangkitan kuman.

### **Selepas menggunakan ANLODIN Tablet**

#### **Cara penyimpanan**

Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

#### **Cara pelupusan**

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini telah luput tarikh. Sila bertanya kepada doktor atau ahli farmasi tentang cara pengendalian ubat yang tertinggal.

#### **Maklumat lanjut**

##### **Rupa dan warna produk**

5mg: Tablet berbentuk segi lapan yang berwarna putih dengan perkataan "YSP" di sebelah atas dan "5" di sebelah bawah pada satu permukaan.

10mg: Tablet berbentuk segi lapan yang berwarna putih dengan perkataan "YSP" di sebelah atas dan "10" di sebelah bawah pada satu permukaan.

#### **Bahan-bahan Kandungan**

Amlodipine Besylate  
Sodium Starch Glycolate  
Silicon Dioxide  
Cellulose  
Magnesium Stearate  
Lactose

#### **MAL no.**

MAL 09051562A (5mg)

MAL 09051556A (10mg)

#### **Pengilang**

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.  
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor D.E., Malaysia.

#### **Marketing Authorization Holder:**

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.  
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13,  
Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi,  
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan,  
Malaysia.

### **Tarikh kemaskini RiMUP :**

17<sup>th</sup> November 2011