

AVANDARYL 4MG/4MG TABLET
AVANDARYL 4MG/1MG TABLET
AVANDARYL 4MG/2MG TABLET
Rosiglitazone maleate and glimepiride

What is in this leaflet

1. What AVANDARYL Tablets are and what they are used for
2. Before you take AVANDARYL Tablets
3. How to take AVANDARYL Tablets
4. Possible side effects
5. How to store AVANDARYL Tablets
6. Further Information

What AVANDARYL is used for

AVANDARYL contains two prescription medicines to treat diabetes, rosiglitazone maleate (AVANDIA) and glimepiride (AMARYL). AVANDARYL is used, with diet and exercise, to treat certain adults with type 2 (“adult-onset” or “non-insulin dependent”) diabetes mellitus (“high blood sugar”) who are:

- Already taking rosiglitazone or rosiglitazone-containing products
- Unable to control their blood sugar on other diabetes medicines, and after talking with their doctor have decided not to take pioglitazone (ACTOS) or pioglitazone-containing products (ACTOPLUS MET, ACTOPLUS MET XR, DUETACT)

AVANDARYL is not for people with type 1 diabetes mellitus or to treat a condition called diabetic ketoacidosis.

It is not known if AVANDARYL is safe and effective in children under 18 years old.

How AVANDARYL works

Glimepiride can help your body release more of its own insulin. Rosiglitazone can help your body respond better to the insulin made in your body and

does not cause your body to make more insulin.

Before you take AVANDARYL

When you must not take it

Many people with heart failure should not start taking AVANDARYL. See “Before you start to take it”.

Before you start to take it

Before starting AVANDARYL, ask your doctor about what the choices are for diabetes medicines, and what the expected benefits and possible risks are for you in particular. Before taking AVANDARYL, tell your doctor about all your medical conditions, including if you:

- **Have heart problems or heart failure**
- **Have type 1 (“juvenile”) diabetes or had diabetic ketoacidosis.** These conditions should be treated with insulin and should not be treated with AVANDARYL.
- **Have a type of diabetic eye disease called macular edema** (swelling of the back of the eye)
- **Have liver problems.** Your doctor should do blood tests to check your liver before you start taking AVANDARYL and during treatment as needed
- **Had liver problems while taking REZULIN®** (troglitazone), another medicine for diabetes
- **Have kidney problems.** If people with kidney problems use AVANDARYL, they may need a lower dose of the medication.
- **Have glucose 6-phosphate dehydrogenase (G6PD)**

deficiency. This condition runs in families. People with G6PD deficiency who take glimepiride (one of the medicines in AVANDARYL) may develop hemolytic anemia (fast breakdown of red blood cells)

- **Are pregnant or plan to become pregnant.**

AVANDARYL should not be used during pregnancy. It is not known if AVANDARYL can harm your unborn baby. You and your doctor should talk about the best way to control your diabetes during pregnancy. If you are a premenopausal woman (before the “change of life”) who does not have regular monthly periods, AVANDARYL may increase your chances of becoming pregnant. Talk to your doctor about birth control choices while taking AVANDARYL. Tell your doctor right away if you become pregnant while taking AVANDARYL.

- **Are breast-feeding or planning to breast-feed.**

It is not known if AVANDARYL passes into breast milk. You should not use AVANDARYL while breast-feeding.

Taking other medicines

Tell your doctor about all the medicines you take including prescription and non-prescription medicines, vitamins or herbal supplements. AVANDARYL and certain other medicines can affect each other and may lead to serious side effects including high or low blood sugar, or heart problems. Especially tell your doctor if you take:

- **Insulin**
- **Any medicines for high blood pressure, high cholesterol or heart failure, or for prevention of heart disease or stroke**

Know the medicines you take. Keep a list of all your medicines and show it to your doctor or pharmacist before you start a new medicine. They will tell you if it is alright to take AVANDARYL with other medicines.

How to take AVANDARYL Tablets

How much to take

Take AVANDARYL exactly as prescribed. Your doctor may need to change your dose until your blood sugar is better controlled.

When to take it

Take AVANDARYL by mouth one time each day with your first main meal.

How long to take it

It usually takes a few days for AVANDARYL to start lowering your blood sugar. It may take 2 to 3 months to see the full effect on your blood sugar level.

If you forget to take it

If you miss a dose of AVANDARYL, take it as soon as you remember, unless it is time to take your next dose. Take your next dose at the usual time. Do not take double doses to make up for a missed dose.

If you take too much (overdose)

If you take too much AVANDARYL, call your doctor or poison control center right away.

While you are using AVANDARYL

Things you must do

Test your blood sugar regularly as your doctor tells you. Your

doctor should do blood tests to check your liver before you start AVANDARYL and during treatment as needed. Your doctor should also do regular blood sugar tests (for example, “A1C”) to monitor your response to AVANDARYL. Call your doctor if you get sick, get injured, get an infection, or have surgery. AVANDARYL may not control your blood sugar levels during these times. Your doctor may need to stop AVANDARYL for a short time and give you insulin to control your blood sugar level. Diet and exercise can help your body use its blood sugar better. It is important to stay on your recommended diet, lose extra weight, and get regular exercise while taking AVANDARYL.

Things you must not do

Medicines are sometimes prescribed for purposes other than those listed in the leaflet. Do not use AVANDARYL for a condition for which it was not prescribed. Do not give AVANDARYL to other people, even if they have the same symptoms you have. It may harm them.

Things to be careful of

New or worse heart failure

- Rosiglitazone, one of the medicines in AVANDARYL, can cause your body to keep extra fluid (fluid retention), which leads to swelling (edema) and weight gain. Extra body fluid can make some heart problems worse or lead to heart failure. Heart failure means your heart does not pump blood well enough.
- If you have severe heart failure, you cannot start AVANDARYL.
- If you have heart failure with symptoms (such as shortness of breath or swelling), even if these symptoms are not

severe, AVANDARYL may not be right for you.

Call your doctor right away if you have any of the following:

- Swelling or fluid retention, especially in the ankles or legs
- Shortness of breath or trouble breathing, especially when you lie down
- An unusually fast increase in weight
- Unusual tiredness

Myocardial Infarction (“Heart Attack”)

Rosiglitazone, one of the medicines in AVANDARYL, may raise the risk of heart attack. The risk of having a heart attack may be higher in people who take AVANDARYL with insulin. Most people who take insulin should not also take AVANDARYL.

Symptoms of a heart attack can include the following:

- Chest discomfort in the center of your chest that lasts for more than a few minutes, or that goes away or comes back
- Chest discomfort that feels like uncomfortable pressure, squeezing, fullness or pain
- Pain or discomfort in your arms, back, neck, jaw or stomach
- Shortness of breath with or without chest discomfort
- Breaking out in a cold sweat
- Nausea or vomiting
- Feeling lightheaded

Call your doctor or go to the nearest hospital emergency room right away if you think you are having a heart attack.

People with diabetes have a greater risk for heart problems. It is important to work with your doctor to manage other conditions, such as high blood pressure or high cholesterol. AVANDARYL can have other serious side effects. Be sure to read the section below “Side Effects”.

Side Effects

AVANDARYL may cause serious side effects, including:

- **New or worse heart failure.**
See “Things to be careful of”
- **Heart attack.** See “Things to be careful of”
- **Swelling (edema).**
AVANDARYL can cause swelling due to fluid retention. See “Things to be careful of”
- **Low blood sugar (hypoglycemia).**
Lightheadedness, dizziness, shakiness or hunger may mean that your blood sugar is too low. This can happen if you skip meals, if you use another medicine that lowers blood sugar, or if you have certain medical problems. Call your doctor if low blood sugar levels are a problem for you.
- **Weight gain.** Rosiglitazone, one of the medicines in AVANDARYL, can cause weight gain that may be due to fluid retention or extra body fat. Weight gain can be a serious problem for people with certain conditions including heart problems. See “Things to be careful of”
- **Liver problems.** It is important for your liver to be working normally when you take AVANDARYL. Your doctor should do blood tests to check your liver before you start taking AVANDARYL and during treatment as needed. Call your doctor right away if you have unexplained symptoms such as:
 - nausea or vomiting
 - stomach pain
 - unusual or unexplained tiredness
 - loss of appetite
 - dark urine
 - yellowing of your skin or the whites of your eyes
- **Macular edema** (a diabetic eye disease with swelling in

the back of the eye). Tell your doctor right away if you have any changes in your vision. Your doctor should check your eyes regularly. Very rarely, some people have had vision changes due to swelling in the back of the eye while taking rosiglitazone, one of the medicines in AVANDARYL.

- **Fractures** (broken bones), usually in the hand, upper arm or foot. Talk to your doctor for advice on how to keep your bones healthy.
- **Low red blood cell count (anemia)**
- **Ovulation** (release of egg from an ovary in a woman) leading to pregnancy. Ovulation may happen in premenopausal women who do not have regular monthly periods. This can increase the chance of pregnancy. See “Things to be careful of”

The most common side effects with AVANDARYL include cold-like symptoms and headache.

Storage and Disposal of AVANDARYL

- Store AVANDARYL below 30°C.
- Keep AVANDARYL in the container it comes in. Keep the container closed tightly.
- Safely, throw away AVANDARYL that is out of date or no longer needed.

Keep AVANDARYL and all medicines out of reach of children.

Product Description

What it looks like

Always check to make sure that the medicine you are taking is the correct one. AVANDARYL tablets are triangles with rounded corners and look like this:

- 4mg/1mg - yellow with “gsk” on one side and “4/1” on the other
- 4mg/2mg – orange with “gsk” on one side and “4/2” on the other
- 4mg/4mg – pink with “gsk” on one side and “4/4” on the other

Ingredients

Active Ingredients:

Rosiglitazone maleate and glimepiride

Inactive Ingredients:

Hypromellose 2910, lactose monohydrate, magnesium stearate, microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, opadry brown or opadry yellow.

AVANDARYL 4mg/4mg
Tablet MAL20071667AR

AVANDARYL 4mg/1mg
Tablet MAL20071665AR

AVANDARYL 4mg/2mg
Tablet MAL20071666AR

Manufacturer

SmithKline Beecham
Corporation
1011 North Arendell Avenue
Zebulon NC 27597
United States

Date of Revision

16 April 2012

AVANDARYL and AVANDIA are registered trademarks of GlaxoSmithKline. The other brands listed are trademarks of their respective owners and are not trademarks of GlaxoSmithKline. The makers of these brands are not affiliated with and do not endorse GlaxoSmithKline or its products.

TABLET AVANDARYL 4MG/4MG
TABLET AVANDARYL 4MG/1MG
TABLET AVANDARYL 4MG/2MG
Rosiglitazone maleate dan glimepiride

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah dia Tablet AVANDARYL dan apakah kegunaannya
2. Sebelum anda mengambil Tablet AVANDARYL
3. Bagaimana untuk mengambil Tablet AVANDARYL
4. Kesan-kesan sampingan yang mungkin berlaku
5. Bagaimana untuk menyimpan Tablet AVANDARYL
6. Maklumat lanjut

Apakah kegunaan AVANDARYL

AVANDARYL mengandungi dua ubatan preskripsi untuk merawat diabetes, rosiglitazone maleate (AVANDIA) dan glimepiride (AMARYL). AVANDARYL digunakan bersama pemakanan yang seimbang dan senaman untuk merawat sesetengah orang dewasa yang menghidapi diabetes (paras gula yang tinggi dalam darah) jenis 2 (“peringkat permulaan dewasa” atau “tidak bergantung kepada insulin”) yang:

- Telah mengambil rosiglitazone atau produk yang mengandungi rosiglitazone
- Tidak dapat mengawal paras gula dalam darah dengan penggunaan ubatan diabetes yang lain dan selepas berbincang dengan doktor mereka telah memutuskan untuk tidak mengambil pioglitazone (ACTOS) atau produk-produk yang mengandungi pioglitazone (ACTOPLUS MET, ACTOPLUS MET XR, DUETACT)

Bagaimana AVANDARYL berfungsi

Glimepiride dapat membantu badan anda mengeluarkan lebih banyak insulin. Rosiglitazone pula dapat membantu badan anda bertindakbalas lebih baik kepada insulin yang dihasilkan di dalam badan dan tidak menyebabkan badan anda menghasilkan lebih banyak insulin. Kedua-dua ubatan ini bertindak bersama untuk membantu mengawal gula dalam darah.

AVANDARYL bukan untuk kegunaan pesakit diabetes mellitus jenis 1 atau untuk merawat satu keadaan yang dikenali sebagai ketoasidosis diabetes. Tidak diketahui sama ada AVANDARYL selamat dan berkesan di kalangan kanak-kanak berusia di bawah umur 18 tahun.

Sebelum mengambil AVANDARYL

Bila tidak boleh mengambil
Sesiapa yang mempunyai kegagalan jantung tidak boleh mula mengambil AVANDARYL. Sila lihat “Sebelum mula mengambil”

Sebelum mula mengambil
Sebelum mula mengambil AVANDARYL, tanya kepada doktor anda apakah pilihan yang ada untuk ubatan diabetes dan apakah manfaat yang dapat dijangka dan risiko yang mungkin terjadi secara khusus kepada anda. Sebelum mengambil AVANDARYL, beritahu doktor anda tentang semua keadaan perubatan anda termasuklah jika anda:

- Mempunyai masalah jantung atau kegagalan jantung
- Mempunyai diabetes jenis 1 (“awal remaja”) atau ketoasidosis diabetes. Keadaan ini perlu dirawat dengan insulin.
- Mempunyai sejenis penyakit mata disebabkan diabetes yang dikenali sebagai edema makular (bengkak pada bahagian belakang mata)
- Mempunyai masalah hati. Doktor anda perlu menjalankan ujian darah untuk memeriksa hati anda sebelum memulakan pengambilan AVANDARYL dan semasa rawatan jika diperlukan
- Mempunyai masalah hati ketika mengambil REZULIN® (troglitazone), ubatan lain bagi pesakit diabetes
- Mempunyai masalah buah pinggang. Jika pesakit buah pinggang menggunakan AVANDARYL, mereka mungkin memerlukan dos yang lebih rendah.
- Mempunyai masalah kekurangan enzim glucose-6-phosphatase dehydrogenase (G6PD). Ia merupakan penyakit keturunan. Mereka yang menghidapi penyakit kekurangan enzim G6PD dan mengambil glimepiride (salah satu dari kandungan ubatan AVANDARYL) mungkin mengalami anemia hemolitik (peningkatan kerosakan sel darah merah)
- Hamil atau merancang untuk hamil. AVANDARYL tidak sepatutnya digunakan ketika hamil. Adalah tidak diketahui samada AVANDARYL selamat untuk bayi yang berada di dalam kandungan.

Anda dan doktor anda seharusnya berbincang tentang cara yang terbaik untuk mengawal keadaan diabetes semasa anda hamil. Jika anda wanita yang berada dalam fasa pra putus haid (sebelum putus haid) yang mempunyai haid yang tidak teratur pada setiap bulan, AVANDARYL boleh meningkatkan peluang anda untuk hamil. Bincang dengan doktor anda tentang pilihan perancang kehamilan semasa mengambil AVANDARYL. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil ketika mengambil AVANDARYL

- Sedang menyusukan bayi atau merancang untuk menyusukan bayi. Adalah tidak diketahui jika AVANDARYL boleh menjadi sebahagian daripada susu ibu. Anda tidak sepatutnya mengambil AVANDARYL ketika sedang menyusukan bayi.

Jika mengambil ubat-ubat lain
Beritahu doktor anda tentang semua ubatan yang diambil termasuklah ubat yang dipreskripsi dan tidak dipreskripsi, vitamin atau suplemen herba. AVANDARYL dan sesetengah ubatan lain boleh bertindakbalas sesama sendiri dan boleh membawa kepada kesan sampingan yang serius termasuklah kandungan gula yang tinggi atau rendah dalam darah, atau masalah jantung. Beritahu doktor anda terutamanya jika anda mengambil:

- Insulin
- Sebarang ubatan untuk tekanan darah tinggi, kandungan kolesterol yang tinggi atau kegagalan jantung, atau untuk pencegahan penyakit jantung atau angin ahmar

Kenali ubatan yang anda ambil. Simpan senarai ubatan anda dan

tunjukkan kepada doktor dan ahli farmasi anda sebelum memulakan ubat yang baru. Mereka akan beritahu anda jika AVANDARYL selamat diambil bersama ubatan yang lain.

Cara menggunakan AVANDARYL

Berapa banyak harus diambil
Ambil AVANDARYL seperti yang telah dipreskripsikan. Doktor anda mungkin perlu menukar dos anda sehingga paras gula anda dapat dikawal dengan baik.

Bila perlu diambil
AVANDARYL harus diambil secara oral sehari sekali dengan makanan utama pertama anda.

Berapa lama perlu diambil
Ia selalunya mengambil masa beberapa hari bagi AVANDARYL untuk mula menurunkan paras gula anda. Ia juga mungkin mengambil masa 2 hingga 3 bulan untuk melihat kesan menyeluruh terhadap paras gula anda.

Jika terlupa mengambil
Jika anda tertinggal satu dos AVANDARYL, ambil dengan segera sebaik sahaja anda teringat, kecuali jika sudah sampai masa untuk anda mengambil dos yang seterusnya. Ambil dos yang seterusnya pada masa yang selalu anda ambil. Jangan ambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang telah tertinggal.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil terlalu banyak AVANDARYL, sila hubungi doktor anda atau pusat pengawalan racun dengan segera.

Semasa menggunakan AVANDARYL

Perkara yang perlu dilakukan

Periksa paras gula dalam darah anda secara teratur seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Doktor anda perlu menjalankan beberapa ujian darah untuk memantau keadaan hati anda sebelum anda mula dan semasa mengambil AVANDARYL jika perlu. Doktor anda juga harus kerap menjalankan pemeriksaan gula dalam darah (contohnya, "A1C") untuk memantau respon anda kepada AVANDARYL. Hubungi doktor anda jika anda sakit, luka, terkena jangkitan atau menjalani pembedahan. AVANDARYL mungkin tidak dapat mengawal paras gula dalam darah anda semasa keadaan tersebut. Doktor anda mungkin perlu menghentikan AVANDARYL sementara dan memberikan anda insulin untuk mengawal paras gula dalam darah anda. Pemakanan seimbang dan senaman boleh membantu badan anda menggunakan gula dalam darah dengan lebih baik. Adalah penting untuk mengikut pemakanan yang telah ditetapkan, mengurangkan berat badan, dan melakukan senaman secara berkala semasa mengambil AVANDARYL.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Ubat-ubatan kadang kala dipreskripsi untuk kegunaan selain daripada yang telah disenaraikan dalam RiMUP. Jangan gunakan AVANDARYL untuk keadaan yang tidak dipreskripsikan. Jangan beri AVANDARYL kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai tanda-tanda yang sama seperti anda. Ia boleh membahayakan mereka.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Kegagalan jantung yang baru atau lebih teruk

- Rosiglitazone, salah satu ubat dalam AVANDARYL, boleh menyebabkan tubuh anda menyimpan lebihan cecair (pengumpulan cecair), yang boleh menyebabkan kebengkakan (edema) dan peningkatan berat badan. Cecair badan yang berlebihan boleh menyebabkan sesetengah masalah jantung menjadi lebih teruk atau membawa kepada kegagalan jantung. Kegagalan jantung bermaksud jantung anda tidak dapat mengemam darah dengan baik.

- Jika anda menghadapi kegagalan jantung yang teruk, anda tidak boleh mula mengambil AVANDARYL.

- Jika anda menghadapi kegagalan jantung dengan tanda-tanda (seperti sesak nafas atau kebengkakan) walaupun ianya tidak teruk, AVANDARYL mungkin tidak sesuai untuk anda.

Sila hubungi doktor anda dengan segera jika anda mengalami perkara berikut:

- Kebengkakan atau pengumpulan cecair, terutamanya di bahagian buku lali atau kaki
- Sesak nafas atau kesukaran bernafas, terutamanya ketika anda baring
- Peningkatan berat badan yang luar biasa
- Keletihan yang luar biasa

Infark Miokardium (“Serangan Jantung”)

Rosiglitazone, salah satu ubat dalam AVANDARYL, boleh meningkatkan risiko serangan jantung. Risiko untuk mendapat serangan jantung mungkin meningkat dikalang mereka yang mengambil AVANDARYL bersama insulin. Kebanyakan orang yang mengambil insulin tidak sepatutnya mengambil

AVANDARYL pada masa yang sama.

Tanda-tanda serangan jantung boleh merangkumi perkara-perkara berikut:

- Rasa tidak selesa di bahagian tengah dada yang berlarutan lebih daripada beberapa minit, atau sakit yang hilang dan datang kembali
- Sakit atau tidak selesa pada lengan, bahagian belakang badan, leher, rahang atau perut
- Sesak nafas dengan atau tanpa rasa tidak selesa di dada
- Berpeluh walau kesejukan
- Loya atau muntah
- Rasa pitam

Jika anda berasa anda mengalami serangan jantung, hubungi doktor anda atau pergi ke bahagian kecemasan hospital yang berdekatan dengan segera.

Pesakit diabetes mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami masalah jantung. Adalah penting untuk bekerjasama dengan doktor anda untuk mengawal keadaan lain seperti tekanan darah tinggi atau tahap kolesterol tinggi.

AVANDARYL boleh mempunyai kesan sampingan lain yang serius. Pastikan anda membaca bahagian di bawah “Kesan-kesan sampingan”.

Kesan-kesan sampingan

AVANDARYL boleh menyebabkan kesan sampingan yang serius termasuklah:

- Kegagalan jantung yang baru atau semakin teruk. Sila lihat “Perkara yang perlu diberi perhatian”
- Serangan jantung. Sila lihat “Perkara yang perlu diberi perhatian”
- Bengkak (edema). AVANDARYL boleh menyebabkan bengkak disebabkan pengumpulan cecair dalam badan. Sila lihat

“Perkara yang perlu diberi perhatian”

- Paras gula yang rendah dalam darah (hipoglisemia). Rasa pitam, pening, menggeletar atau berasa lapar mungkin bermaksud paras gula yang terlalu rendah dalam darah. Ia boleh berlaku jika anda mengakibatkan pemakanan anda, menggunakan ubatan lain yang boleh menurunkan gula dalam darah atau jika anda mempunyai masalah kesihatan tertentu. Sila hubungi doktor anda sekiranya paras gula yang rendah menjadi satu masalah bagi anda.
- Peningkatan berat badan. Rosiglitazone, salah satu daripada kandungan ubat AVANDARYL boleh menyebabkan peningkatan berat badan yang disebabkan oleh pengumpulan cecair atau lebihan lemak dalam badan. Peningkatan berat badan boleh menjadi masalah serius bagi mereka yang mempunyai keadaan tertentu termasuk masalah jantung. Sila lihat “Perkara yang perlu diberi perhatian”
- Masalah hati. Adalah penting untuk hati anda berfungsi dengan baik semasa pengambilan AVANDARYL. Doktor anda perlu melakukan ujian darah untuk memeriksa hati anda sebelum anda mula mengambil AVANDARYL dan semasa dalam rawatan, jika perlu. Hubungi doktor anda dengan segera jika anda mempunyai tanda-tanda yang tidak dapat dijelaskan seperti berikut:
 - Loya atau muntah
 - Sakit perut
 - Keletihan luar biasa atau tidak dapat dijelaskan
 - Hilang selera makan
 - Warna air kencing yang gelap

- Warna kekuningan pada kulit atau pada mata anda
- Edema macula (satu penyakit mata disebabkan diabetes yang melibatkan bengkak pada bahagian belakang mata). Sila beritahu doktor anda dengan segera jika terdapat sebarang perubahan pada penglihatan anda. Doktor anda perlulah memeriksa mata anda secara berkala. Sesetengah orang mengalami perubahan pada penglihatan disebabkan pembengkakan di bahagian belakang mata semasa mengambil rosiglitazone, salah satu kandungan ubat di dalam AVANDARYL namun keadaan ini jarang sekali berlaku.
- Retakan (patah tulang), selalunya berlaku pada bahagian tangan, bahagian atas lengan atau kaki. Bincanglah dengan doktor anda untuk mendapatkan nasihat tentang bagaimana untuk memastikan tulang anda sihat.
- Kekurangan sel darah merah (anemia)
- Ovulasi (perlepasan telur dari ovary wanita) yang boleh menyebabkan kehamilan. Ovulasi mungkin berlaku kepada wanita pra putus haid yang tidak mempunyai kitaran haid yang teratur. Keadaan ini boleh meningkatkan peluang untuk hamil. Sila lihat “Perkara yang perlu diberi perhatian”

Kesan sampingan AVANDARYL yang sering berlaku termasuklah sakit seperti tanda-tanda selsema dan sakit kepala. Hubungi doktor anda untuk mendapatkan khidmat nasihat tentang kesan-kesan sampingannya.

Cara penyimpanan dan pelupusan Tablet AVANDARYL

Simpan AVANDARYL di bawah suhu 30°C. Simpan AVANDARYL di dalam bekas yang telah disediakan. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Sila lupuskan AVANDARYL yang telah tamat tempoh dengan selamat. Simpan dan jauhkan AVANDARYL dan ubatan lain daripada capaian kanak-kanak.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Sentiasa pastikan ubat yang anda ambil adalah betul. Tablet AVANDARYL berbentuk tiga segi dengan muncung yang bujur di hujungnya dan kelihatan seperti berikut:

- 4mg/1mg – berwarna kuning dengan tanda “gsk” pada sebelah permukaan dan tanda “4/1” pada sebelah permukaan lagi
- 4mg/2mg – berwarna jingga dengan tanda “gsk” pada sebelah permukaan dan tanda “4/2” pada sebelah permukaan lagi
- 4mg/4mg – berwarna merah jambu dengan tanda “gsk” pada sebelah permukaan dan tanda “4/4” pada sebelah permukaan lagi

Bahan-bahan kandungan

Bahan Aktif: Rosiglitazone maleate dan glimepiride
 Bahan Tidak Aktif: Hipromellose 2910, laktosa monohidrat, magnesium stearat, selulosa mikrokristalin, glikolat kanji natrium, opadry brown atau opadry yellow .

AVANDARYL 4mg/4mg
 Tablet MAL20071667AR

AVANDARYL 4mg/1mg
 Tablet MAL20071665AR

AVANDARYL 4mg/2mg
 Tablet MAL20071666AR

Pengilang

SmithKline Beecham Corporation
 1011 North Arendell Avenue
 Zebulon NC 27597
 United States

Tarikh kemaskini RiMUP

16 April 2012

AVANDARYL dan AVANDIA adalah cap dagangan berdaftar GlaxoSmithKline. Jenama lain yang tersenarai adalah cap dagangan pemilik masing-masing dan bukan cap dagangan GlaxoSmithKline. Pembuat jenama-jenama tersebut tidak berkaitan dan tidak mengesahkan GlaxoSmithKline atau produknya.