

INDAKLINE TABLET 2.5MG

Indapamide

What is in this leaflet

1. What Indapamide is and what it is used for
 2. Before you take Indapamide Tablets
 3. How to take Indapamide Tablets
 4. Possible side effects
 5. Storing Indapamide Tablets
 6. Further Information
- The tablets will be called Indapamide Tablets in this leaflet.

What Indapamide is used for

Indapamide can be used for treating high blood pressure (hypertension). It may be used on its own or in combination with other medicine for high blood pressure.

How Indapamide works

The name of your medicine is IndaKline Tablets 2.5mg. It belongs to a group of medicines called diuretics (water tablets).

Before you take Indapamide

When you must not take it

Do not take Indapamide if:

- You are allergic (hypersensitive) to Indapamide or any of the other ingredients of this medicine (see Further Information). Signs of an allergic reaction include: a rash, swallowing or breathing problems, swelling of your lips, throat, or tongue.
- You are allergic (hypersensitive) to sulphonamide drugs (such as Co-trimoxazole)
- You have recently had a stroke
- You have ever had severe liver problems or suffer from a condition called hepatic encephalopathy (liver problems which affect your

brain and central nervous system)

- You have low levels of potassium in your blood (hypokalaemia)

Do not take the medicine if any of the above applied to you. If you are not sure, talk to your doctor or pharmacist before taking Indapamide.

Before you start to take it

Take special care with Indapamide and check with your doctor or pharmacist before taking this medicine if:

- In the past you have had low levels of potassium in your blood. Low levels of potassium can occur in someone with heart disease or high blood pressure
- You have gout
- You have kidney problems
- You have an overactive thyroid gland (hyperparathyroidism)
- You have heart rhythm problems
- You have liver problems

You should tell your doctor if you have had photosensitivity reactions.

Your doctor may give you blood tests to check for low sodium or potassium levels or high calcium levels.

Athletes should be aware that this medicine contains an active ingredient, which may give a positive reaction in doping tests.

Taking other medicines

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines. This includes medicines you buy without a prescription, including herbal medicines. This is because Indapamide can affect the way some medicines work. Also

some medicines can affect the way Indapamide works.

In particular, tell your doctor if you are taking any of the following:

- Medicines for heart rhythm problems such as (quinidine, hydroquinidine, disopyramide, miodarone, sotalol, ibutilide, dofetilide or digitalis).
- Other water tablets (such as furosemide). Your doctor may want to monitor you more closely.
- Steroids such as prednisolone or hydrocortisone
- Laxatives
- Medicines used to treat mental disorders such as depression, anxiety or schizophrenia (for example tricyclic antidepressants, antipsychotic drugs, neuroleptics)
- Moxifloxacin (antibiotic used to treat infection)
- Pentamidine (used to treat certain types of pneumonia)
- Mizolastine (used to treat allergic reactions, such as hay fever)
- Non-steroidal anti-inflammatory drugs for pain relief (e.g. ibuprofen) or high doses of acetylsalicylic acid (aspirin)
- Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors (used to treat high blood pressure and heart failure)
- Oral corticosteroids used to treat various conditions including severe asthma and rheumatoid arthritis
- Baclofen (to treat muscle stiffness occurring in diseases such as multiple sclerosis)
- Potassium-sparing diuretics (amiloride, spironolactone, triamterene)
- Metformin (to treat diabetes)

- Iodinated contrast media (used for tests involving X-rays)
- Calcium tablets or other calcium supplements
- Ciclosporin, tacrolimus or other medicines to depress the immune system after organ transplantation, to treat autoimmune diseases, or severe rheumatic or dermatological diseases,
- Tetracosactide (to treat Crohn's disease)

How to take Indapamide Tablets

How much to take

Always take Indapamide exactly as your doctor has told you. You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Adults and elderly

- The usual dose is one tablet, once a day, taken in the morning

When to take it

Swallow the tablets whole with a drink of water.

How long to take it

Keep taking this medicine until your doctor tells you to stop. It may take several months before this medicine shows its full effect.

If you forget to take it

Do not take a double dose to make up for a forgotten tablet. Miss it out and then go on as before.

If you take too much (overdose)

If you take more tablets than you should, tell your doctor or go to your nearest hospital casualty department straight away. Take the carton and any Indapamide tablets left with you so that the doctors know what you have taken. Taking too much Indapamide may make you feel or be sick (nausea or

vomiting), cause low blood pressure, cramps, dizziness, drowsiness, confusion and changes in the amount of urine produced by the kidneys due to severe dehydration

While you are using Indapamide

Things you must do

Always take Indapamide exactly as your doctor has told you. You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Things you must not do

This medicine has been prescribed for you personally and you should not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.

Things to be careful of

- If any of the side effects get serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist
- Your doctor may have given you this medicine before from another company. It may have looked slightly different. However, either brand will have the same effect

Driving and using machines:

Indapamide may make you feel tired or dizzy. If this happens do not drive or use any tools or machines. These side effects are more likely to occur, at the start of the treatment and after dose increases.

If you are not sure if any of the above apply to you, talk to your doctor or pharmacist before taking indapamide.

Pregnancy and breast-feeding

- Tell your doctor before taking this medicine if you are pregnant, might become pregnant, or think you may be pregnant.
- Do not use this medicine if you are breast-feeding or planning to breast-feed.

Important information about some of the ingredients of indapamide.

- Indapamide 2.5mg Tablets contain lactose. If you have been told by your doctor that you cannot digest or tolerate some sugars, talk to your doctor before having this medicine.

Side Effects

Like all medicines, Indapamide can cause side effects, although not everybody gets them.

Stop taking Indapamide and see your doctor or go to a hospital straight away if:

- You get swelling of the hands, feet, ankles, face, lips or throat which may cause difficulty in swallowing or breathing. You could also notice an itchy, lumpy rash (hives) or nettle rash (urticaria). This may mean you are having an **allergic reaction** to Indapamide tablets
- You get symptoms including blistering or peeling of your skin, flu-like symptoms and a high temperature. This could be a rare but serious condition called epidermal necrolysis.

Tell your doctor as soon as possible if you have any of the following side-effects:

- You feel tired, weak, confused and have muscles that ache, are stiff or do not work well. This may be due to low sodium levels in your blood (hyponatraemia)
- You feel irritable and your muscles twitch. This may be due to an imbalance in your blood called metabolic alkalosis
- Itchy, lumpy rash. You may also have a high temperature, sore throat, headache or diarrhoea
- You get more infections than usual or bruise more easily. This could be caused by problems with your blood.

- You get increased thirst, hunger and weight loss. These could be signs of diabetes

Tell your doctor or pharmacist if any of the following side effects get serious or lasts longer than a few days. Also tell them if you notice any side effects not listed in this leaflet.

Uncommon (affects less than 1 in 100 people):

- being sick (vomiting)
- allergic reactions, mainly dermatological, such as skin rashes, purpura (red pinpoints on skin) in subjects with a predisposition to allergic and asthmatic reactions.

Rare (affects less than 1 in 1000 people):

- feeling of tiredness, dizziness, headache, pins and needles (paresthesia);
- nausea (feeling sick), constipation, dry mouth;
- Increased risk of dehydration in the elderly and in patients suffering from heart failure.

Very rare (affects less than 1 in 10,000 people):

- heart rhythm irregularities (causing palpitations, feeling of the heart pounding), low blood pressure;
- kidney disease (causing symptoms of tiredness, increased need to urinate, itchy skin, feeling sick, swollen extremities),
- pancreatitis (inflammation of the pancreas which causes upper abdominal pain),
- abnormal liver function (with symptoms such as tiredness, loss of appetite, feeling or being sick, swollen extremities, yellow skin). In cases of liver failure, there is a possibility of getting hepatic encephalopathy (liver problems which affect the brain and central nervous system),

- changes in blood cells, such as thrombocytopenia (decrease in the number of platelets which causes easy bruising and nasal bleeding), leucopenia (decrease of white blood cells which may cause unexplained fever, soreness of the throat or other flu-like symptoms – if this occurs, contact your doctor) and anaemia (decrease in red blood cells),
- angioedema and/or urticaria, severe skin manifestations. Angioedema is characterised by swelling of the skin around the eyes, lips, hands or feet. It may cause swelling of the throat, tongue or airways resulting in shortness of breath or difficulty of swallowing. If this occurs, contact your doctor immediately.

Frequency not known (cannot be estimated from available data)

- muscle cramps
- dizziness, lightheadedness, fainting when you stand or sit up quickly (due to low blood pressure) loss of appetite (anorexia), indigestion
- diarrhoea
- difficulty in getting or keeping an erection or ejaculating (impotence)
- sudden short sightedness (reversible)
- changes in the way your kidneys are working

If you suffer from systemic lupus erythematosus (a disorder of the immune system leading to inflammation and damage to the joints, tendons and organs with symptoms including skin rashes, tiredness, loss of appetite, weight gain and joint pain), this might get worse. Cases of photosensitivity reactions (change in skin appearance) after exposure to the sun or artificial UVA have also been reported.

Some changes may occur in your blood and your doctor may need to give you blood tests to check your condition. The following changes in your blood test results may occur:

- low potassium in the blood,
- low sodium in the blood that may lead to dehydration and low blood pressure, increase in uric acid,
- a substance which may cause or worsen gout (painful joint(s) especially in the feet),
- increase in blood glucose levels in diabetic patients,
- increase of calcium in blood.

Storage and Disposal of Indapamide

- Keep out of the reach and sight of children.
- Do not use Indapamide after the expiry date which is stated on the carton. The expiry date refers to the last day of that month.
- Do not use Indapamide if you notice that the tablets are crumbling, broken or discoloured.
- Do not store above 30°C Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

Product Description

What it looks like

Indapamide tablets are pink, round, deep convex, film-coated tablets and embossed 'I' on one side.

They are available in packs of 60 tablets..

Ingredients

The active substance is Indapamide.

The other ingredients are microcrystalline cellulose, starch, opaglos 6000 white, isopropyl alcohol, magnesium

stearate, colour Ponceau 4R,
HPMC compound mix,
povidone, colloidal silicon
dioxide, lactose.

MAL10110016AC

Manufacturer

Xepa-Soul Pattinson (M) Sdn
Bhd
1-5, Cheng Industrial Estate,
Melaka, Malaysia

Date of Revision

16 April 2012

TABLET GLIKLINE 80MG

Indapamide

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah dia Tablet Indapamide dan apakah kegunaannya
 2. Sebelum anda mengambil Tablet Indapamide
 3. Bagaimana untuk mengambil Tablet Indapamide
 4. Kesan-kesan sampingan yang mungkin berlaku
 5. Bagaimana untuk menyimpan Tablet Indapamide
 6. Maklumat lanjut
- Tablet ini dipanggil Tablet Indapamide di dalam risalah ini.

Apakah kegunaan Indapamide

Indapamide boleh digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi (hipertensi). Ubat ini boleh digunakan secara tunggal atau sebagai kombinasi dengan ubatan lain untuk tekanan darah tinggi.

Bagaimana Indapamide berfungsi

Nama ubat anda adalah Tablet Indapamide 2.5 mg. Ia termasuk dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai diuretik (tablet air).

Sebelum mengambil Indapamide

Bila tidak boleh mengambil
Jangan mengambil Indapamide jika:

- Anda alah (hipersensitif) terhadap Indapamide atau sebarang bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (Lihat Maklumat lanjut). Tanda-tanda alahan termasuk: ruam, kesukaran menelan atau bernafas, Bengkak pada bibir, tekak atau lidah.
- Anda alah (hipersensitif) terhadap ubatan sulphonamide (seperti Co-trimoxazole).
- Anda mengalami strok baru-baru ini.

- Anda pernah mengalami masalah hati yang teruk atau menghidap 'hepatic encephalopathy' (masalah hati yang boleh memberi kesan kepada otak anda dan sistem saraf pusat).
- Anda mempunyai paras kalium yang rendah dalam darah (hypokalaemia). Jangan ambil ubat ini jika keadaan tersebut mempunyai kaitan dengan anda. Jika anda tidak pasti, sila bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Indapamide.

Sebelum mula mengambil

Beri perhatian khusus dan rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini sekiranya:

- Anda mempunyai paras kalium yang rendah dalam darah sebelum ini. Paras kalium yang rendah boleh berlaku kepada individu yang mengalami penyakit jantung atau tekanan darah tinggi.
 - Anda mempunyai masalah gout
 - Anda mempunyai masalah buah pinggang
 - Anda mempunyai masalah kelenjar tiroid yang tidak terkawal (hyperparathyroidism)
 - Anda mengalami masalah denyutan jantung
 - Anda mengalami masalah hati.
- Anda perlu beritahu kepada doktor anda sekiranya anda pernah mengalami reaksi fotosensitiviti. Doktor anda mungkin akan menjalankan ujian darah untuk mengesan sekiranya paras natrium atau kalium yang rendah atau paras kalsium yang tinggi.
- Ubat untuk masalah denyutan jantung seperti (quinidine, hydroquinidine, disopyramide, miodarone, sotalol, ibutilide, dofetilide atau digitalis).
 - Lain-lain tablet larut air (seperti furosemide). Doktor anda mungkin perlu melakukan pantauan yang lebih rapi terhadap anda.
 - Steroid seperti prednisolone atau hydrocortisone.
 - Ubat sembelit.
 - Ubat yang digunakan untuk merawat masalah mental seperti kemurungan, keresahan atau skizofrenia (contohnya ubat anti-kemurungan trisiklik, ubatan antipsykotik, neuroleptik).
 - Moxifloxacin (antibiotik yang digunakan untuk merawat jangkitan).
 - Pentamidine (digunakan untuk merawat sesetengah jenis penyakit pneumonia).

Atlet perlu beraga-jaga di mana ubat ini mengandungi bahan aktif yang boleh memberikan reaksi positif dalam pemeriksaan dadah.

Jika mengambil ubat-ubat lain
Sila maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda sedang atau pernah mengambil ubatan lain kebelakangan ini. Ia termasuklah ubatan yang dibeli tanpa preskripsi termasuklah ubatan herba. Ini kerana Indapamide boleh mempengaruhi kesan sesetengah jenis ubat. Sesetengah jenis ubat lain juga boleh mempengaruhi kesan Indapamide.

Khususnya, maklumkan kepada doktor anda sekiranya anda sedang mengambil ubatan seperti berikut:

- Ubat untuk masalah denyutan jantung seperti (quinidine, hydroquinidine, disopyramide, miodarone, sotalol, ibutilide, dofetilide atau digitalis).
- Lain-lain tablet larut air (seperti furosemide). Doktor anda mungkin perlu melakukan pantauan yang lebih rapi terhadap anda.
- Steroid seperti prednisolone atau hydrocortisone.
- Ubat sembelit.
- Ubat yang digunakan untuk merawat masalah mental seperti kemurungan, keresahan atau skizofrenia (contohnya ubat anti-kemurungan trisiklik, ubatan antipsykotik, neuroleptik).
- Moxifloxacin (antibiotik yang digunakan untuk merawat jangkitan).
- Pentamidine (digunakan untuk merawat sesetengah jenis penyakit pneumonia).

- Mizolastine (digunakan untuk merawat reaksi alahan seperti demam alergi (pernafasan)).
- Ubatan anti-radang yang tidak berdasarkan steroid untuk melegakan kesakitan (contoh: ibuprofen) atau asid asetilsalisilik pada dos yang tinggi (aspirin).
- “angiotensin converting enzyme” (ACE) (digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi dan kegagalan jantung).
- “Oral corticosteroid” yang digunakan untuk merawat pelbagai keadaan termasuk masalah asthma yang serius dan rheumatoid arthritis.
- Baclofen (digunakan untuk merawat kekejangan otot akibat penyakit seperti “multiple sclerosis”)
- “Potassium-sparing diuretics” (amiloride, spironolactone, triamterene)
- Metformin (untuk merawat diabetes).
- Media kontras yang mengandungi iodine (digunakan dalam pengesahan ujian X-ray).
- Tablet kalsium atau lain-lain suplemen berdasarkan kalsium.
- Ciclosporin, tacrolimus atau ubatan lain yang digunakan untuk menurunkan sistem imun selepas pemindahan organ, untuk merawat penyakit auto-imun atau penyakit yang melibatkan komplikasi serius pada sendi atau kulit.
- Tetracosactide (untuk merawat penyakit Chron).

Cara menggunakan Indapamide

- Berapa banyak harus diambil*
Orang dewasa dan warga tua
- Dos biasa ialah satu biji tablet, sekali sehari, diambil pada waktu pagi

Bila perlu diambil
Telan tablet bersama sedikit air.

Berapa lama perlu diambil
Teruskan pengambilan ubat ini sehingga doktor memberitahu anda supaya berhenti. Kesan penuh daripada ubat ini mungkin akan memberi kesan dalam tempoh beberapa bulan selepas pengambilannya.

Jika terlupa mengambil
Sekiranya anda terlupa untuk mengambil tablet ini, jangan gandakan dos untuk menggantikannya.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)
Sekiranya anda mengambil Indapamide melebihi dos yang ditetapkan, maklumkan kepada doktor anda atau pergi ke hospital berhampiran dengan segera. Bawa bersama bungkusan atau baki tablet yang masih tinggal supaya doktor boleh mengetahui ubat yang telah diambil. Pengambilan Indapamide yang terlalu banyak akan menyebabkan anda berasa loya atau muntah, menyebabkan tekanan darah yang rendah, kekejangan, pening, mengantuk, kekeliruan dan perubahan jumlah air kencing yang dihasilkan oleh buah pinggang akibat dehidrasi yang teruk.

Semasa menggunakan Indapamide

Perkara yang perlu dilakukan
Amalkan pengambilan Indapamide seperti yang telah disarankan oleh doktor anda. Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda tidak pasti.

Perkara yang tidak boleh dilakukan
Ubat ini telah dipreskripsikan untuk anda. Jangan berikan kepada orang lain. Ia boleh membahayakan mereka walaupun mereka mempunyai tanda-tanda yang sama seperti anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

- Sekiranya kesan sampingan yang dihadapi bertambah teruk, atau timbul sebarang kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda.
- Doktor anda mungkin pernah memberikan ubat seperti ini daripada syarikat lain. Ia mungkin kelihatan sedikit berbeza. Walaubagaimanapun, kedua-duanya mempunyai kesan yang sama.

Memandu dan mengendalikan mesin:

Indapamide boleh membuatkan anda berasa letih atau pening. Sekiranya keadaan ini berlaku, jangan memandu kenderaan atau mengendalikan sebarang peralatan atau mesin.

Kebiasaannya kesan sampingan ini timbul pada peringkat permulaan rawatan dan selepas peningkatan dos.

Sekiranya anda tidak pasti keadaan di atas mempunyai kaitan dengan anda, bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Indapamide.

Hamil dan menyusu badan

- Bincang dengan doktor anda sebelum memulakan pengambilan ubat ini sekiranya anda sedang hamil, akan hamil atau anda mungkin hamil.
- Jangan ambil ubat ini sekiranya anda menyusukan bayi atau bercadang untuk menyusukan bayi.

Maklumat penting tentang beberapa bahan yang terkandung dalam Indapamide:

Tablet Indapamide 2.5mg mengandungi laktos. Sekiranya anda pernah dimaklumkan oleh doktor bahawa anda tidak boleh menghadam atau tidak tahan kepada sesetengah jenis gula,

bincang dengan doktor anda sebelum mengambil ubat ini.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan yang lain, Indapamide boleh mendatangkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Berhenti mengambil Indapamide dan berjumpa dengan doktor anda atau terus ke hospital sekiranya:

- Anda mengalami pembengkakkan pada bahagian tangan, kaki, buku lali, muka, bibir atau tekak yang akan mengakibatkan kesukaran untuk menelan makanan atau bernafas. Anda juga akan mendapati yang anda mengalami kegatalan dan tompok-tompok ruam yang bengkak (hives) atau ruam gatal (urtikaria). Ini mungkin menandakan anda mengalami reaksi alahan kepada tablet Indapamide.
- Anda mengalami tanda-tanda seperti pengelupasan kulit, tanda-tanda seperti selesema dan suhu badan yang tinggi. Keadaan ini jarang berlaku tetapi ia mungkin merupakan keadaan yang serius yang dikenali sebagai “epidermal necrolysis”.

Maklumkan kepada doktor anda dengan serta-merta sekiranya anda mengalami salah satu daripada kesan-kesan sampingan yang berikut:

- Anda mengalami keletihan, kelesuan, kekeliruan dan otot berasa sakit, kejang atau tidak berfungsi. Keadaan ini mungkin akibat daripada paras natrium yang rendah dalam darah (hyponatraemia).
- Anda berasa tidak selesa dan mengalami sentak pada otot. Keadaan ini mungkin kesan daripada ketidakseimbangan dalam darah yang dikenali sebagai metabolik alkalosis.

- Tompok-tompok ruam dan kegatalan. Anda mungkin mengalami paras suhu badan yang tinggi, sakit tekak, sakit kepala atau cirit-birit.
- Anda mengalami lebih banyak jangkitan daripada biasa atau mudah mendapat lebam. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh masalah dengan darah anda.
- Anda mudah berasa haus, lapar dan kehilangan berat badan. Ini mungkin merupakan tanda-tanda anda menghidap diabetes.

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda sekiranya salah satu daripada kesan sampingan yang dinyatakan menjadi semakin serius atau berlanjutan melebihi beberapa hari. Juga maklumkan kepada mereka sekiranya anda mendapati sebarang kesan sampingan yang tidak dinyatakan dalam panduan ini.

Kesan yang kurang berlaku (berlaku dalam 1 daripada 100 orang):

- Rasa loya dan muntah-muntah.
- Reaksi alahan, terutamanya pada kulit, seperti ruam kulit, purpura (tompokan merah kecil pada kulit) yang berlaku pada pesakit yang lebih kerap mengalami reaksi alahan dan asthma.

Kesan yang jarang berlaku (berlaku dalam 1 daripada 1000 orang):

- Keletihan, pening, sakit kepala, berasa kebas (parestesia);
- Loya, mengalami sembelit, kering pada bahagian mulut;
- Peningkatan risiko dehidrasi yang berlaku kepada pesakit berumur dan juga pesakit yang mengalami kegagalan jantung.

Sangat jarang berlaku (berlaku dalam 1 daripada 10,000 orang):

- Kadar denyutan jantung yang tidak sekata (berdebar-debar), tekanan darah yang rendah;
- Penyakit buah pinggang (menyebabkan tanda-tanda keletihan, kerap untuk membuang air kecil, kegatalan pada kulit, berasa tidak sihat, mengalami bengkak pada tangan dan kaki),
- Pankreatitis (radang pada pankreas yang menyebabkan kesakitan pada bahagian atas abdomen),
- Fungsi hati yang tidak normal (dengan tanda-tanda seperti keletihan, hilang selera makan, rasa loya atau muntah, bengkak pada tangan dan kaki, kulit berwarna kuning). Dalam kes kegagalan fungsi hati, terdapat kemungkinan untuk mengalami “hepatic encephalopathy” (masalah pada bahagian hati yang memberikan kesan terhadap otak dan sistem saraf pusat),
- Perubahan pada sel darah, seperti thrombocytopenia (pengurangan bilangan platlet yang menyebabkan mudah lebam dan pendarahan hidung), leukopenia (pengurangan sel darah putih yang mengakibatkan demam yang tidak diketahui puncanya, sakit tekak atau tanda-tanda selesema – sekiranya keadaan ini berlaku, sila maklumkan kepada doktor anda) dan anemia (pengurangan sel darah merah),
- Angioedema dan/atau urtikaria, kesan alahan yang teruk pada kulit. Ciri-ciri angioedema adalah seperti bengkak pada kulit pada sekitar bahagian mata, bibir, tangan atau kaki. Ia mungkin mengakibatkan bengkak pada bahagian tekak, lidah atau salur pernafasan yang menyebabkan sesak nafas atau kesukaran untuk menelan

makanan. Sekiranya gejala ini berlaku, maklumkan kepada doktor anda dengan segera.

Frekuensi yang tidak diketahui (tidak dapat dianggarkan daripada data sedia ada)

- Kekejangan otot
- Pening, rasa pitam, pengsan apabila bangun atau duduk dengan cepat (akibat tekanan darah yang rendah), hilang selera makan (anorexia), ketidakhadaman.
- Cirit-birit
- Masalah ereksi atau ejakulasi (mati pucuk)
- Rabun jauh secara tiba-tiba (sementara)
- Perubahan pada fungsi buah pinggang

Sekiranya anda menghadapi "systemic lupus erythematosus" (masalah sistem imun yang mengakibatkan keradangan dan kerosakan fungsi sendi, tendon dan organ dengan tanda-tanda seperti ruam kulit, keletihan, hilang selera makan, peningkatan berat badan dan kesakitan sendi), keadaan mungkin semakin teruk. Kes-kes seperti reaksi fotosensitiviti (perubahan pada kulit) selepas terdedah kepada matahari atau sinar UVA tiruan juga pernah direkodkan.

Beberapa perubahan dalam darah mungkin timbul dan doktor mungkin perlu menjalankan ujian darah ke atas anda untuk mengenalpasti keadaan anda. Perubahan-perubahan yang mungkin berlaku kesan daripada ujian darah anda adalah seperti berikut:

- Paras kalium yang rendah dalam darah,
- Paras natrium yang rendah dalam darah yang mungkin mengakibatkan dehidrasi dan tekanan darah rendah, peningkatan asid urik, sejenis bahan yang menyebabkan

atau membawa kesan yang lebih teruk terhadap penyakit gout (kesakitan sendi, terutamanya pada kaki),

- Peningkatan paras glukos dalam darah bagi pesakit diabetes,
- Peningkatan paras kalsium dalam darah.

Cara penyimpanan dan pelupusan Tablet Indapamide

- Jauhkan daripada capaian atau penglihatan kanak-kanak.
- Jangan gunakan Indapamide selepas tarikh luputnya, seperti yang tercatat pada bungkusan. Tarikh luput itu merujuk kepada hari terakhir pada bulan tersebut.
- Jangan gunakan Indapamide sekiranya anda mendapati tablet tersebut hancur, pecah atau luntur warnanya.
- Jangan simpan Tablet Indapamide di atas suhu 30°C. Ubat-ubatan tidak sepatutnya dilupuskan melalui buangan air atau buangan isi rumah. Sila bertanya pada ahli farmasi anda tentang bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu untuk memelihara persekitaran.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Tablet Indapamide berwarna merah jambu, berbentuk bulat, cembung yang dalam, bersalut filem dan diukir 'I' pada permukaan satu belah.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif adalah Indapamide. Bahan-bahan lain adalah: selulos mikrokristalin, kanji, opaglos 6000 putih, isopropyl alcohol, magnesium stearat, warna Ponceau 4R, campuran kompaun HPMC, povidone, silikon dioksida koloid, lactose.

Pengilang

Xepa-Soul Pattinson (M) Sdn Bhd
1-5, Cheng Industrial Estate,
Melaka, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

16 April 2012

MAL10110016AC