

1. Product Name, Active Ingredient(s) and Strength:

LYRICA® capsules 50mg
LYRICA® capsules 75mg
LYRICA® capsules 150mg
Pregabalin

2. What is in this leaflet

In this leaflet:

- What LYRICA is used for
- How LYRICA works
- Before you take LYRICA
 - When you must not take it
 - Before you start to take it
 - Taking other medicines
- How to take LYRICA
 - How much to take
 - When to take it
 - How long to take it
 - If you forget to take it
 - If you take too much (overdose)
- While you are using LYRICA
 - Things you must do
 - Things you must not do
 - Things to be careful of
- Side Effects
- Storage and disposal of LYRICA
- Product description
 - What it looks like
 - Ingredients
 - Registration No.
- Manufacturer
- Market Authorization Holder
- Date of Revision

3. What LYRICA is used for
LYRICA is used to treat:

Neuropathic pain

Pregabalin is indicated for the treatment of peripheral and central neuropathic pain in adults.

Epilepsy

Pregabalin is indicated as adjunctive therapy in adults with partial seizures with or without secondary generalisation.

Generalised Anxiety Disorder

Pregabalin is indicated for the treatment of Generalised Anxiety Disorder (GAD) in adults.

Fibromyalgia

Pregabalin is indicated for the management of fibromyalgia.

4. How LYRICA works

- LYRICA helps decrease the number of nerve signals, and as a result calms down overly sensitive nerve cells..

5. Before you take LYRICA

- ***When you must not take it:***
Do not start taking LYRICA if you are allergic to pregabalin or any of the ingredients in LYRICA. See the end of this leaflet for a complete list of ingredients in LYRICA.

Symptoms of an allergic reaction to LYRICA may include:

- Serious, even life-threatening allergic reactions
- Suicidal thoughts or actions
- Swelling of your hands, legs and feet
- Dizziness and sleepiness

- ***Before you start to take it:***
Tell your healthcare provider about all your medical conditions including if you:

- have or had depression, mood problems or suicidal thoughts or behaviour
- have kidney problems or get kidney dialysis
- have heart problems including heart failure
- have a bleeding problem or a low blood platelet count
- have abused prescription medicines, street drugs, or alcohol in the past
- have ever had swelling in your face, mouth, tongue, lips, gums, neck or throat (angioderma)

- plan to father a child. Animal studies have shown that pregabalin, the active ingredient in LYRICA, made male animals less fertile and caused sperm to change. Also, in animal studies, birth defects were seen in the offspring (babies) of male animals treated with pregabalin. It is not know if these problems can happen in people who take LYRICA.

- **are pregnant or plan to become pregnant. It is not known if LYRICA will harm your unborn baby.** You and your healthcare provider will have to decide if you should take LYRICA while you are pregnant.

- **are breastfeeding. It is not known if LYRICA passes into breast milk and if it can harm your baby.** You and your healthcare provider should discuss whether you should take LYRICA or breast-feed, but you should not do both.

- ***Taking other medicines:***
Tell your healthcare provider about all the medicines you take including prescription and non-prescription medicines, vitamins or herbal supplements. LYRICA and other medicines may affect each other causing side effects.

Especially tell your healthcare provider if you take:

- Angiotension converting enzyme (ACE) inhibitors, which are used to treat many conditions, including high blood pressure. You may have a higher chance for swelling and hives if these medicines are taken with LYRICA. See Section 5 "*When you must not take it*".
- Avandia (rosiglitazone), Avandamet (contains

rosiglitazone and metformin), or Actos (pioglitazone) for diabetes. You may have a higher chance of weight gain or swelling of your hands or feet if these medicines are taken with LYRICA. See Section 8. Side Effects.

- Any medicines that make you sleepy

Know the medicines you take. Keep a list of them with you to show your healthcare provider and pharmacist each time you get a new medicine. Do not start a new medicine without talking with your healthcare provider.

6. How to take LYRICA

• *How much to take:*

- Take LYRICA exactly as prescribed. Your healthcare provider will tell you how much LYRICA to take.
- LYRICA may be taken with or without food.
- Your healthcare provider may change your dose. Do not change your dose without talking to your healthcare provider.

• *When to take it:*

Take LYRICA exactly as prescribed. Your healthcare provider will tell you when to take LYRICA. It is advised to take LYRICA at the same times each day.

• *How long to take it:*

Do not stop taking LYRICA without checking with your healthcare provider. If you stop taking LYRICA suddenly you may have headaches, nausea, diarrhoea or trouble sleeping. If you have epilepsy and you stop taking LYRICA suddenly, you may have seizures more often. Talk with your healthcare provider about how to stop LYRICA slowly.

• *If you forget to take it:*

If you miss a dose, take it as soon as you remember. If it is almost time for your next dose, just skip the missed dose. Take the next dose at your regular time. **Do not take two doses at the same time.**

• *If you take too much (overdose):*

If you take too much LYRICA, call your healthcare provider or poison control center, or go to the nearest emergency room right away.

7. While you are using LYRICA

• *Things you must do:*

Stop taking LYRICA and call your healthcare provider immediately if you have any of these signs of a serious allergic reaction:

- Swelling of your face, mouth, lips, gums, tongue, throat or neck
- Trouble breathing
- Rash, hives (raised bumps) or blisters

Call your healthcare provider immediately if you have any of these symptoms, especially if they are new, worse or worry you:

- Thoughts about suicide or dying
- Trouble sleeping (insomnia)
- Attempts to commit suicide
- New or worse irritability
- New or worse depression
- Acting aggressive, being angry or violent
- New or worse anxiety
- Acting on dangerous impulses
- Feeling agitated or restless
- An extreme increase in activity and talking (mania)
- Panic attacks

- Other unusual changes in behaviour or mood

• *Things you must not do:*

Do not drive a car, work with machines, or do other dangerous activities until you know how LYRICA affects you. Ask your healthcare provider about when it will be okay to do these activities.

Do not drink alcohol while taking LYRICA. LYRICA and alcohol can affect each other and increase side effects such as sleepiness and dizziness.

• *Things to be careful of:*

If you have suicidal thoughts or actions, do not stop LYRICA without first talking to a healthcare provider.

- Stopping LYRICA suddenly can cause serious problems
- Suicidal thoughts or actions can be caused by things other than medicines. If you have suicidal thoughts or actions, your healthcare provider may check for other causes.

How can I watch for early symptoms of suicidal thoughts and actions?

- Pay attention to any changes, especially sudden changes, in mood, behaviours, thoughts or feelings.
- Keep all follow-up visits with your healthcare provider as scheduled.
- Call your healthcare provider between visits as needed, especially if you are worried about symptoms.

8. Side Effects

LYRICA may cause serious side effects, including:

- **Muscle problems, muscle pain, soreness, or weakness.** If you have these symptoms, especially if you feel sick and have a fever, tell your healthcare provider right away

- **Problems with your eyesight, including blurry vision.** Call your healthcare provider if you have any changes in your eyesight.
- **Weight gain.** If you have diabetes, weight gain may affect the management of your diabetes. Weight gain can also be a serious problem for people with heart problems.
- **Feeling “high”**

The most common side effects of LYRICA include:

- Dizziness
- Trouble concentrating
- Blurry vision
- Swelling of hands and feet
- Weight gain
- Dry mouth
- Sleepiness

LYRICA caused skin sores in animal studies. Skin sores did not happen in studies in people. If you have diabetes, you should pay attention to your skin while taking LYRICA and tell your healthcare provider about any sores or skin problems.

Tell your healthcare provider about any side effect that bothers you or that does not go away.

These are not all the possible side effects of LYRICA. For more information, ask your healthcare provider or pharmacist. Call your

doctor for medical advice about side effects.

9. Storage and disposal of LYRICA

- Store LYRICA capsules at room temperature, 15°C to 30°C in its original package.
- Safely throw away any LYRICA that is out of date or no longer needed
- **Keep LYRICA and all medicines out of the reach of children.**

10. Product description

• **What it looks like**

- 50mg hard capsules
White, marked “Pfizer” on the cap and “PGN 50” on the body with black ink. The body is also marked with a black band.
- 75mg hard capsules
White and orange, marked “Pfizer” on the cap and “PGN 75” on the body with black ink.
- 150mg hard capsules
White, marked “Pfizer” on the cap and “PGN 150” on the body with black ink.

• **Ingredients**

- Active ingredient is pregabalin
- List of excipients
Capsule content: Lactose monohydrate, Maize starch, Talc
Capsule shell: Gelatin, Titanium Dioxide (E171),

Sodium Laurilsulphate, Silica, colloidal
Anhydrous, Purified water,
Red Iron Oxide (E172) (only for 75mg capsules)
Printing Ink: Shellac, Black Iron Oxide (E172), Propylene Glycol, Potassium Hydroxide

• **Registration Number**
Product Name
Registration Number

LYRICA 50mg
MAL20081830A
LYRICA 75mg
MAL20081831A
LYRICA 150mg
MAL20081832A

11. Manufacturer

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Betriebsstätte Freiburg
Mooswaldallee 1
79090 Freiburg, Germany

12. Marketing Authorization Holder

MAH Holder/ Imported by:
Pfizer (M) Sdn. Bhd.
Level 9-2, 10 & 11,
Wisma Averis, Tower 2,
Avenue 5, Bangsar South,
No. 8 Jalan Kerinchi,
59200 Kuala Lumpur, Malaysia.

13. Date of Revision

1st March 2013

PIL-LYR-0313

1. Nama Produk, Bahan-bahan Aktif dan Kekuatan:

LYRICA® kapsul 50mg
LYRICA® kapsul 75mg
LYRICA® kapsul 150mg
Pregabalin

2. Apakah isi kandungan risalah ini

Dalam risalah ini:

- Apakah kegunaan LYRICA
- Bagaimana LYRICA berfungsi
- Sebelum anda mengambil LYRICA
 - Bilakah anda tidak harus mengambil ia
 - Sebelum anda mula mengambil ia
 - Mengambil ubat-ubat lain
- Bagaimana untuk menggunakan LYRICA
 - Apakah kuantiti yang anda harus ambil
 - Bilakah masa untuk mengambil ia
 - Berapa lama untuk mengambil ia
 - Sekiranya anda terlupa untuk mengambil ia
 - Sekiranya anda mengambil terlalu banyak (berlebihan)
- Semasa anda menggunakan LYRICA
 - Perkara yang anda mesti lakukan
 - Perkara yang anda tidak boleh lakukan
 - Perkara yang anda harus berhati-hati
- Kesan-kesan Sampingan
- Penyimpanan dan Pelupusan LYRICA
- Penerangan produk
 - Apakah bentuk ia
 - Bahan-bahan
 - No. MAL
- Pengilang
- Pemegang Hak Pemasaran
- Tarikh Semakan

3. Apakah kegunaan LYRICA LYRICA digunakan untuk merawat:

Kesakitan sistem saraf

Pregabalin digunakan untuk merawat kesakitan sistem saraf periferi dan pusat dalam pesakit dewasa.

Epilepsi

Pregabalin digunakan untuk terapi adjung dalam rawatan sawan separa dengan/tanpa generalisasi sekunder dalam pesakit dewasa.

Gangguan keresahan umum

Pregabalin digunakan untuk rawatan gangguan keresahan umum dalam pesakit dewasa.

Fibromyalgia

Pregabalin digunakan untuk pengurusan fibromyalgia.

4. Bagaimana LYRICA berfungsi

- LYRICA mengurangkan bilangan isyarat sarat dan membantu untuk menenangkan sel-sel saraf yang terlalu sensitif.

5. Sebelum anda mengambil

LYRICA

- ***Bilakah anda tidak harus mengambil ia:***
Jangan mula mengambil LYRICA sekiranya anda alah terhadap Pregabalin atau apa-apa bahan yang terkandung dalam LYRICA. Lihat bahagian akhir risalah ini untuk senarai lengkap bahan-bahan dalam LYRICA.

Gejala-gejala reaksi alahan terhadap LYRICA mungkin termasuk:

- Reaksi alahan yang serius, bahkan mengancam nyawa
- Pemikiran atau tindakan membunuh diri
- Bengkak pada tangan, kaki dan tapak kaki
- Pening dan mengantuk

- ***Sebelum anda mula mengambil ia:***
Beritahu penyedia penjagaan

kesihatan anda tentang semua keadaan perubatan anda termasuk jika anda:

- Mengalami atau pernah mengalami masalah perasaan atau pemikiran atau kelakuan membunuh diri
- Mempunyai masalah buah pinggang atau mendapat dialisis buah pinggang
- Mempunyai masalah jantung termasuk kegagalan jantung
- Mempunyai masalah pendarahan atau bilangan platelet darah yang rendah
- Pernah menyalahgunakan ubat preskripsi, dadah jalanan, atau alkohol sebelum ini
- Pernah bengkak di bahagian muka, mulut, lidah, bibir, gusi, leher atau tekak (angioderma) anda
- merancang untuk menjadi seorang bapa. Kajian haiwan telah menunjukkan bahawa Pregabalin, iaitu bahan aktif dalam LYRICA, boleh mengakibatkan haiwan jantan menjadi kurang subur dan menyebabkan perubahan dalam sperma. Juga, dalam kajian haiwan, kecacatan pembiakan berlaku di kalangan anak-anak (bayi) haiwan jantan yang dirawat dengan Pregabalin. Ia tidak diketahui sama ada masalah-masalah ini boleh berlaku ke atas manusia yang mengambil LYRICA.
- **anda hamil atau merancang untuk**

mengandung. Ia tidak diketahui sama ada LYRICA akan membahayakan bayi dalam kandungan anda. Anda dan penyedia penjagaan kesihatan anda perlu memutus sama ada anda harus mengambil LYRICA semasa kehamilan.

- **sedang menyusu bayi. Ia tidak diketahui sama ada LYRICA boleh disalurkan melalui susu ibu dan sama ada ia boleh membahayakan bayi anda.** Anda dan penyedia penjagaan kesihatan anda perlu berbincang sama ada anda harus mengambil LYRICA atau memberi susu badan, tetapi anda tidak harus melakukan kedua-duanya sekali.

- **Mengambil ubat-ubat lain: Beritahu penyedia penjagaan kesihatan anda tentang semua ubat yang anda ambil termasuk ubat-ubat preskripsi dan bukan preskripsi, vitamin atau makanan tambahan herba. LYRICA dan ubat-ubat lain mungkin saling mempengaruhi antara satu sama lain dan mengakibatkan kesan-kesan sampingan.**

Terutamanya beritahu penyedia penjagaan kesihatan anda sekiranya anda mengambil:

- Perencat enzim penukar angiotensin (ACE), yang digunakan untuk merawat banyak keadaan, termasuk tekanan darah tinggi. Anda mungkin mempunyai peluang mengalami masalah bengkak dan gatal-gatal yang lebih tinggi sekiranya ubat ini diambil bersama LYRICA.

Lihat Seksyen 5 "*Bilakah anda tidak harus mengambil ia*".

- Avandia (rosiglitazone), Avandamet (mengandungi rosiglitazone dan metformin), atau Actos (pioglitazone) untuk diabetes. Anda mungkin mempunyai peluang penambahan berat badan atau bengkak pada bahagian tangan atau kaki yang lebih tinggi sekiranya ubat ini diambil bersama LYRICA. Lihat Seksyen 8. Kesan-kesan sampingan.
- Sebarang ubat yang boleh mengakibatkan anda mengantuk

Ketahui ubat-ubat yang anda ambil. Simpan satu senarai ubat-ubat ini bersama anda untuk menunjukkan kepada penyedia penjagaan kesihatan dan ahli farmasi anda setiap kali anda mendapatkan ubat baru. Jangan mulakan ubat baru tanpa berbincang dengan penyedia penjagaan kesihatan anda.

6. Bagaimana untuk menggunakan LYRICA

- **Apakah kuantiti yang anda harus ambil:**
 - Mengambil LYRICA tepat sebagaimana yang ditetapkan. Penyedia penjagaan kesihatan anda akan memberitahu anda berapa banyak LYRICA yang perlu untuk diambil.
 - LYRICA mungkin boleh diambil dengan atau tanpa makanan.
 - Penyedia penjagaan kesihatan anda mungkin menukar dos anda. Jangan menukar dos anda tanpa berbincang dengan penyedia penjagaan kesihatan anda.

- **Bilakah masa untuk mengambil ia:** Mengambil LYRICA tepat sebagaimana yang ditetapkan. Penyedia penjagaan kesihatan anda akan memberitahu anda bila untuk mengambil LYRICA. Ia adalah dinasihatkan untuk mengambil LYRICA pada masa yang sama setiap hari.

- **Berapa lama untuk mengambil ia:** **Jangan berhenti mengambil LYRICA tanpa memeriksa dengan penyedia penjagaan kesihatan anda.** Jika anda berhenti mengambil Lyrica secara tiba-tiba, anda mungkin mengalami masalah sakit kepala, loya, cirit-birit atau masalah tidur. Sekiranya anda mempunyai epilepsi dan berhenti mengambil LYRICA secara tiba-tiba, anda mungkin mengalami sawan yang lebih kerap. Berbincang dengan penyedia penjagaan kesihatan anda tentang bagaimana untuk menghentikan LYRICA secara perlahan.

- **Sekiranya anda terlupa untuk mengambil ia:** Jika anda tertinggal satu dos, ambil secepat mungkin sebaik sahaja anda ingat. Sekiranya ia hampir masa untuk dos seterusnya, hanya melangkau dos yang tertinggal. Ambil dos yang seterusnya mengikut masa yang ditetapkan. **Jangan mengambil dua dos pada masa yang sama.**

- **Sekiranya anda mengambil terlalu banyak (berlebihan):** Jika anda mengambil LYRICA yang berlebihan, hubungi penyedia penjagaan kesihatan anda atau pusat kawalan racun, atau memasuki bilik kecemasan terdekat dengan segera.

7. Semasa anda menggunakan LYRICA

- **Perkara yang anda mesti lakukan:**

Berhenti mengambil LYRICA dan hubungi penyedia penjagaan kesihatan anda dengan segera sekiranya anda mempunyai sebarang tanda reaksi alahan yang serius:

- Bengkak pada muka, mulut, bibir, gusi, lidah, tekak atau leher anda
- Masalah pernafasan
- Ruam, gatal-gatal (bengkak tertimbul) atau lepuh

Hubungi penyedia penjagaan kesihatan anda dengan segera sekiranya anda mempunyai mana-mana gejala berikut, terutamanya jika ia adalah baru, lebih teruk atau membimbangkan anda:

- Pemikiran bunuh diri atau mati
- Masalah tidur (insomnia)
- Percubaan untuk membunuh diri
- Kerengsaan baru atau lebih teruk
- Kemurungan yang baru atau lebih teruk
- Bertindak agresif, marah atau ganas
- Kebimbangan yang baru atau lebih teruk
- Bertindak atas impuls berbahaya
- Rasa resah atau gelisah
- Peningkatan melampau dari segi kegiatan dan pertuturan (mania)
- Serangan panik
- Perubahan-perubahan tingkah laku dan perasaan yang luar biasa

- **Perkara yang anda tidak boleh lakukan:**

Jangan memandu, mengendalikannya mesin, atau melakukan aktiviti-aktiviti lain yang boleh membahayakan anda sehingga anda mengetahui

kesan-kesan LYRICA terhadap anda. Tanya penyedia penjagaan kesihatan anda tentang masa yang sesuai bagi anda untuk melakukan aktiviti-aktiviti ini.

Jangan minum alkohol ketika mengambil LYRICA. LYRICA dan alkohol boleh saling mempengaruhi antara satu sama lain dan meningkatkan kesan sampingan seperti mengantuk dan pening kepala.

- **Perkara yang anda harus berhati-hati:**

Sekiranya anda mempunyai pemikiran atau tindakan membunuh diri, jangan berhenti mengambil LYRICA tanpa berbincang dengan penyedia penjagaan kesihatan terlebih dahulu.

- Berhenti mengambil LYRICA secara tiba-tiba boleh mengakibatkan masalah yang serius.
- Pemikiran atau tindakan membunuh diri mungkin disebabkan oleh perkara-perkara lain daripada ubat-ubat. Jika anda mempunyai pemikiran atau tindakan membunuh diri, penyedia penjagaan kesihatan anda mungkin akan memeriksa sebab-sebab lain.

Bagaimana saya boleh melihat gejala awal pemikiran dan tindakan membunuh diri?

- Memberi perhatian terhadap sebarang perubahan, terutamanya perubahan secara tiba-tiba, dari segi modus, tingkah laku, pemikiran atau perasaan.
- Pastikan semua lawatan susulan dengan penyedia penjagaan kesihatan anda dibuat seperti yang dijadualkan.

- Hubungi penyedia penjagaan kesihatan anda antara masa lawatan seperti yang diperlukan, terutamanya jika anda risau tentang simptom-simptom ini.

8. Kesan-kesan Sampingan

LYRICA mungkin mengakibatkan kesan sampingan yang serius, termasuk:

- **Masalah otot, sakit otot, kesakitan, atau kelemahan.** Jika anda mempunyai gejala-gejala ini, terutamanya jika anda rasa sakit dan demam, beritahu penyedia penjagaan kesihatan anda dengan segera
- **Masalah-masalah penglihatan anda, termasuk penglihatan menjadi kabur.** Hubungi penyedia penjagaan kesihatan anda sekiranya anda mengalami sebarang perubahan dalam penglihatan anda.
- **Peningkatan Berat Badan.** Jika anda mempunyai diabetes, peningkatan berat badan mungkin menjejaskan pengurusan diabetes anda. Peningkatan berat badan juga boleh mengakibatkan masalah yang serius untuk orang-orang yang mempunyai masalah jantung.
- **Rasa “gembira”**

Kesan-kesan sampingan LYRICA yang paling biasa termasuk:

- Rasa Pening
- Masalah menumpukan perhatian
- Penglihatan menjadi kabur
- Bengkak pada tangan dan kaki
- Berat Badan Bertambah
- Mulut menjadi kering
- Mengantuk

LYRICA mengakibatkan luka-luka pada kulit dalam kajian haiwan. Tiada luka pada kulit didapati dalam kajian manusia. Jika anda menghidap penyakit diabetes, anda perlu memberi perhatian terhadap kulit anda ketika mengambil LYRICA dan beritahu penyedia penjagaan kesihatan anda

tentang sebarang luka atau masalah kulit.

Beritahu penyedia penjagaan kesihatan anda tentang sebarang kesan sampingan yang mengganggu anda atau yang tidak hilang.

Ini bukannya semua kesan sampingan LYRICA yang mungkin berlaku. Untuk maklumat lanjut, sila berjumpa dengan penyedia penjagaan kesihatan atau ahli farmasi. Hubungi doktor anda untuk nasihat perubatan tentang kesan-kesan sampingan.

9. Penyimpanan dan Pelupusan LYRICA

- Menyimpan kapsul LYRICA pada suhu bilik, 15°C hingga 30°C dalam pakej asalnya.
- Melupuskan semua LYRICA yang sudah luput tarikh atau tidak diperlukan lagi dengan selamat
- **Menyimpan LYRICA dan semua ubat berjauhan daripada jangkauan kanak-kanak.**

10. Penerangan produk

- **Apakah bentuk ia**
 - Kapsul keras 50mg Putih, bertanda "Pfizer" pada penutup dan "PGN 50" pada bekas dengan dakwat hitam. Bekas juga ditandakan dengan jalur hitam.
 - Kapsul keras 75mg Putih dan oren, bertanda "Pfizer" pada penutup dan "PGN 75" pada bekas dengan dakwat hitam.
 - Kapsul keras 150mg Putih, bertanda "Pfizer" pada penutup dan "PGN 150" pada bekas dengan dakwat hitam.

- **Bahan-bahan**

- Bahan aktif adalah Pregabalin
- Senarai eksipien
Kandungan kapsul: Laktosa Monohidrat, Kanji Jagung, Talkum
Kulit kapsul: Gelatin, Titanium Dioksida (E171), Natrium Lauril Sulfat, Silika Koloid, Kontang, Air Tulen, Oksida Besi Merah (E172) (hanya untuk kapsul 75mg)

Ink Percetakan: Syelek, Hitam Oksida Besi (E172), Propilena Glikol, Kalium Hidroksida

- **Nombor Pendaftaran Nama Produk Nombor Pendaftaran**

LYRICA 50mg
MAL20081830A
LYRICA 75mg
MAL20081831A
LYRICA 150mg
MAL20081832A

11. Pengilang

Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Betriebsstätte Freiburg
Mooswaldallee 1
79090 Freiburg, Germany

12. Pemegang Hak Pemasaran

MAH Holder/ Imported by:
Pfizer (M) Sdn. Bhd.
Level 9-2, 10 & 11,
Wisma Averis, Tower 2,
Avenue 5, Bangsar South,
No. 8 Jalan Kerinchi,
59200 Kuala Lumpur, Malaysia.

13. Tarikh Semakan

1 Mac 2013

PIL-LYR-0313