



**Biro Pengawasan Farmaseutikal Kebangsaan**  
National Pharmaceutical Control Bureau  
**KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA**  
MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

Ruj.Kami : (100) dlm.BPFK/17/FV/4-34  
Tarikh : 31 JAN 2012

**AstraZeneca Sdn Bhd**  
Level 12, Surian Tower,  
1, Jalan PJU 7/3,  
Mutiara Damansara,  
47810 Petaling Jaya,  
Selangor.

Tuan/Puan,

**RISALAH MAKLUMAT UBAT PENGGUNA (RiMUP)**

**1. NAMA PRODUK: Seperti Di Lampiran A**

---

Saya merujuk kepada perkara diatas.

2. Semakan telah dibuat bagi draf Risalah Maklumat Ubat Pengguna (RiMUP) untuk ubat-ubat seperti yang dilampirkan dan didapati risalah ini mematuhi garis panduan yang ditetapkan dan boleh digunakan.
3. Pihak tuan/puan perlu mengemukakan permohonan variasi bagi mengemaskini RiMUP melalui sistem QUEST dan melampirkan surat kelulusan ini dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat ini.

Sekian Terima Kasih

**“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”**

Saya yang menurut perintah,

**(ROKIAH ISAHAK)**

Ketua Penolong Pengarah Kanan  
Seksyen Farmakovigilans  
b.p. Timbalan Pengarah  
Pusat Pasca Pendaftaran Produk  
Biro Pengawasan Farmaseutikal Kebangsaan  
Kementerian Kesihatan Malaysia

sk. Ketua Seksyen Variasi



Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan  
National Pharmaceutical Control Bureau  
**KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA**  
MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

**LAMPIRAN A**

<b>BIL</b>	<b>NAMA PRODUK</b>	<b>NO. PENDAFTARAN</b>
1	Tenoret 50	MAL19871033A
2	Plendil 2.5mg	MAL19940655A
3	Plendil 5mg	MAL19972986A
4	Plendil 10mg	MAL19972985A
5	Tenoretic	MAL19871032A
6	Crestor 5mg	MAL20051356AR
7	Crestor 10mg	MAL20041089AR
8	Crestor 20mg	MAL20051357AR
9	Nexium MUPS 20mg	MAL20020238AR
10	Nexium MUPS 40mg	MAL20020239AR
11	Oxis Turbuhaler 4.5mcg/dos	MAL19991002A
12	Oxis Turbuhaler 9mcg/dos	MAL19991003A
13	Tenormin 50mg	MAL19870055AR
14	Tenormin 100mg	MAL19870056AR
15	Seroquel XR Extended Release Tablet 50mg	MAL09011462A
16	Seroquel XR Extended Release Tablet 200mg	MAL09011463A
17	Seroquel XR Extended Release Tablet 300mg	MAL09011464A
18	Seroquel XR Extended Release Tablet 400mg	MAL09011465A
19	Losex MUPS 10mg Tablet	MAL19992064A
20	Losex MUPS 20mg Tablet	MAL19992065A
21	Bricanyl Turbuhaler 0.5mg/dose	MAL19900213A
22	Rhinocort Aqua 64mcg/dos	MAL20000013A

## PATIENT INFORMATION LEAFLET

### Tenoretic tablet

atenolol 100 mg  
chlortalidone 25 mg

#### Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.
- If any of the side effects get serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

#### What Tenoretic is used for

Tenoretic is used to treat high blood pressure (hypertension). It contains two different medicines: atenolol and chlortalidone. These medicines work together to lower your blood pressure.

#### How Tenoretic works

Atenolol belongs to a group of medicines called beta-blockers. It works by making your heart beat more slowly and with less force.

Chlortalidone belongs to a group of medicines called diuretics. It works by increasing the amount of urine produced by your kidneys.

#### Before you take Tenoretic

##### *When you must not take it*

Do not take Tenoretic if:

- You are allergic (hypersensitive) to Tenoretic, Tenoret 50, Tenormin, atenolol, or chlortalidone.
- You are allergic to any of the other ingredients in your medicine.
- You have ever had any of the following heart problems:
  - heart failure which is not under control (this usually makes you breathless and causes your ankles to swell)
  - second- or third-degree heart block (a condition which may be treated by a pacemaker)
  - very slow or very uneven heart beats, very low blood pressure or very poor circulation.
- You have problems with your kidneys.
- You have a tumour called phaeochromocytoma that is not being treated. This is usually near your kidney and can cause high blood pressure.
- You have been told that you have higher than normal levels of acid in your blood (metabolic acidosis).
- You have not been eating much recently.
- You are pregnant, are trying to become pregnant or are breast-feeding.

Do not take Tenoretic if any of the above apply to you. If you are not sure, talk to your doctor or pharmacist before taking Tenoretic.

### ***Before you start to take it***

Check with your doctor or pharmacist before taking Tenoretic if:

- You have asthma, wheezing or any other similar breathing problems, or you get allergic reactions, for example to insect stings. If you have ever had asthma or wheezing, do not take this medicine without first checking with your doctor.
- You have a type of chest pain (angina) called Prinzmetal's angina.
- You have poor blood circulation or controlled heart failure.
- You have first-degree heart block.
- You have diabetes. Your medicine may change how you respond to having low blood sugar. You may feel your heart beating faster.
- You have thyrotoxicosis (a condition caused by an overactive thyroid gland). Your medicine may hide the symptoms of thyrotoxicosis.

If you are not sure if any of the above apply to you, talk to your doctor or pharmacist before taking Tenoretic.

### ***Taking other medicines***

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking, or have recently taken, any other medicines. This includes medicines that you buy without a prescription and herbal medicines. This is because Tenoretic can affect the way some other medicines work and some medicines can have an effect on Tenoretic.

In particular, tell your doctor if you are taking any of the following medicines:

- Clonidine (for high blood pressure or migraine). If you are taking clonidine and Tenoretic together, do not stop taking clonidine unless your doctor tells you to do so. If you have to stop taking clonidine, your doctor will give you careful instructions about how to do it.
- Verapamil, diltiazem and nifedipine (for high blood pressure or chest pain).
- Disopyramide or amiodarone (for an uneven heart beat).
- Digoxin (for heart problems).
- Adrenaline, also known as epinephrine (a medicine that stimulates the heart).
- Ibuprofen or indometacin (for pain and inflammation).
- Insulin or medicines that you take by mouth for diabetes.
- Lithium (for certain mental illnesses).
- Medicines to treat nose or sinus congestion or other cold remedies (including those you can buy in the pharmacy).

### **How to take Tenoretic**

#### ***How much to take***

Always take Tenoretic exactly as your doctor has told you. You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

#### Adults

The usual dose for an adult is one tablet each day.

#### Children

Your medicine must not be given to children.

**When to take it**

Your doctor will tell you how many tablets to take each day and when to take them. Read the label on the carton to remind you what the doctor said.

Swallow your Tenoretic tablet with a drink of water.

**How long to take it**

Do not stop taking Tenoretic without talking to your doctor. In some cases, you may need to stop taking it gradually.

**If you forget to take it**

If you forget to take a dose, take it as soon as you remember. However, if it is almost time for the next dose, skip the missed dose. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

**If you take too much (overdose)**

If you take more Tenoretic than prescribed by your doctor, talk to a doctor or go to a hospital straight away. Take the medicine pack with you so that the tablets can be identified.

**While you are using Tenoretic****Things you must do**

Take your medication as advised by your doctor or pharmacist.

**Things you must not do**

Do not stop taking the medication unless being told by your doctor or pharmacist.

**Things to be careful of**Operations

- If you go into hospital to have an operation, tell the anaesthetist or medical staff that you are taking Tenoretic. This is because you can get low blood pressure (hypotension) if you are given certain anaesthetics while you are taking Tenoretic.

Pregnancy and breast-feeding

- Do not take Tenoretic if you are pregnant or trying to get pregnant.
- Do not take Tenoretic if you are breast-feeding.

Driving and using machines

- Your medicine is not likely to affect you being able to drive or use any tools or machines. However, it is best to wait to see how your medicine affects you before trying these activities.
- If you feel dizzy or tired when taking this medicine, ask your doctor for advice.

**Side effects**

Like all medicines, Tenoretic can cause side effects, although not everybody gets them.

Allergic reactions:

If you have an allergic reaction, see a doctor straight away. The signs may include raised lumps on your skin (weals) or swelling of your face, lips, mouth, tongue or throat.

Other possible side effects:

Common (affects less than 1 in 10 people)

- Cold hands and feet.

- You may notice that your pulse rate becomes slower while you are taking the tablets. This is normal, but if you are concerned please tell your doctor about it.
- Diarrhoea.
- Feeling sick (nausea).
- Feeling tired.
- Changes in the amount of certain substances in your blood. It can cause:
  - higher levels of sugar (glucose) than normal,
  - low levels of sodium, which may cause weakness, being sick (vomiting) and cramps,
  - low levels of potassium,
- an increase in the amount of uric acid.  
Your doctor may take blood samples every so often to check on these levels.

#### Uncommon (affects less than 1 in 100 people)

- Disturbed sleep.

#### Rare (affects less than 1 in 1,000 people)

- Heart block (which can cause an abnormal heart beat, dizziness, tiredness or fainting).
- Numbness and spasm in your fingers which is followed by warmth and pain (Raynaud's disease).
- Dizziness (particularly when standing up).
- Headache.
- Feeling confused.
- Changes in personality (psychoses) or hallucinations.
- Mood changes.
- Nightmares.
- Dry mouth.
- Thinning of your hair.
- Dry eyes.
- Skin rash.
- Tingling of your hands.
- Disturbances of vision.
- Bruising more easily or purplish marks on your skin.
- Being unable to get an erection (impotence).
- Jaundice (causing yellowing of your skin or the whites of your eyes).
- Pancreatitis (inflammation of a large gland behind the stomach).
- A reduced number of white blood cells.

#### Very rare (affects less than 1 in 10,000 people)

- Changes to some of the cells or other parts of your blood. Your doctor may take blood samples every so often to check whether Tenoretic has had any effect on your blood.

#### Conditions that may get worse

If you have any of the following conditions, they may get worse when you start to take your medicine. This happens rarely affecting less than 1 in 1,000 people:

- Psoriasis (a skin condition).
- Being short of breath or having swollen ankles (if you have heart failure).
- Asthma or breathing problems.
- Poor circulation.

Do not be concerned by this list of side effects. You may not get any of them. If any of the side effects get serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

### **Storage and Disposal of Tenoretic**

Keep your medicine in a safe place where children cannot see or reach it. Your medicine could harm them.

Do not store above 25°C. Store your tablets in the original package. Keep the blister strip in the carton. This will protect your medicine from light and moisture.

Do not use your tablets after the expiry date which is stated on the blister strip and carton. The expiry date refers to the last day of that month.

### **Product description**

Tenoretic Film-coated Tablets are brown. They come in a pack (blister strip) containing 28 tablets.

### **Ingredients**

The active substances are atenolol and chlortalidone. Each tablet contains 100 mg (milligrams) of atenolol and 25 mg of chlortalidone.

The other ingredients are gelatin, iron oxide, macrogol, magnesium carbonate, magnesium stearate, methylhydroxypropylcellulose, sodium laurilsulfate and maize starch.

### **Malaysian registration number:**

Tenoretic: MAL19871032A

### **Manufacturer**

AstraZeneca UK Limited, Macclesfield, Cheshire, UK

### **Date of revision**

The text was revised in September 2011

CV.000-680-635.2.0

## RISALAH MAKLUMAT UNTUK PESAKIT

### Tablet Tenoretic

atenolol 100 mg,  
chlortalidone 25 mg

**Bacalah seluruh risalah ini dengan teliti sebelum anda mula menggunakan ubat ini.**

- Simpan risalah ini. Anda mungkin perlu membacanya lagi.
- Jika anda ragu-ragu, tanyalah doktor atau ahli farmasi.
- Ubat ini dipreskripsikan untuk anda. Jangan beri orang lain. Ubat ini boleh memudaratkan mereka, walaupun simptom mereka sama seperti simptom anda.
- Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda perhatikan kesan sampingan yang tidak tersenarai di dalam risalah ini, beritahulah doktor atau ahli farmasi.

### Kegunaan Tenoretic

Tenoretic digunakan untuk merawat tekanan darah yang tinggi (hipertensi). Tenoret 50 mengandungi dua ubat yang berlainan: atenolol dan chlortalidone. Ubat-ubat ini sama-sama bertindak untuk menurunkan tekanan darah anda.

### Cara Tenoretic bertindak

Atenolol tergolong dalam kumpulan ubat yang digelar penyekat beta. Ubat ini bertindak dengan mengurangkan kelajuan dan kekuatan degupan jantung.

Chlortalidone terangkum dalam kumpulan ubat yang digelar diuretik. Chlortalidone bertindak dengan meningkatkan jumlah air kencing yang dihasilkan oleh ginjal (buah pinggang).

### Sebelum anda memakan Tenoretic

#### ***Larangan menggunakan ubat ini***

Jangan makan Tenoretic jika:

- Anda alah (hiperpeka) terhadap Tenoretic, Tenoret 50, Tenormin, atenolol, atau chlortalidone.
- Anda alah terhadap mana-mana ramuan lain di dalam ubat ini.
- Anda pernah mengalami mana-mana masalah jantung yang berikut:
  - kegagalan jantung yang tidak dapat dikawal (ini biasanya akan menyebabkan sesak nafas dan bengkak pada pergelangan kaki)
  - sekat jantung tahap kedua atau ketiga (masalah yang boleh dirawat dengan perentak jantung)
  - degupan jantung yang sangat perlahan atau yang sangat tidak sekata, tekanan darah yang sangat rendah atau peredaran darah yang sangat buruk
- Anda mengalami masalah pada ginjal.
- Anda mempunyai tumor yang digelar feokromositoma yang tidak dirawat. Tumor ini biasanya tumbuh berhampiran ginjal dan boleh menyebabkan tekanan darah yang tinggi.
- Anda diberitahu bahawa aras asid di dalam darah anda lebih tinggi daripada aras normal (asidosis metabolik).
- Anda kurang makan baru-baru ini.
- Anda sedang hamil, sedang cuba untuk menjadi hamil, atau sedang menyusukan anak dengan susu badan.



Jangan makan Tenoretic jika mana-mana perkara tadi berkenaan dengan anda. Jika anda kurang pasti, bincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum memakan Tenoretic.

### ***Sebelum anda mula menggunakannya***

Minta nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum memakan Tenoretic jika:

- Anda menghidap asma, nafas berdehit atau masalah pernafasan yang lain seumpamanya, atau anda mengalami tindak balas alergi, misalnya terhadap sengat serangga. Jika anda pernah menghidap asma atau nafas berdehit, jangan makan ubat ini tanpa menanya doktor dahulu.
- Anda mengalami jenis sakit dada (angina) yang digelar angina Prinzmetal.
- Anda mengalami peredaran darah yang kurang baik atau kegagalan jantung yang terkawal.
- Anda menghidap sekat jantung tahap pertama.
- Anda menghidap diabetes. Ubat ini mungkin mengubah gerak balas anda terhadap masalah gula darah yang rendah. Anda mungkin merasakan bahawa jantung anda berdegup dengan lebih pantas.
- Anda menghidap tirotoksikosis (sejenis penyakit yang disebabkan oleh kelenjar tiroid yang terlebih aktif). Ubat ini mungkin akan menyembunyikan simptom-simptom tirotoksikosis.

Jika anda kurang pasti sama ada anda mengalami mana-mana masalah tadi, bincanglah dengan doktor atau ahli farmasi sebelum memakan Tenoretic.

### ***Menggunakan ubat lain***

Beritahu doktor anda atau ahli farmasi jika anda sedang atau baru-baru ini telah memakan ubat lain. Ini merangkumi ubat yang anda beli tanpa preskripsi dan juga ubat-ubatan herba. Ini kerana Tenoretic boleh menjejaskan tindakan sesetengah jenis ubat dan sesetengah jenis ubat boleh menjejaskan tindakan Tenoretic.

Khususnya, beritahulah doktor jika anda memakan mana-mana ubat yang berikut:

- Clonidine (untuk merawat tekanan darah tinggi atau migrain). Jika anda memakan clonidine bersama-sama Tenoretic, jangan berhenti memakan clonidine melainkan diarahkan oleh doktor. Jika anda perlu berhenti memakan clonidine, doktor akan memberi anda arahan yang teliti tentang cara berhenti.
- Verapamil, diltiazem dan nifedipine (untuk merawat tekanan darah tinggi atau sakit dada).
- Disopyramide atau amiodarone (untuk merawat degupan jantung yang tidak sekata).
- Digoxin (untuk merawat masalah jantung).
- Adrenaline, juga digelar epinephrine (sejenis ubat yang merangsang jantung).
- Ibuprofen atau indometacin (untuk merawat rasa sakit dan radang).
- Insulin atau ubat yang anda makan untuk merawat diabetes.
- Litium (untuk merawat penyakit-penyakit mental yang tertentu).
- Ubat yang digunakan untuk merawat hidung atau sinus yang tersumbat atau penawar selesema yang lain (termasuk ubat yang boleh anda beli di farmasi).

### **Cara memakan Tenoretic**

#### ***Jumlah yang perlu dimakan***

Makanlah Tenoretic tepat-tepat seperti yang diarahkan oleh doktor. Tanyalah doktor atau ahli farmasi jika anda kurang pasti.

#### Orang dewasa

Dos biasa bagi orang dewasa ialah satu tablet setiap sehari.

### Kanak-kanak

Ubat ini tidak boleh diberikan kepada kanak-kanak.

### ***Waktu memakannya***

Doktor akan memberitahu anda bilangan tablet yang perlu anda makan setiap hari dan waktu memakannya. Bacalah label pada karton untuk mengingatkan diri anda tentang kata-kata doktor. Telan tablet Tenoretic dengan segelas air.

### ***Tempoh menggunakan ubat ini***

Jangan berhenti memakan Tenoretic tanpa berbincang dengan doktor. Dalam keadaan yang tertentu, anda perlu berhenti memakan ubat ini secara beransur-ansur.

### ***Jika anda terlupa memakannya***

Jika anda terlupa memakan satu dos, makanlah sebaik sahaja anda ingat. Walau bagaimanapun, jika waktunya sudah hampir dengan waktu dos yang seterusnya, abaikan sahaja dos yang tertinggal itu. Jangan makan dua dos untuk menggantikan dos yang terlupa dimakan itu.

### ***Jika anda menggunakan terlalu banyak (terlebih dos)***

Jika anda telah memakan lebih banyak Tenoretic daripada yang diarahkan oleh doktor, beritahu doktor atau pergi ke hospital dengan segera. Bawa pek ubat ini bersama-sama anda supaya tablet tersebut boleh dikenal pasti.

### **Semasa anda memakan Tenoretic**

#### ***Perkara-perkara yang mesti anda lakukan***

Makanlah ubat ini seperti yang telah diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi.

#### ***Perkara-perkara yang tidak boleh anda lakukan***

Jangan berhenti memakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi.

#### ***Perkara-perkara yang perlu anda awasi***

##### Pembedahan

- Jika anda dimasukkan ke hospital untuk menjalani pembedahan, beritahu pakar anestesia (pakar bius) atau kakitangan perubatan bahawa anda memakan Tenoretic. Ini kerana anda boleh mengalami tekanan darah yang rendah (hipotensi) jika anda diberi ubat anestetik yang tertentu sementara anda masih memakan Tenoretic.

##### Kehamilan dan menyusukan anak dengan susu badan

- Jangan makan Tenoretic jika anda hamil atau sedang cuba menjadi hamil.
- Jangan makan Tenoretic jika anda sedang menyusukan anak dengan susu badan.

##### Memandu dan mengendalikan jentera

- Ubat ini tidak dijangka akan menjejaskan keupayaan anda memandu mahupun mengendalikan apa-apa alat atau jentera. Walau bagaimanapun, sebaik-baiknya tunggulah dan perhatikan dahulu kesan ubat ini terhadap anda sebelum anda cuba melakukannya.
- Jika anda berasa pening atau penat semasa memakan ubat ini, mintalah nasihat doktor.

### **Kesan sampingan**

Sama seperti semua ubat lain, Tenoretic boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidaklah semua orang akan mengalaminya.

#### Tindak balas alergi:

Jika anda mengalami tindak balas alergi, pergilah berjumpa doktor dengan segera. Tanda-tandanya mungkin berupa benjol-benjol pada kulit (bilur), atau bengkak pada muka, bibir, mulut, lidah atau tekak.

Kesan-kesan sampingan lain yang boleh berlaku:

#### Lazim berlaku (kurang daripada 1 dalam setiap 10 orang akan mengalaminya)

- Tangan dan kaki terasa sejuk.
- Anda mungkin mendapati bahawa kadar nadi anda bertambah perlahan semasa anda memakan tablet ini. Ini normal, tetapi jika anda bimbang, beritahu doktor.
- Cirit-birit.
- Loya.
- Berasa letih.
- Perubahan pada jumlah bahan-bahan yang tertentu di dalam darah anda. Ini boleh menyebabkan:
  - aras gula (glukosa) yang lebih tinggi daripada normal,
  - aras natrium yang rendah, yang boleh menyebabkan lemah badan, muntah-muntah dan kejang otot,
  - aras kalium yang rendah,
- peningkatan jumlah asid urik.

Doktor mungkin akan mengambil sampel darah dari semasa ke semasa untuk memeriksa aras-aras bahan tersebut.

#### Tidak lazim berlaku (kurang daripada 1 dalam setiap 100 orang akan mengalaminya)

- Tidur tidak nyenyak.

#### Jarang-jarang sekali berlaku (kurang daripada 1 dalam setiap 1,000 orang akan mengalaminya)

- Sekat jantung (yang boleh menyebabkan degupan jantung yang abnormal, pening, rasa letih atau pitam).
- Rasa kebas dan spasma pada jari, diikuti dengan rasa panas dan sakit (penyakit Raynaud).
- Pening (terutamanya apabila bangun untuk berdiri).
- Sakit kepala.
- Berasa keliru.
- Perubahan personaliti (psikosis) atau halusinasi.
- Perubahan ragam angin.
- Mengigau.
- Mulut kering.
- Rambut semakin jarang.
- Mata kering.
- Ruam pada kulit.
- Rasa gelenyar pada tangan.
- Gangguan penglihatan.
- Lebam lebih mudah berlaku atau terdapat tanda keungu-unguan pada kulit.
- Tidak boleh mencapai ereksi (mati pucuk).
- Jaundis (menyebabkan kulit atau putih mata menjadi kuning).
- Pankreatitis (radang pada kelenjar besar di belakang perut).

- Penurunan bilangan sel darah putih.

Sangat jarang-jarang sekali berlaku (kurang daripada 1 dalam setiap 10,000 orang akan mengalaminya)

- Perubahan pada sesetengah sel darah atau bahagian lain darah. Doktor mungkin akan kerap mengambil sampel darah untuk memastikan sama ada Tenoretic ada kesan terhadap darah anda.

#### Penyakit yang boleh melarat

Jika anda menghidap mana-mana penyakit yang berikut, penyakit anda itu mungkin melarat apabila anda mula memakan ubat ini. Ini jarang-jarang sekali berlaku dan kurang daripada 1 dalam setiap 1,000 orang akan mengalaminya:

- Psoriasis (sejenis penyakit kulit).
- Sesak nafas atau bengkak pada pergelangan kaki (jika anda menghidap kegagalan jantung).
- Asma (lelah) atau masalah pernafasan.
- Peredaran darah yang kurang baik.

Jangan risau akan senarai kesan sampingan ini. Anda mungkin tidak akan mengalami mana-mana satu pun. Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda perhatikan kesan sampingan yang tidak tersenarai di dalam risalah ini, beritahulah doktor atau ahli farmasi.

#### **Cara Menyimpan Dan Membuang Tenoretic**

Simpan ubat ini di tempat yang selamat, jauh daripada pandangan dan capaian kanak-kanak. Ubat ini boleh memudaratkan mereka.

Jangan simpan pada suhu yang melebihi 25°C. Simpan tablet ini di dalam bungkusannya yang asal. Simpan papan lepuh di dalam karton. Ini akan melindungi ubat daripada cahaya dan lembapan. Jangan gunakan tablet ini selepas tarikh luputnya yang tertera pada papan lepuh dan pada kartonnya. Tarikh luput merujuk pada hari terakhir bulan yang dinyatakan itu.

#### **Keterangan tentang produk**

Tablet bersalut Tenoretic berwarna perang. Tablet ini disediakan di dalam pek (papan lepuh) berisi 28 tablet.

#### **Bahan**

Bahan-bahannya yang aktif ialah atenolol dan chlortalidone. Setiap tablet mengandungi 100 mg (milligram) atenolol dan 25 mg chlortalidone.

Ramuannya yang lain ialah gelatin, besi oksida, makrogol, magnesium karbonat, magnesium stearat, metilhidroksipropilselulosa, nartium laurilsulfat dan kanji jagung.

#### **Nombor pendaftaran Malaysia:**

Tenoretic: MAL19871032A

#### **Pengilang**

AstraZeneca UK Limited, Macclesfield, Cheshire, UK

**Tarikh semakan**

Teks disemak semula pada bulan September 2011

CV.000-680-635.2.0