

RASITOL Tablet

Furosemide 40mg

What is in this leaflet

This leaflet answers some common questions about RASITOL tablet. It does not contain all the available information. Please talk to healthcare professionals for further information.

What RASITOL Tablet is used for

RASITOL works by increasing the amount of salt and water that the kidneys remove from the blood. This extra salt and water is then passed out through the urine. By increasing the amount of water removed from the blood, RASITOL causes a decrease in blood volume. Because of this effect, it can lower blood pressure and help with water retention.

How RASITOL Tablet works

RASITOL is a drug that increase the flow of urine (termed diuresis). RASITOL work by removing sodium and chloride from the body in the urine and this helps in reducing the blood pressure.

Before you use RASITOL Tablet

When you must not take it

You must not take RASITOL if you are allergic to furosemide or you have renal failure, severe electrolyte depletion (e.g. hypokalaemia) as well as women with childbearing potential.

Before you start to take it

Tell your doctor if you are taking any other medicines or you have any other health problems.

Taking other medicines

Tell your doctor or pharmacist if you are taking any other medicines. There may be an interaction between other groups of drugs.

How to take RASITOL Tablet

How much to take

For oedema, the usual initial dose is 40mg once daily and adjusted as necessary based on individual's response. For hypertension, a daily doses of 40-80mg. Can be taken with other antihypertensives. For elderly, dosage should be adjusted.

When to take it

RASITOL should be taken according to doctor's instruction.

How long to take it

RASITOL should be taken according to doctor's prescription.

If you forgot to take it

If you miss a dose of RASITOL and you are taking it regularly, take it as soon as possible. If several hours have passed or if it is nearing time for the next dose, do not double the dose to catch up, unless advised by your health care provider. Do not take 2 doses at once.

If you take too much

Quickly seek for medical attention if you think that you or anyone else have taken too much RASITOL.

While you are using RASITOL Tablet

Things you must do

Follow your doctor's prescription when you are using RASITOL.

Things you must not do

Do not stop taking this medicine or change the dosing regimen without instruction of your doctor. Do not give RASITOL to anyone else, even if they have the same condition as you.

Things to be careful of

Should be used with caution in patient with impaired renal function, patients with impaired hepatic function, diabetes mellitus, gout and pregnant women.

Side effects

Commonly observed: headache, low blood pressure, muscle cramps, dry mouth, thirst, weakness, tiredness, drowsiness, restlessness, low output of urine, irregular heartbeat, and gastrointestinal disturbances.

Less commonly observed: blurred vision, yellow vision, dizziness and low blood pressure due to a change of body position.

Rarely observed: Skin rashes, sensitivity to light, allergic reactions and bone marrow depression.

After using RASITOL Tablet

Storage

Store below 30°C. Protect from light and moisture.

Disposal

If your doctor or pharmacist tells you to stop taking RASITOL or the tablet has passed the expiry date, ask your doctor or pharmacist what to do with any that is left over.

Product description

What it looks like

White elliptical tablet impressed with a score.

Ingredients

Furosemide
Cellulose Calcium
Magnesium Stearate
Povidone
Sodium Lauryl Sulfate
Magnesium Aluminium Silicate
Lactose

MAL no.

MAL 20020884A

Manufacturer

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3, 5 & 7, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru
Bangi, 43000 Kajang, Selangor D.E.,
Malaysia.

Date of revision :

13th June 2012

Marketing Authorization Holder

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

RASITOL Tablet

Furosemide 40mg

Apakah yang ada pada risalah ini

Risalah ini ditulis untuk menjawab soalan-soalan yang kerap ditanya tentang RASITOL Tablet. Risalah ini hanya mengandungi sebahagian maklumat. Sila rujuk kepada pakar kesihatan untuk keterangan lanjut.

Apakah kegunaan RASITOL Tablet

RASITOL digunakan untuk rawatan edema dengan mengurangkan kebengkakkan dan penahanan bendalir yang disebabkan oleh penyakit kardiak, hati dan ginjal serta rawatan tekanan darah tinggi.

Bagaimana RASITOL Tablet berfungsi

RASITOL ialah ubat yang meningkatkan kekerapan penguapan air kencing. Garam (natrium dan kloride) yang berlebihan akan dibuangkan melalui air kencing dan ini akan membantu mengurangkan tekanan darah tinggi.

Sebelum Mengambil RASITOL Tablet

Bila tidak boleh mengambil

Jika anda alah dengan furosemide atau mempunyai penyakit kegagalan ginjal, kekurangan elektrolit yang serius (seperti hipokalemia) serta wanita yang berpotensi untuk mengandung.

Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat ataupun mempunyai sebarang masalah kesihatan.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil sebarang ubat. Interaksi akan berlaku jika RASITOL digunakan bersama dengan ubat yang lain.

Cara menggunakan RASITOL Tablet

Berapa banyak harus diambil

Edema: Dos pemulaan umum adalah 40mg sekali sehari dan keperluan diselaraskan berdasarkan respons individu. Hipertensi: dos harian 40-80mg. Boleh diambil bersama dengan ubat antihipertensi. Bagi orang tua, dos perlu diselaraskan.

Bila perlu diambil

Ia perlu diambil mengikut arahan doktor.

Berapa lama perlu diambil

Ia perlu diberikan berdasarkan kepada preskripsi doktor.

Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa satu dos dan anda mengambil ubat ini secara berterusan, ambil dos itu secepat mungkin. Jika sudah beberapa jam selepas masa makan ubat berlalu ataupun sudah mendekati masa pengambilan dos yang kedua, jangan mengambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa, kecuali dinasihati oleh doktor. Jangan mengambil 2 dos pada masa yang sama.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Minta perhatian perubatan dengan segera jika anda atau orang lain telah mengambil dos berlebihan.

Semasa menggunakan RASITOL Tablet

Perkara yang perlu dilakukan

Ikut preskripsi doktor anda semasa mengambil ubat ini.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah pengambilan dos tanpa arahan doktor. Jangan memberi ubat ini kepada sesiapa walaupun simptom mereka serupa dengan anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Perhatian perlu diberi jika diguna oleh pesakit dengan kemerosotan fungsi ginjal, kemerosotan fungsi hati, diabetes melitus, gout dan wanita mengandung.

Kesan-kesan sampingan

Kesan sampingan umum: Sakit kepala, tekanan darah rendah, kekejangan otot, mulut kering, dahaga, lemah, lesu, mengantuk, keresahan, kekurangan air kencing, denyutan jantung yang tidak teratur, dan gangguan gastrousus.

Kesan sampingan yang kurang umum: Penglihatan kabur dan kuning, pening dan penurunan tekanan darah disebabkan oleh perubahan kedudukan badan.

Kesan sampingan yang jarang dilihat: Ruam, sensitif terhadap cahaya, alahan dan penekanan sum-sum tulang.

Selepas menggunakan RASITOL Tablet

Cara penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

Cara pelupusan

Jika doktor atau ahli farmasi anda mengarahkan anda untuk berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini telah luput tarikh, sila bertanya kepada doktor atau ahli farmasi tentang cara pengendalian ubat yang tertinggal.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Tablet putih berbentuk elips dengan skor pada satu permukaan.

Bahan-bahan kandungan

Furosemide
Cellulose Calcium
Magnesium Stearate
Povidone
Sodium Lauryl Sulfate
Magnesium Aluminium Silicate
Lactose

MAL no.

MAL 20020884A

Pengilang

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3, 5 & 7, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru
Bangi, 43000 Kajang, Selangor D.E.,
Malaysia.

Marketing Authorization Holder

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

Date of revision :

13 Jun 2012