

Apo-Lithium Carbonate SR Tablets 300mg

Lithium Carbonate

What is in this leaflet

This leaflet answers some of the common questions people ask about APO-LITHIUM CARBONATE. It does not contain all the information that is known about APO-LITHIUM CARBONATE.

It does not take the place of talking to your doctor or pharmacist.

All medicines have risks and benefits. Your doctor will have weighed the risks of you taking APO-LITHIUM CARBONATE against the benefits they expect it will have for you.

If you have any concerns about taking this medicine, ask your doctor or pharmacist.

Keep this leaflet with the medicine.

You may need to read it again.

What is the medication for

APO-LITHIUM CARBONATE is a prescription medication containing the active ingredient, lithium carbonate. APO-LITHIUM CARBONATE is intended for the relief of symptoms of manic in manic-depressive illness. Maintenance therapy can be used to reduce relapses in bipolar manic depressive patients.

How it works

APO-LITHIUM CARBONATE is a source of lithium ions. It works by decreasing amounts of certain natural substances in the brain that are needed to maintain mental balance.

Before you use

When you must not take it

- If you are allergic to lithium, or any ingredients of this

medication.

Before you start to take it

Taking other medicines

Before taking APO-LITHIUM CARBONATE your doctor needs to know:

- Any other medical condition that you may have including heart, kidney diseases, or hyperthyroidism;
- Whether you are planning to get pregnant, are currently pregnant or are nursing an infant;
- Any other prescription or over-the-counter medication that you are currently taking, of particular diuretics;
- If you have low body sodium levels (dehydrated patients, those on low sodium diet, Addison's disease)

How to take

How much to take

Acute Mania

In properly screened adult patients with good renal function, the suggested initial dosage for acute mania is 1200 to 1800 mg divided into 2 doses and administered at 12-hour intervals. As renal lithium excretion among individuals differs, it is suggested that lithium treatment be started at a dose between 600 and 900 mg/day, reaching a level of 1200 to 1800 mg/day, in 2 divided doses, on the second day.

Lithium should be used cautiously and in reduced doses in the elderly patient, usually in the range of 600 to 1200 mg/day or less, starting with smaller doses.

Maintenance Therapy

After the acute manic episode subsides, usually within a week,

the dosage should be rapidly reduced, since there is evidence of a decreased tolerance to lithium at this time.

The average suggested dosage at this stage is 900 mg/day administered in a single dose at bedtime, with a range usually between 600 and 1200 mg/day. If a satisfactory response is not obtained within 14 days, lithium therapy should be discontinued.

Follow your doctor's instruction on how much to take, as dosage might differ for each and every individual.

When to take it

APO-LITHIUM CARBONATE should be taken according to the doctor's instructions or the label attached with this medication. Swallow the tablet(s) with water and without chewing.

How long to take it

Never increase or decrease the amount of APO-LITHIUM CARBONATE you, or those in your care if you are a caregiver or guardian, are taking unless your doctor tells you to and do not stop taking this medication without consulting your doctor.

If you forget to take it

As soon as you remember, take the missed dose. Unless if it is almost time for your next scheduled dose, skip the missed dose. Do not take extra medicine to make up the missed dose.

If you take too much (overdose)

Contact your doctor or nearest hospital emergency department even though you may not feel sick.

While you are using it

Things you must do

None

Things you must not do

None

Things to be careful of

None

Side effects

The side effects of taking Lithium Carbonate are usually mild and transient. The side effects include tremor of the hand, nausea, drowsiness, dry mouth, increased dizziness. However, if you feel any other forms of discomfort when you take the medication, let your doctor know as soon as possible.

After using this medication

Storage

Remember to keep APO-LITHIUM CARBONATE and all medications safely away from children.

Do not use this medicine after the month and year written after EXP on the container.

Store APO-LITHIUM CARBONATE at temperature below 25°C.

Disposal

Ask your pharmacist what to do with any tablets you have left over if your doctor tells you to stop taking them, or you find that the expiry date has passed.

Product Description

What it looks like?

The 300mg tablets are round, white tablet with flat sides and beveled edges. Scored and engraved LIT over 300 on one side and APO on the other.

Ingredients

The 300 mg tablets contain the active ingredient: Lithium Carbonate and the following non-medicinal ingredients: Hydroxypropyl Methylcellulose, Magnesium Stearate.

Malaysian Registration Number

MAL09122024A

Manufacturer

Apotex Inc
150 Signet Drive,
Toronto, Ontario,
Canada, M9L 1T9

Marketing Authorization Holder

Pharmaforte (M) Sdn Bhd
2, Jalan PJU 3/49
Sunway Damansara
47810 Petaling Jaya

Date of revision

1st November 2012

Apo-Lithium Carbonate SR Tablets 300mg

Lithium Carbonate

Apa kandungan risalah ini

Risalah ini mengandungi jawapan untuk sesetengah persoalan yang biasa ditanya tentang APO-LITHIUM CARBONATE. Bagaimanapun ia tidak mengandungi semua maklumat tentang APO-LITHIUM CARBONATE..

Ia juga tidak boleh mengambil alih tugas doktor atau ahli farmasi anda.

Semua ubat-ubatan mempunyai risiko dan manfaatnya sendiri. Doktor anda akan menentukan risiko tentang APO-LITHIUM CARBONATE. keatas manfaatnya yang akan membawa kepada anda

Sekiranya anda mempunyai sebarang keraguan mengenai pengambilan ubat ini, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

Sila simpan risalah ini bersama-sama dengan ubat ini.

Anda mungkin perlu membacanya semula.

Apa kegunaan ubat ini

APO-LITHIUM CARBONATE adalah ubat preskripsi yang mengandungi bahan aktif, litium CARBONATE. APO-LITHIUM CARBONATE bertujuan untuk melegakan gejala manik pada penyakit manik-depresif. Terapi penyenggaraan boleh digunakan untuk mengurangkan kambuh manicdepressive dwikutub.

Bagaimana ubat ini berfungsi

APO-LITHIUM CARBONATE merupakan sumber ion litium. Ia berfungsi dengan mengurangkan jumlah bahan-bahan semulajadi tertentu pada otak yang diperlukan untuk mengekalkan keseimbangan mental.

Sebelum penggunaan

Bila anda tidak dibenarkan ambil

- Jika anda alah kepada litium, atau mana-mana bahan-bahan ubat ini.

Sebelum mula pengambilan

Pengambilan ubat-ubatan lain

Sebelum mengambil APO-LITHIUM CARBONATE doktor anda perlu tahu:

- Sebarang keadaan perubatan lain yang anda mungkin mengalami termasuk masalah jantung, penyakit buah pinggang, atau hipertiroidisme;
- Sama ada anda merancang untuk hamil, sedang hamil atau menyusu bayi;
- Mana-mana ubat preskripsi lain atau over-the-kaunter yang anda sedang mengambil. Khususnya diuretik;
- Jika anda mempunyai tahap badan natrium rendah (pesakit dehidrasi, mereka yang mengamalkan diet natrium rendah, penyakit Addison adalah penyakit)

Cara pengambilan

Berapa banyak untuk diambil

Mania akut

Pada golongan pesakit dewasa yang telah diperiksakan yang mempunyai fungsi renal yang baik, dos permulaan yang dicadangkan untuk mania akut adalah 1200-1800 mg dibahagi sama rata kepada 2 dos dan diambil di selang 12-jam. Oleh kerana perkumuhan litium oleh buah pinggang di kalangan adalah berbeza, dicadangkan bahawa rawatan litium bermula pada dos antara 600 dan 900 mg / hari, mencapai tahap setinggi 1200

1800 mg / hari, dalam 2 dos dibahagikan sama rate, pada hari kedua.

Litium harus digunakan dengan berhati-hati dan dalam pesakit warga tua yang mangambil dos kurangan, dos biasanya dalam julat 600-1200 mg / hari atau kurang daripada ini, bermula dengan dos yang lebih rendah.

Terapi Penyenggaraan

Selepas reda episod akut manik, biasanya dalam tempoh seminggu, dos harus dikurangkan secara pesat, Ini kerana terdapat bukti bahawa toleransi litium akan menurun pada masa ini.

Dos purata yang dicadangkan pada peringkat ini adalah 900 mg / hari diambil dalam dos tunggal pada waktu tidur, dalam julat antara 600 dan 1200 mg / hari. Jika gerak balas yang memuaskan tidak tercapai dalam tempoh 14 hari, terapi litium harus diberhentikan.

Ikut arahan doktor berapa banyak ubat untuk diambil kerana dos mungkin berbeza untuk setiap individu.

Bila mengambilnya

APO-LITHIUM CARBONATE perlu diambil mengikut arahan doktor atau mengikut label yang disertakan dengan ubat ini. Telan tablet dengan minuman air tanpa mengunyahnya.

Berapa lama untuk diambil

Jangan menambah atau mengurangkan jumlah dos APO-LITHIUM CARBONATE anda, atau kepada mereka bawah jagaan anda jika anda seorang penjaga atau penjaga, melainkan jika dibertitahu oleh doktor anda dan tidak berhenti mengambil ubat ini tanpa berunding dengan doktor anda terlebih dahulu.

Jika anda terlupa untuk ambil

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat kembali kecuali jika sudah hampir tiba masa untuk dos yang seterusnya. Dalam keadaan sedemikian, terus mengambil dos yang berikutnya mengikut jadual waktu. Jangan gandakan dos ubat ini.

Jika anda ambil terlalu banyak (terlebih dos)

Jika anda secara tidak sengaja terambil dos lebih daripada yang ditetapkan, hubungi bahagian kecemasan terdekat atau beritahu doktor anda atau ahli farmasi dengan segera, walaupun anda tidak mengalami sebarang kesan kesakitan

Dalam masa penggunaan***Perkara yang harus dilakukan***

Tiada

Perkara yang dilarang

Tiada

Perkara yang perlu berhati-hati

Tiada

Kesan sampingan

Kesan-kesan sampingan mengambil Lithium Carbonate biasanya bersifat ringan dan sementara. Kesan-kesan sampingan termasuk gegaran tangan, loya, mengantuk, mulut kering, meningkat pening. Walau bagaimanapun, jika anda terasa lain-lain ketidakselesaan apabila anda mengambil ubat ini, beritahu doktor anda secepat mungkin.

Selepas penggunaan ubat ini***Penyimpanan***

Anda diingatkan supaya menyimpan APO-LITHIUM

CARBONATE dan semua ubat-ubatan dengan selamat jauh dari kanak-kanak.

Jangan gunakan ubat ini selepas bulan dan tahun yang ditulis seperti di bekas EXP (tarikh luput).

Simpan APO-LITHIUM CARBONATE pada suhu 25°C .

Pembuangan

Tanya ahli farmasi anda apa yang perlu dilakukan dengan lebih tablet yang tinggal jika anda dibertitahu oleh doktor anda memberitahu untuk berhenti mengambilnya, atau ubat ini telah melepasi tarikh luputnya.

Product Description***Bagaimana rupa ubat ini?***

Tablet 300mg berbentuk bulat, berwarna putih dengan permukaan rata dan tepi serong. Ada garisan jaringan dengan ukiran 'LIT' keatas '300' di satu permukaan dan 'APO' di permukaan yang lain.

Bahan Kandungan

Tablet 300 mg tablet mengandungi bahan aktif: Litium carbonate dan bahan-bahan bukan perubatan yang berikut: Hydroxypropyl methylcellulose, stearat magnesium.

Nombor Pendaftaran Malaysia

MAL09122024A

Pengilang

Apotex Inc.
150 Signet Drive
Weston Toronto Ontario
M9L 1T9 Canada

Pemegang Hak kuasa Pemasaran

Pharmaforte (M) Sdn Bhd
2, Jalan PJU 3/49
Sunway Damansara