

HIPRANOL TABLET 40MG

Active: *PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE*

Excipient: *Carmoisine, Silicon Dioxide, Sodium Starch Glycolate, Cornstarch, Magnesium Stearate, Lactose*

Consumer Medicine Information

What is in this leaflet

This leaflet answers some of the common questions people ask about HIPRANOL.

It does not contain all the information that is known about HIPRANOL.

It does not take the place of talking to your doctor or pharmacist.

All medicines have risks and benefits. Your doctor will have weighed the risks of you taking HIPRANOL against the benefits they expect it will have for you.

If you have any concerns about taking this medicine, ask your doctor or pharmacist.

Keep this leaflet with the medicine.

You may need to read it again.

What HIPRANOL is used for

HIPRANOL works by affecting the body's response to some nerve impulses, especially in the heart.

As a result, it decreases the heart's need for blood and oxygen and therefore reduces

the amount of work the heart has to do.

It also widens the blood vessels in the body, as well as helping the heart to beat more regularly.

HIPRANOL belongs to a group of medicines called beta-blockers.

HIPRANOL tablets are used to treat or prevent a number of conditions, most of which are related to the heart.

- to lower high blood pressure, also called hypertension
- to prevent angina
- to treat or prevent heart attacks, or reduce your risk of heart problems following a heart attack
- to treat irregularities in heart beat, including those caused by anxiety
- essential tremor (shaking of head, chin, hands)
- phaeochromocytoma
- Fallot's Tetralogy
- to prevent migraine headaches

Ask your doctor if you have any questions about why this medicine has been prescribed for you.

Your doctor may have prescribed this medicine for another reason.

HIPRANOL is not addictive. It is only available with a doctor's prescription.

Before you take HIPRANOL

When you must not take it

Do not take HIPRANOL if you have an allergy to:

- propranolol
- any of the ingredient listed at the end of this leaflet
- any other similar medicines such as beta-blockers

Some of the symptoms of an allergic reaction may include:

- shortness of breath
- wheezing or difficulty breathing
- fast heart beats (palpitations)
- extreme tiredness or breathlessness on mild exercise

Do not take HIPRANOL if you have asthma or severe breathing problems.

Taking HIPRANOL may make these conditions worse.

Do not take HIPRANOL if you have certain other heart problems for example heart

failure, low blood pressure, problems with your circulation, Prinzmetal's angina, or a slow heart beat.

Taking HIPRANOL may make these conditions worse.

Do not take HIPRANOL if you have low blood sugar levels.

Taking HIPRANOL may make these conditions worse.

Tell your doctor if you are pregnant or breastfeeding.

Ask your doctor about the risks and benefits involved.

It may affect your baby if you take it at any time during your pregnancy.

Your baby can take in HIPRANOL from breast milk if you are breastfeeding.

Do not use after the use by (expiry) date printed on the pack or if the packaging is torn or shows signs of tampering.

If it has expired or is damaged, return it to your pharmacist for disposal.

If you are not sure whether you should start taking this medicine, talk to your doctor.

Before you start to take it

Tell your doctor if you have allergies to any other medicines, food, preservatives or dyes.

Tell your doctor if you have any of these medical conditions

- asthma or serious breathing problems
- heart problems
- low blood pressure
- problems with your circulation
- diabetes or low blood sugar
- an overactive thyroid gland
- liver problems
- kidney problems

It may not be safe for you to take HIPRANOL if you have any of these conditions.

Tell your doctor if you are fasting or have been fasting recently.

If you have not told your doctor about any of the above, tell him/her before you start taking HIPRANOL.

Taking other medicines

Tell your doctor if you are taking any other medicines, including any that you buy without a prescription from your pharmacy, supermarket or health food shop.

Some medicines and HIPRANOL may interfere with each other. These include:

- calcium channel blockers – medicines used to treat high blood pressure
- digoxin - a medicine used to treat heart failure.
- medicines for migraine
- medicines for diabetes
- warfarin - a medicine that stops blood clots
- theophylline - a medicine used to treat asthma
- rifampicin - a medicine used to treat tuberculosis

- ibuprofen, indomethacin – medicines used to treat pain and inflammation
- cimetidine - a medicine used to treat ulcers
- chlorpromazine - a medicine used to treat psychotic illnesses
- rizatriptan - a medicine used to treat migraine headaches

These medicines may affect the way HIPRANOL works or may be affected by HIPRANOL.

You may need to use different amounts of your medicines, or take different medicine. Your doctor will advise you.

Your doctor or pharmacist has more information on medicines to be careful with or avoid while taking HIPRANOL.

How to take HIPRANOL

How much to take

For high blood pressure

The usual starting dose is one 40mg tablet taken twice a day for one week.

The dose is then usually increased to between 120mg to 320mg daily.

If you are taking other medicines which lower blood pressure, your doctor may need to change the dose of them to obtain the best results for you.

For angina and tremor

The usual dose is 40mg taken two or three times a day.

To treat or prevent heart attack

The usual dose is 80mg taken twice a day, often starting with 40mg taken four times a day for 2 or 3 days.

For migraine prevention

Adults

The usual dose is 40mg taken twice a day. This may need to be increased up to 80mg twice a day.

Children over 7 years

The starting dose is 10mg taken once or twice daily. This can be increased if necessary.

Other conditions

Your doctor will tell you what dose to take.

Your doctor may tell you to take a different amount of HIPRANOL to the one given in this leaflet.

Follow your doctor's instructions carefully.

If you forget to take it

If it is almost time for your next dose (within 6 hours), skip the dose you missed and take your next dose when you are meant to.

Otherwise, take it as soon as you remember, and then go back to taking your tablets as you would normally.

Do not double the dose.

If you have trouble remembering when to take your medicine, ask your pharmacist for some hints.

Taking too much (overdose)

Telephone your doctor or go to Accident and Emergency at your nearest hospital immediately if you think that you or anyone else may have taken too much HIPRANOL even if there are no signs of discomfort or poisoning.

If you take too many HIPRANOL tablets you will probably feel very tired, have difficulty breathing and moving around.

While you are using HIPRANOL

Things you must do

If you are about to be started on any new medicine, remind your doctor and pharmacist that you are taking HIPRANOL.

Tell any doctors, dentists, and pharmacists who are treating you that you are taking this medicine.

If you have a severe allergic reaction to foods, medicines or insect stings, tell your doctor immediately.

If you have a history of allergies, there is a chance that HIPRANOL may cause allergic reactions to be worse and harder to treat.

If you feel light-headed, dizzy or faint when getting out of bed or standing up, get up slowly.

You may feel light-headed or dizzy when you begin to take HIPRANOL.

Standing up slowly, especially when you get up from bed or chairs, will help your body get used to the change in position and blood pressure.

If this problem gets worse or continues, talk to your doctor.

If you plan to have surgery (even at the dentist) that needs a general anaesthetic, tell your doctor or dentist that you are taking HIPRANOL.

Your blood pressure may drop suddenly if HIPRANOL interacts with the anaesthetic.

If you become pregnant while taking HIPRANOL, tell your doctor.

If you are being treated for diabetes, make sure you check your blood sugar level regularly and report any changes to your doctor.

HIPRANOL may change how well your diabetes is controlled. It may also cover up some of the symptoms of low blood sugar (hypoglycaemia) eg increased heart rate.

HIPRANOL may increase the time your body takes to recover from low blood sugar. Your doses of diabetic medicines, including insulin, may need to change.

Non-diabetic patients: HIPRANOL may also occasionally cause low blood sugar (hypoglycaemia) in non-diabetic patients.

These may include the newly born, toddlers, children, elderly, patients suffering from overdose, patients suffering from chronic liver disease,

fasting patients or patients on haemodialysis.

Things you must not do

Do not give HIPRANOL to anyone else even if they have the same condition as you. Do not use HIPRANOL to treat any other complaints unless your doctor tells you to.

Do not stop taking HIPRANOL without checking with your doctor.

Your doctor may want you to gradually reduce the amount of

HIPRANOL you are taking before stopping completely.

This may help reduce the possibility of your condition getting worse.

Things to be careful of

Be careful driving or operating machinery until you know how HIPRANOL affects you.

HIPRANOL may cause dizziness, light-headedness, tiredness, or drowsiness in some people.

Make sure you know how you react to HIPRANOL before you drive a car, operate machinery, or do anything else that could be dangerous if you are dizzy or light-headed.

Be careful drinking alcohol while you are taking HIPRANOL.

Dizziness or light-headedness may be worse. Alcohol can also increase the effects of HIPRANOL.

HIPRANOL, like other beta-blocker medicines, may make you more sensitive to cold temperatures, especially if you have circulation problems.

Please talk to your doctor or pharmacist about these possibilities if you think they may bother you.

Side effects

Tell your doctor or pharmacist as soon as possible if you do not feel well while you are taking HIPRANOL.

HIPRANOL helps most people when taken correctly, but it may have unwanted side-effects in a few people.

All medicines can have side effects. Sometimes they are serious, most of the time they are not. You may need medical treatment if you get some of the side effects.

Do not be alarmed by the following lists of side effects. You may not experience any of them.

Ask your doctor or pharmacist to answer any questions you may have.

Tell your doctor if you notice any of the following and they worry you:

- nausea (feeling sick), vomiting
- loss of appetite
- diarrhoea, stomach pain, flatulence
- cold hands or feet
- dizziness, tiredness
- rash, flushing

- hair loss
- feeling tired, lethargic, lack of energy

These are all mild side effects of HIPRANOL.

Tell your doctor immediately if you notice any of the following:

- disturbed sleep, vivid dreams or nightmares
- conjunctivitis, dry eyes
- visual disturbances
- trouble passing urine
- unexplained bruising
- mood changes, confusion
- sexual problems
- loss of hearing
- slow heart beats

These are all serious side effects. You may need urgent medical attention. Serious side effects are rare.

If any of the following happen, stop taking HIPRANOL and tell your doctor immediately or go to Accident and Emergency at your nearest hospital.

- extreme tiredness or breathlessness on mild exercise
- wheezing, difficulty breathing or an asthma attack
- fast heart beats (palpitations).

These are very serious side effects. If you have them, you may have had a serious (allergic) reaction to HIPRANOL. You may need urgent medical attention or hospitalization.

All of these side effects are very rare.

Tell your doctor if you notice anything else that is making you feel unwell.

Other side effects not listed above may also occur in some people.

After using HIPRANOL

Storage

Keep your tablets in the pack until it is time to take them.

If you take the tablets out of the pack they may not keep well.

Keep it in a cool dry place where the temperature stays below 25°C.

Do not store it or any other medicine in the bathroom or near a sink. Do not leave it on a window sill in the car on hot days. Heat and dampness can destroy some medicines.

Keep it where young children cannot reach it. A locked cupboard at least one-and-a-half metres above the ground is a good place to store medicines.

Disposal

If your doctor tells you to stop taking this medicine or the expiry date has passed, ask your pharmacist what to do with any medicine that is left over.

Product description

What HIPRANOL looks like

HIPRANOL tablets are a 7 mm round, scored tablet, pink in

colour with markings 'DUO 861' and a 'flower'.

These are available in blister packs of 1000 tablets.

Ingredients

Each HIPRANOL tablet contains propranolol hydrochloride 40mg as the active ingredient

Manufacturer / Distributor

HIPRANOL is manufactured and distributed by

DUOPHARMA (M) SDN. BHD. (42491-M)

WHOLLY OWNED BY CCM
DUOPHARMA BIOTECH
BERHAD (524271-W)

Lot. 2599, Jalan Seruling 59,
Kawasan 3, Taman Klang Jaya,
41200 Klang, Selangor Darul
Ehsan, Malaysia.

Marketing Authorization Holder

DUOPHARMA (M) SDN. BHD. (42491-M)

WHOLLY OWNED BY CCM
DUOPHARMA BIOTECH
BERHAD (524271-W)

Lot. 2599, Jalan Seruling 59,
Kawasan 3, Taman Klang Jaya,
41200 Klang, Selangor Darul
Ehsan, Malaysia.

Malaysian Registration Number

Hipranol 40mg: MAL19890158A

This leaflet was prepared in
December 2011

HIPRANOL TABLET 40MG

Bahan Utama: *PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE*

Tambahan: *Carmoisine, Silicon Dioxide, Sodium Starch Glycolate, Cornstarch, Magnesium Stearate, Lactose*

Risalah Maklumat Ubat Pengguna

Kandungan risalah

Risalah ini menjawab beberapa soalan lazim mengenai HIPRANOL

Ia tidak mengandungi semua maklumat yang ada mengenainya.

Ini tidak bermakna anda tidak perlu mendapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi.

Semua ubat mempunyai risiko dan manfaat. Doktor anda telah menimbang risiko dan manfaat yang dijangkakan sebelum anda mengambil HIPRANOL.

Jika anda mempunyai apa-apa kemusykilan tentang pengambilan ubat ini, hubungi doktor atau ahli farmasi anda.

Simpan risalah ini bersama dengan ubat anda.

Anda mungkin perlu membacanya lagi.

Apakah kegunaan HIPRANOL

HIPRANOL berfungsi dengan memberi kesan tindakbalas badan terhadap beberapa impuls saraf terutamanya di bahagian jantung.

Dengan itu, ia dapat mengurangkan keperluan darah dan oksigen kepada jantung dan seterusnya mengurangkan daya kerja jantung tersebut.

Ia juga berfungsi dengan membesarkan saluran darah di dalam badan dan membantu jantung berdenyut dengan tetap.

HIPRANOL tergolong di dalam kumpulan ubat yang dipanggil penghalang beta atau *beta-blocker*.

Tablet HIPRANOL digunakan untuk merawat atau mencegah beberapa keadaan penyakit, kebanyakannya berkaitan dengan jantung.

- menurunkan tekanan darah tinggi, yang juga dipanggil hipertensi
- mengelakkan serangan sakit dada (angina)
- merawat atau mencegah serangan jantung atau mengurangkan risiko komplikasi jantung susulan serangan jantung
- untuk merawat denyutan jantung yang tidak teratur, termasuk yang disebabkan oleh keresahan
- kepala, tangan dan dagu terketar-ketar

- phaeochromocytoma (penyakit tumor pada kelenjar adrenal)
- Fallot Tetralogi – kerosakan jantung sianotik
- mencegah penyakit migrain

Tanya doktor anda jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengapa ubat ini dipreskrip untuk anda.

Doktor anda mungkin telah mempreskrip ubat ini untuk kegunaan lain.

HIPRANOL tidak boleh menyebabkan rasa ketagihan. Ia hanya boleh diperolehi melalui preskripsi doktor.

Sebelum menggunakan HIPRANOL

Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil HIPRANOL jika anda alah terhadap:

- ubat propranolol
- sebarang bahan kandungannya yang disenaraikan pada penghujung risalah ini
- ubat-ubatan lain, contohnya ubat penghalang beta

Sebahagian daripada tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk:

- sesak nafas
- sukar bernafas atau nafas berdehit
- denyutan jantung bergerak pantas (rasa berdebar-debar)
- rasa lesu atau tercungap-cungap selepas senaman ringan

Jangan mengambil HIPRANOL jika anda mempunyai penyakit asma atau masalah pernafasan yang teruk.

Pengambilan HIPRANOL boleh memburukkan lagi keadaan penyakit tersebut.

Jangan mengambil HIPRANOL jika anda mempunyai masalah lain jantung contohnya kegagalan jantung berfungsi, tekanan darah rendah, masalah peredaran darah, angina Prinzmetal, atau denyutan jantung yang perlahan.

Pengambilan HIPRANOL boleh memburukkan lagi keadaan penyakit tersebut.

Jangan mengambil HIPRANOL jika paras gula dalam darah anda rendah.

Pengambilan HIPRANOL boleh memburukkan lagi keadaan tersebut.

Maklumkan kepada doktor jika anda hamil atau sedang menyusukan bayi.

Doktor akan berbincang dengan anda mengenai risiko dan manfaat HIPRANOL ketika hamil dan penyusuan bayi.

la boleh menjejaskan janin jika anda mengambilnya ketika hamil.

HIPRANOL boleh menyerap masuk ke dalam susu badan dan seterusnya boleh menjejaskan bayi yang sedang disusui.

Jangan guna ubat ini selepas tarikh luput yang dicetak pada label atau pembungkusannya telah terkoyak atau ada tanda-tanda telah dibuka.

Jika ia telah tamat tarikh luput atau rosak, pulangkan kepada ahli farmasi anda untuk dilupuskan.

Jika anda tidak pasti sama ada anda harus mula mengambil ubat ini, tanya doktor anda.

Sebelum mula mengambil

Maklumkan kepada doktor anda jika anda alah terhadap sebarang ubat-ubatan, makanan, bahan-bahan pewarna atau pengawet.

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai sebarang penyakit seperti berikut:

- asma (lelah) atau masalah pernafasan yang serius
- masalah jantung
- tekanan darah rendah
- masalah peredaran darah
- penyakit kencing manis atau paras gula dalam darah rendah
- kelenjar tiroid terlebih aktif
- masalah hati
- masalah buah pinggang

Pengambilan HIPRANOL mungkin boleh memudaratkan jika anda mempunyai sebarang penyakit tersebut.

Beritahu doktor jika anda sedang berpuasa atau telah berpuasa baru-baru ini.

Jika anda belum memaklumkan perkara tersebut kepada doktor anda, maklumkan segera sebelum mula mengambil HIPRANOL.

Jika mengambil ubat-ubatan lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda ada mengambil sebarang ubat, termasuk ubat yang boleh diperolehi tanpa preskripsi di kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat dan HIPRANOL boleh bertindakbalas antara satu sama lain. Ini termasuklah:

- ubat penghalang saluran kalsium – untuk merawat penyakit tekanan darah tinggi
- digoxin – ubat untuk merawat kegagalan jantung.
- ubat untuk penyakit migrain
- ubat untuk penyakit kencing manis
- warfarin – ubat mencegah pembekuan darah
- theophylline – ubat untuk merawat asma
- rifampicin – ubat untuk merawat penyakit tibi
- ibuprofen, indomethacin – ubat tahan sakit dan anti-radang
- cimetidine – ubat untuk merawat ulser
- chlorpromazine – ubat untuk penyakit psikosis

- rizatriptan – ubat untuk migrain

Jika mana-mana ubat di atas dan HIPRANOL diambil bersama, ia akan menjejaskan fungsi masing-masing.

Anda mungkin memerlukan sukatan ubat yang berbeza, atau anda mungkin perlu mengambil ubat-ubatan berbeza. Doktor anda akan menasihatkan anda mengenainya.

Doktor akan menasihatkan anda mengenai ubat yang perlu diberi perhatian atau perlu dielakkan ketika mengambil HIPRANOL.

Cara menggunakan HIPRANOL

Berapa banyak perlu diambil

Penyakit darah tinggi (hipertensi):

Dos permulaan biasa ialah satu tablet 40mg diambil dua kali sehari selama seminggu

Kemudian, dos tersebut selalunya dinaikkan sebanyak di antara 120mg hingga 320mg sehari.

Jika anda mengambil ubat penyakit darah tinggi yang lain, doktor anda mungkin menukarkan dos ubat tersebut supaya anda mendapat kesan yang terbaik.

Untuk angina (sakit dada) dan tremor (terketar-ketar)

Dos biasa adalah 40mg diambil dua atau tiga kali sehari.

Untuk merawat atau mencegah serangan jantung

Dos biasa adalah 80mg diambil dua kali sehari, selalunya

bermula dengan 40mg diambil empat kali sehari selama 2 atau 3 hari.

Untuk mencegah penyakit migrain

Dewasa

Dos biasa adalah 40mg diambil dua kali sehari. Ini mungkin perlu ditingkatkan sehingga 80mg dua kali sehari.

Kanak-kanak berusia lebih 7 tahun

Dos permulaan adalah 10mg diambil sekali atau dua kali sehari. Ia boleh ditingkatkan jika perlu.

Penyakit-penyakit lain

Doktor anda akan menentukan dos yang sesuai untuk anda. Doktor boleh memberi anda sukatan dos HIPRANOL yang berbeza dengan kandungan risalah ini.

Patuhi semua arahan doktor anda dengan teliti.

Jika terlupa mengambil

Jika masa untuk dos seterusnya hampir tiba (dalam masa 6 jam), langkau dos yang tertinggal tersebut dan ambil dos yang seterusnya.

Jika tidak, ambil sebaik anda teringat, dan seterusnya ambil tablet anda mengikut masa yang sepatutnya.

Jangan gandakan dos anda.

Jika anda mempunyai masalah untuk mengingati waktu pengambilan ubat anda, dapatkan cara untuk mengatasinya daripada ahli farmasi anda.

Jika mengambil berlebihan (Terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera melalui panggilan telefon atau kunjungi hospital yang berdekatan jika anda fikir anda atau orang lain telah mengambil HIPRANOL secara berlebihan. Lakukan perkara tersebut sekalipun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan.

Jika anda mengambil tablet HIPRANOL secara berlebihan, anda mungkin akan berasa sangat lesu, sukar bernafas dan bergerak.

Semasa menggunakan HIPRANOL

Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda akan mula mengambil sebarang ubat lain, ingatkan doktor dan ahli farmasi anda bahawa anda sedang mengambil HIPRANOL.

Maklumkan mana-mana doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil ubat ini.

Maklumkan kepada doktor anda dengan segera jika anda alah teruk kepada sebarang makanan, ubat-ubatan atau gigitan serangga.

Jika anda mempunyai sejarah alahan, ada kemungkinan HIPRANOL boleh menyebabkan tindakbalas alahan itu menjadi

semakin teruk dan sukar dirawat.

Jika kepala anda terasa ringan, pening atau pitam ketika anda hendak bangun dari tidur atau berdiri, bangun secara perlahan-lahan.

Anda mungkin berasa sakit kepala atau pening ketika mula mengambil HIPRANOL.

Bangun secara perlahan-lahan, terutamanya ketika hendak bangun dari tidur atau dari kerusi. Ini boleh membantu badan anda menyesuaikan keadaan ketika berlaku perubahan posisi dan tekanan darah.

Jika masalah ini berterusan atau menjadi semakin teruk, maklumkan kepada doktor anda.

Jika anda merancang untuk menjalani pembedahan, (walaupun dengan doktor gigi) yang memerlukan penggunaan ubat bius, maklumkan kepada doktor atau doktor gigi bahawa anda sedang mengambil ubat HIPRANOL.

Tekanan darah anda akan turun secara mendadak akibat tindakbalas HIPRANOL dengan ubat bius.

Jika anda hamil ketika mengambil HIPRANOL, maklumkan kepada doktor anda.

Jika anda sedang menerima rawatan untuk penyakit kencing manis, pastikan paras gula dalam darah anda diperiksa secara berkala dan laporkan sebarang perubahan kepada doktor anda.

HIPRANOL boleh menjejaskan rawatan penyakit kencing manis anda. Ia juga boleh melindungi gejala paras gula rendah (hipoglisemia).

HIPRANOL boleh meningkatkan masa pemulihan paras gula dalam darah anda ke paras normal, walaupun anda telah mengikuti rawatan biasa kencing manis. Sukatan dos atau ubat kencing manis anda perlu diubah.

Pesakit bukan diabetik (tiada penyakit kencing manis):

Ada kalanya HIPRANOL boleh menurunkan paras gula dalam darah pada pesakit bukan diabetik.

Ini termasuklah pesakit bayi yang baru lahir, kanak-kanak, warga emas, pesakit yang terlebih dos, pesakit yang menghidap penyakit hati kronik, pesakit yang berpuasa atau pesakit yang menjalani hemodialisis.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan beri HIPRANOL kepada orang lain walaupun penyakit mereka sama seperti anda.

Jangan guna HIPRANOL untuk merawat penyakit lain kecuali atas arahan doktor anda.

Jangan berhenti mengambil HIPRANOL tanpa merujuk kepada doktor anda.

Doktor anda mungkin akan mengurangkan dos HIPRANOL anda secara berperingkat sebelum terus menghentikannya.

Dengan cara ini, ia dapat membantu mengurangkan kemungkinan keadaan anda menjadi semakin teruk

Perkara yang perlu diberi perhatian:

Berhati-hati ketika memandu kenderaan atau mengendalikan mesin sehingga anda merasai kesan HIPRANOL terhadap anda.

HIPRANOL boleh menyebabkan rasa pening, lesu, ringan kepala atau rasa mengantuk pada sesetengah pesakit.

Pastikan anda tahu bagaimana tindakbalas anda terhadap HIPRANOL sebelum memandu kereta, mengendalikan mesin, atau melakukan perkara yang berbahaya sekiranya anda berasa pening atau ringan kepala.

Berhati-hati dengan pengambilan alkohol ketika anda sedang mengambil HIPRANOL.

Rasa pening atau ringan kepala anda mungkin akan bertambah teruk. Alkohol juga boleh meningkatkan kesan-kesan HIPRANOL.

Seperti ubat-ubatan penghalang beta yang lain, HIPRANOL boleh membuatkan anda lebih sensitif kepada suhu sejuk, terutamanya jika anda mempunyai masalah peredaran darah.

Laporkan kepada doktor atau ahli farmasi anda mengenainya jika ia mengganggu anda.

Kesan-kesan sampingan

Laporkan segera kepada doktor atau ahli farmasi jika anda berasa tidak sihat ketika mengambil HIPRANOL.

HIPRANOL membantu merawat kebanyakan pesakit jika diambil dengan betul, tetapi ia mungkin memberi kesan-kesan sampingan pada sesetengah pesakit.

Semua ubat mempunyai kesan-kesan sampingan. Kadang kala ianya serius, tetapi selalunya tidak.

Anda perlu mendapatkan rawatan perubatan jika anda mengalami kesan-kesan sampingan tersebut.

Jangan berasa cemas dengan kesan-kesan sampingan yang disenaraikan. Anda mungkin tidak mengalami sebarang kesan sampingan tersebut.

Hubungi doktor atau ahli farmasi untuk menjawab sebarang pertanyaan anda.

Laporkan kepada doktor anda jika anda mengalami kesan sampingan berikut dan ianya membimbangkan anda:

- rasa loya, muntah
- hilang selera makan
- cirit-birit, sakit perut, kembung perut
- sejuk tangan atau kaki
- pening, lesu
- kulit beruam, muka merah padam
- keguguran rambut
- rasa letih, lemah dan tidak bertenaga

Kesan-kesan sampingan di atas merupakan kesan HIPRANOL yang ringan.

Jika anda mengalami keadaan berikut, laporkan kepada doktor dengan segera:

- gangguan tidur, atau mimpi ngeri
- mata rasa kering, sakit mata (konjunktivitis)
- gangguan penglihatan
- sukar buang air kencing
- perubahan "mood", keliru
- mendapat kesan lebam tanpa sebab
- masalah seksual
- hilang pendengaran
- denyutan jantung perlahan

Kesan-kesan sampingan di atas adalah kesan yang serius.

Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan dengan segera. Kesan-kesan sampingan yang serius jarang berlaku.

Jika anda mengalami keadaan berikut, hentikan pengambilan HIPRANOL dan laporkan kepada doktor anda serta-merta atau kunjungi unit kecemasan di hospital yang berdekatan:

- rasa lesu atau tercungap-cungap selepas senaman ringan
- nafas berdehit, sukar bernafas atau diserang asma (lelah)
- jantung berdenyut pantas (rasa berdebar-debar)

Kesan-kesan sampingan di atas adalah amat serius.

Jika anda mengalaminya, ia adalah tanda-tanda alahan

terhadap HIPRANOL. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan atau perlu dimasukkan ke hospital dengan segera.

Kesan-kesan sampingan tersebut amat jarang berlaku.

Laporkan kepada doktor jika anda mengalami apa-apa yang membuat anda berasa tidak sihat.

Sesetengah pesakit mungkin mengalami kesan-kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas.

Selepas menggunakan HIPRANOL

Penyimpanan

Simpan ubat tablet anda di dalam pek asal sehingga tiba masa untuk menggunakannya.

Jika anda mengeluarkan tablet daripada pek asalnya, ia tidak tersimpan dengan sempurna.

Simpan ubat anda di tempat kering dan sejuk pada suhu bawah 25°C.

Jangan menyimpan HIPRANOL di dalam bilik air atau berdekatan sinki. Jangan tinggalkan PRETENOL di dalam kereta atau ditepi tingkap. Haba dan kelembapan boleh merosakkan ubat.

Jauhkan ubat daripada capaian kanak-kanak. Simpan ubat di dalam almari berkunci yang terletak sekurang-kurangnya satu setengah meter tinggi.

Pelupusan

Jika doktor anda mengarahkan anda berhenti mengambil ubat ini, atau sudah tamat tarikh luputnya, hubungi ahli farmasi anda untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan terhadap baki tersebut.

Deskripsi produk

Rupa dan warna

Tablet HIPRANOL berbentuk bulat dan bergarisan belah di tengah, berwarna pink, diameter 7mm dan bertanda 'DUO861' serta bunga.

Setiap kotak HIPRANOL 40mg mengandungi 1000 biji tablet.

Bahan kandungan

Setiap tablet HIPRANOL mengandungi 40mg propranolol hidroklorida sebagai bahan aktifnya.

Pengilang / Penedar

HIPRANOL dikilang dan diedarkan oleh:

**DUOPHARMA (M) SDN. BHD.
(42491-M)**
WHOLLY OWNED BY CCM
DUOPHARMA BIOTECH
BERHAD (524271-W)
Lot. 2599, Jalan Seruling 59,
Kawasan 3, Taman Klang Jaya,
41200 Klang,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

Pemegang pendaftaran

**DUOPHARMA (M) SDN. BHD.
(42491-M)**
WHOLLY OWNED BY CCM
DUOPHARMA BIOTECH
BERHAD (524271-W)
Lot. 2599, Jalan Seruling 59,
Kawasan 3, Taman Klang Jaya,
41200 Klang, Selangor Darul
Ehsan, Malaysia.

Nombor Pendaftaran:

HIPRANOL 40mg:
MAL19890158A

Tarikh risalah ini disediakan:
Disember 2011.