

What is in this leaflet

This leaflet answers some common questions about APUZIN tablets. It does not contain all the available information. Please talk to healthcare professionals for further information.

What APUZIN is used for

For the treatment of high blood pressure, heart failure, heart attack (myocardial infarction) and kidney disease resulted by uncontrolled high blood sugar (diabetic nephropathy).

How APUZIN works

APUZIN prevent the body from creating a hormone known as angiotensin II. They do this by blocking (inhibiting) a chemical called angiotensin-converting enzyme. This has a variety of effects but essentially relaxes blood vessels and helps to reduce the amount of water re-absorbed by the kidneys. These actions help to decrease blood pressure

Before you use APUZIN

If you must not take it

When you are allergic to captopril or you are pregnant.

Before you start to take it

Tell your doctor if you have allergies to any medicines or if you have any medical conditions.

Taking other medicines

Tell your doctor if you are taking any other medications. There may be an interaction between captopril and some other medications, including potassium sparing diuretic, NSAIDs and other antihypertensive drugs.

How to take APUZIN

How much to take

APUZIN can be taken ranging from 6.25mg to 150mg daily depending on different indication. The maximum daily dose should not exceed 450mg. Please take this medicine according to doctor's instruction.

When to take it

APUZIN should be taken one hour before meals.

How long to take it

APUZIN should be taken according to your doctor's prescription.

If you forgot to take it

If you miss a dose of APUZIN and you are taking it regularly, take it as soon as possible. If several hours have passed or if it is nearing time for the next dose, do not double the dose to catch up, unless advised by your health care provider. Do not take 2 doses at once.

If you take too much

Symptoms include hypotension (dizziness, lightheadedness, or fainting) and angioedema with swelling of the extremities, face, mouth and lips may occur. Quickly seek for medical attention.

While you are using APUZIN

Things you must do

Take this medicine according to doctor's prescription.

Things you must not do

Do not stop taking this medicine or change the dosage without first checking with your doctor. Do not give this medicine to anyone else, even if their symptoms seem similar to yours.

Things to be careful of

Hypotension might occur while you are taking APUZIN. Strictly follow doctor's instruction.

Side effects

The most common side effects of taking APUZIN is dry cough. Possible side effects include low blood pressure, loss of taste perception, rashes, low count of neutrophil (white blood cells), gastrointestinal irritation, or other serious effects.

After using APUZIN

Storage

Store below 30°C, protect from light and moisture.

Disposal

Dispose when you stop taking the tablets as instructed by your doctor or pharmacist or the tablets have passed their expiry date. Ask them what to do with any tablets that are left over.

Product description

What it looks like

A white square tablet, one side impressed with " ".

Ingredients

Captopril
Stearic Acid
Starch
Lactose
Silicon Dioxide
Cellulose

MAL no.

MAL 19985963A

Manufacturer

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru
Bangi, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

Marketing Authorization Holder

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

Date of revision :

17th November 2011

APUZIN Tablet

Captopril 25 mg

Apakah yang ada pada risalah ini

Risalah ini bertujuan untuk menjawab soalan-soalan yang kerap ditanya tentang APUZIN tablet. Risalah ini hanya mengandungi sebahagian maklumat. Sila rujuk kepada ahli profesional kesihatan untuk keterangan lanjut.

Apakah kegunaan APUZIN

Digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi, sakit jantung, serangan sakit jantung dan penyakit buah-pinggang yang disebabkan oleh penyakit kencing manis yang tidak terkawal.

Bagaimana APUZIN berfungsi

APUZIN menghalang badan daripada menghasilkan hormon yang dikenali sebagai angiotensin II. Ini berlaku disebabkan dengan penghalangan bahan kimia yang dipanggil enzim penukar angiotensin. Pelbagai kesan boleh didapati, tetapi asasnya melegakan saluran darah dan membantu untuk mengurangkan jumlah air yang diserap semula oleh buah pinggang. Tindakan ini membantu untuk mengurangkan tekanan darah

Sebelum Mengambil APUZIN

Bila tidak boleh mengambil

Jika anda alah dengan captopril dan jika anda mengandung

Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor jika anda alah terhadap sebarang ubat ataupun mempunyai sebarang masalah kesihatan.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat. Interaksi di antara captopril dengan ubat-ubatan seperti diuretik hemat kalium, NSAIDs, dan agen antihipertensi yang lain mungkin akan berlaku.

Cara menggunakan APUZIN

Berapa banyak harus diambil

APUZIN boleh diambil dari 6.25mg ke 150mg setiap hari berdasarkan indikasi yang berlainan. Dos maksima harian tidak harus melebihi 450mg. Sila mengambil ubat ini dengan mengikut arahan doktor.

Bila perlu diambil

APUZIN perlu diambil 1 jam sebelum makan.

Berapa lama perlu diambil

APUZIN perlu diambil mengikut preskripsi doktor anda.

Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa satu dos dan anda mengambil ubat ini secara berterusan, ambil dos itu secepat mungkin. Jika sudah beberapa jam selepas masa makan ubat berlalu ataupun sudah mendekati masa pengambilan dos yang kedua, jangan mengambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa, kecuali dinasihati oleh doktor. Jangan mengambil 2 dos pada masa yang sama.

Jika mengambil terlebih (terlebih dos)

Simptom-simptom seperti hipotensi (pening, sakit kepala ringan atau pengsan) dan angioedema bersama dengan pembengkakkan pada hujung tangan dan kaki, muka, mulut dan bibir mungkin akan berlaku. Minta nasihat daripada doktor jika simptom berlaku

Semasa menggunakan APUZIN

Perkara yang perlu dilakukan

Ikat preskripsi doktor anda semasa mengambil ubat ini.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah pengambilan dos tanpa arahan doktor. Jangan memberi ubat ini kepada sesiapa walaupun simptom mereka serupa dengan anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Hipotensi mungkin akan berlaku semasa anda mengambil APUZIN. Ikut arahan doktor dengan tegas.

Kesan-sesan sampingan

Kesan sampingan paling umum yang disebabkan oleh pengambilan APUZIN adalah batuk kering. Kesan sampingan yang mungkin akan berlaku termasuk tekanan darah rendah, kehilangan persepsi rasa, ruam kulit, kiraan neutrofil (sel darah putih) yang rendah, iritasi usus, atau kesan lain yang serius.

Selepas menggunakan APUZIN

Cara penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

Cara pelupusan

Jika doktor atau ahli farmasi anda mengarahkan supaya berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini telah luput tarikh. Sila bertanya kepada doktor atau ahli farmasi tentang cara pengendalian ubat yang tertinggal.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Tablet yang berwarna putih dan berbentuk segi empat tepat dengan bentuk "■■■■" pada satu permukaan.

Bahan-bahan kandungan

Captopril

Stearic Acid

Starch

Lactose

Silicon Dioxide

Cellulose

MAL no.

MAL 19985963A

Pengilang

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP :

17hb November 2011

Marketing Authorization Holder:

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.