

CORBETA TABLET 40 mg and 80 mg®

PROPRANOLOL TABLET 40 mg and 80 mg

What is in this leaflet:

1. What Corbета Tablet 40 mg and 80 mg is used for
2. How Corbета Tablet 40 mg and 80 mg works
3. Before you use Corbета Tablet 40 mg and 80 mg
4. How to take Corbета Tablet 40 mg and 80 mg
5. While you are using Corbета Tablet 40 mg and 80 mg
6. Side Effects
7. How to store and dispose
8. Product description

What Corbета Tablet 40 mg and 80 mg is used for

Corbета Tablet 40 mg and 80 mg is used to:

1. Treat high blood pressure.
2. Treat severe chest pain.
3. Control irregular or fast heart beats and other symptoms caused by an overactive thyroid gland.
4. To reduce migraine attacks.
5. To calm people who are anxious or worried.
6. Prevent stomach bleeding in patients with high blood pressure in their liver or swollen blood vessels in their gullet.

How Corbета Tablet 40 mg and 80 mg works

Propranolol works by slowing down the heart and decreasing the amount of blood it pumps out. This helps to decrease blood pressure, the heart pumps more efficiently, and reduces the workload on the heart.

Before you use Corbета Tablet 40 mg and 80 mg

Corbета Tablet 40 mg and 80 mg should not be used in the following conditions:
Allergic to any ingredient of the tablet, severe heart block, sick sinus syndrome, cardiogenic shock, bronchial asthma, child with diabetes and heart failure.

Before start using Corbета Tablet 40 mg and 80 mg tell your doctor or pharmacist if you: have other heart problem, have a history of allergic reactions, have kidney or liver disease, have Wolff-Parkinson-White syndrome, smoke or drink alcohol.

Corbета Tablet 40 mg and 80 mg should not be used with verapamil, clonidine and mibefradil.

How to take Corbета Tablet 40 mg and 80 mg

How much to take

Always take the dose exactly as your doctor has told you.

Adults dosage:

Hypertension: the usual effective dose range is 40-320 mg per day.

Angina pectoris: the average optimum dosage is 160 mg per day.

Migraine: initial dose is 80 mg/day, may increase up to 160-240 mg/day.

Paediatric dosage:

Doses are decided using body weight.

When to take it

Take Corbета Tablet 40 mg and 80 mg before meals. If you are taking an antacid with aluminium in it, take it at least 2 hours after taking Corbета Tablet 40 mg and 80 mg.

How long to take it

Do not stop taking this medicine unless your doctor tells you to stop. Doctor will gradually lower your dose before stop taking it.

If you forget to take it

If you miss a dose of Corbета Tablet 40 mg and 80 mg, take it as soon as possible. Unless if nearly time for next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Do not take 2 doses at once.

If you take too much (overdose)

If you have taken more than the prescribed dose, contact your doctor or pharmacist. Overdose symptoms are dizziness, shortness of breath, swelling of the hands/ankles/feet, and very slow heart rate.

While you are using Corbета Tablet 40 mg and 80 mg

1. Do not suddenly stop taking the medicine.
2. Do not take more than the recommended dose.
3. You are advised to avoid alcohol.
4. Do not drive or operate machinery if there is visual disturbances, hallucinations, fatigue, confusion, dizziness or tiredness after taking the medicine.

5. If you have been told that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicine.

Side Effects

Side effects of Corbета Tablet 40 mg and 80 mg such as slow heart rate and low blood pressure causing dizziness, light-headedness, fainting or blurred vision. Allergic reaction such as itching, difficulty in breathing and swelling of the face, lips, throat or tongue.

How to store and dispose

Storage

Keep container tightly closed in a dry place, below 25°C. Protect from light. Keep out of the reach of children..

Disposal

Do not dispose the medicine into wastewater or household garbage. Ask your pharmacist how to dispose of medicines that are no longer required.

Product Description

What it looks like?

Corbета Tablet 40 mg is round and pink in color. The pack sizes are: Plastic Container of 30 tablets, Plastic Container of 500 and 1000 tablets (for Tender or Export only), Blister pack of 10's: 3, 50, and 100 strips of 10 tablets.

Corbета Tablet 80 mg is round and yellow in color. The pack sizes are: Plastic Container of 30 tablets, Plastic Container of 500 tablets (for Tender or Export only).

Ingredients

The active substance is propranolol hydrochloride either 40 mg and 80 mg per tablet.

The other ingredients of Corbета Tablet 40 mg are lactose, maize starch, ponceau 4R soluble, sodium starch glycolate, and magnesium stearate.

The other ingredients of Corbета Tablet 80 mg are lactose, maize starch, Colour D & C Yellow No. 10, magnesium stearate.

Registration Numbers:

Corbета Tablet 40 mg: MAL19860175A
Corbета Tablet 80 mg: MAL19860173A

Manufactured by:

Idaman Pharma Manufacturing Sdn Bhd (661901-P)
Lot 24, Bakar Arang Industrial Estate, Sungai Petani, Kedah, Malaysia.

Date of revision:

Marketing Authorisation Holder

July 22th, 2011

IDAMAN PHARMA MANUFACTURING SDN BHD

CORBETA TABLET 40 mg and 80 mg®

PROPRANOLOL TABLET 40 mg and 80 mg

Apakah yang ada pada risalah ini:

1. Apa kegunaan Corbета Tablet 40 mg dan 80 mg
2. Bagaimana Corbета Tablet 40 mg dan 80 mg berfungsi
3. Sebelum mengambil Corbета Tablet 40 mg dan 80 mg
4. Cara pengambilan Corbета Tablet 40 mg dan 80 mg
5. Semasa menggunakan Corbета Tablet 40 mg dan 80 mg
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan
8. Deskripsi produk

Apa kegunaan Corbета Tablet 40 mg dan 80 mg

Corbета Tablet 40 mg dan 80 mg digunakan untuk:

1. Mengubati tekanan darah tinggi.
2. Mengubati sakit dada yang teruk.
3. Mengawal denyut jantung yang cepat atau tidak teratur dan gejala yang disebabkan oleh kelenjar tiroid.
4. Mengurangi serangan migrain.
5. Menenangkan orang yang cemas dan bimbang.
6. Mencegah pendarahan perut pada pesakit darah tinggi dalam hati mereka atau pembuluh darah bengkok di tekak.

Bagaimana Corbета Tablet 40 mg dan 80 mg berfungsi

Propranolol bekerja dengan melambatkan jantung dan menurunkan darah yang dipam keluar. Hal ini membantu untuk menurunkan tekanan darah, jantung mengepam lebih cekap, dan mengurangkan beban kerja pada jantung.

Sebelum mengambil Corbета Tablet 40 mg dan 80 mg

Corbета Tablet 40 mg dan 80 mg tidak boleh digunakan dalam keadaan berikut: Alergi terhadap bahan propranolol, blok jantung yang parah, sindrom sinus sakit, kejutan kardiogenik, asma bronkial, kanak-kanak dengan diabetes dan kegagalan jantung.

Sebelum menggunakan Corbета Tablet 40 mg dan 80 mg maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai: masalah jantung yang lain, sejarah reaksi alergi, penyakit ginjal atau hati, sindrom 'Wolff-Parkinson-White', merokok atau minum alkohol.

Corbета Tablet 40 mg dan 80 mg seharusnya tidak digunakan bersama verapamil, clonidine and mibefradil.

Cara pengambilan Corbета Tablet 40 mg dan 80 mg

Berapa banyak untuk diambil

Dos yang diambil mengikuti arahan doktor kepada anda.

Dos dewasa:

Tekanan darah tinggi: julat dos efektif adalah 40-320 mg sehari.

Kejang jantung: dos optimum rata-rata adalah 160 mg sehari.

Migrain: dos awal adalah 80 mg/hari, boleh meningkat sehingga 160-240 mg/hari.

Dos kanak-kanak:

Dos ditetapkan berdasarkan berat badan.

Bila ubat diambil

Ambil ubat ini sebelum makan. Jika anda mengambil antasid dengan aluminium didalamnya, ambil ubat selepas 2 jam mengambil Corbета Tablet 40 mg dan 80 mg.

Berapa lama ubat diambil

Jangan berhenti minum ubat ini kecuali atas arahan doktor anda. Doktor akan menurunkan dos secara berperingkat sebelum anda berhenti mengambil ubat.

Jika anda lupa mengambil ubat

Jika anda terlewat mengambil dos Corbета Tablet 40 mg dan 80 mg, ambil ubat secepat mungkin. Kecuali jika hampir masa untuk dos berikutnya, lewatkan dos tersebut dan kembali ke jadual dos rutin. Jangan mengambil 2 dos sekaligus.

Jika anda mengambil ubat terlalu banyak

Jika anda mengambil dos lebih dari yang ditetapkan, hubungi doktor atau ahli farmasi anda. Tanda-tanda dos berlebihan adalah seperti pening, sesak nafas, pembengkakan tangan/pergelangan kaki/kaki, denyutan jantung sangat lambat.

Semasa menggunakan Corbета Tablet 40 mg dan 80 mg

1. Jangan berhenti mengambil ubat secara mendadak.
2. Jangan mengambil lebih dari dos yang disyorkan.
3. Anda dinasihatkan untuk mengelakkan pengambilan alkohol.
4. Jangan memandu atau mengendalikan mesin jika ada gangguan penglihatan, halusinasi, keletihan, kebingungan,

pening, keletihan setelah mengambil ubat.

5. Jika anda telah diberitahu bahawa anda mempunyai intoleransi terhadap gula, hubungi doktor sebelum mengambil ubat ini.

Kesan-kesan sampingan

Kesan sampingan ubat ini adalah seperti denyut jantung yang lambat dan tekanan darah rendah menyebabkan pening, kepala ringan, pangsang, penglihatan kabur. Reaksi alergi seperti gatal, kesulitan bernafas dan pembengkakan di wajah, bibir, tekak, atau lidah.

Cara penyimpanan dan pelupusan

Penyimpanan

Simpan ke dalam bekas yang tertutup rapat dan diletak ditempat yang kering, dibawah suhu 25°C. Jauhi dari cahaya dan kanak-kanak.

Pelupusan

Jangan buang ubat ke dalam longkang dan tong sampah. Bertanya kepada ahli farmasi anda cara membuang ubat yang tidak diperlukan lagi.

Diskripsi produk

Rupa dan warna tablet

Corbета Tablet 40 mg berbentuk tablet bulat dan berwarna merah muda. Saiz pek adalah: Botol plastik dari 30 tablet. Botol plastik dari 500 and 1000 tablet (untuk Tender atau Eksport sahaja). Blister pek 10's: 3, 50, dan 100 strip dari 10 tablet.

Corbета Tablet 80 mg berbentuk tablet bulat dan berwarna kuning. Saiz pek adalah: Botol plastik dari 30 tablet, Botol plastik dari 500 tablet (untuk Tender atau Eksport sahaja).

Bahan-bahan

Bahan aktif adalah propranolol hidroklorik baik 40 mg and 80 mg per tablet.

Bahan lain dari Corbета Tablet 40 mg adalah laktosa, pati jagung, ponceau 4R larut, 'sodium starch glycolate', dan magnesium stearat.

Bahan lain dari Corbета Tablet 80 mg adalah laktosa, pati jagung, A & L warna kuning No 10, magnesium stearat.

Nombor Pendaftaran:

Corbета Tablet 40 mg: MAL19860175A
Corbета Tablet 80 mg: MAL19860173A

Dikilangkan oleh:

Idaman Pharma Manufacturing Sdn Bhd (661901-P)
Lot 24, Bakar Arang Industrial Estate, Sungai Petani, Kedah, Malaysia.

Tarikh semakan:

Pemegang Kuasa Pemasaran