

Provincace Tablet 4mg

Each tablet contains Perindopril Erbumine 4mg.

In this leaflet:

- *What is Provincace used for*
- *How Provincace works*
- *Before you take Provincace*
- *How to take Provincace*
- *While you are taking Provincace*
- *Possible side effects*
- *How should you keep Provincace*
- *Product description*

What is Provincace used for

It is used to treat high blood pressure (hypertension) and heart failure.

How Provincace works

Perindopril is the inhibitor for angiotensin converting enzyme (ACE). It inhibits the conversion of angiotensin (a hormone) to the active form which narrows the blood vessels and thus raises blood pressure.

Before you take Provincace

When you must not take it

Do not take Provincace if you:

- are allergic (hypersensitive) to perindopril, any ingredients in this medicine or any other ACE inhibitors.
- have experienced angioedema (swelling of face, eyes, lips, tongue) upon taking ACE inhibitor.
- have family history of angioedema in any other circumstances.
- are pregnant or plan to pregnant.
- are breast-feeding or plan to start breast-feeding.

Before you take Provincace Tablet

Tell your doctor or pharmacist if you:

- have low blood pressure.
- have blockage of blood vessels.
- have kidney failure and/or undergo haemodialysis.
- have family history of angioedema (swelling of face, eyes, lips, tongue).
- will be undergone anaesthesia.
- have diabetes.
- are taking other blood pressure lowering drugs.
- are taking lithium.

Taking other medicines

Tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without prescription.

How to take Provincace

How much to take

High blood pressure:

4mg once daily. Can be increased to 8mg once daily based on prescription.

Heart failure:

2mg once daily. Can be increased to 4mg once daily based on prescription.

Your doctor or pharmacist will determine the appropriate tablet strength for you, depending on your condition, current treatment and personal risk status.

When to take it

Once daily early in the morning before meal.

How long to take it

Follow the prescription from your doctor or pharmacist. Ask your doctor or pharmacist before prolonged use of this medicine.

If you forget to take it

Take it as soon as you remember, unless it is nearly time for your next dose, skip the missed dose. Then go on as before. Never double up on the next dose to make up for the one missed.

If you take too much

Symptoms of overdose include:

- low blood pressure
- shortage of blood supply to body
- electrolyte imbalance
- kidney failure
- abnormal heart beat (too fast or too slow)
- dizziness
- cough
- anxiety

Seek immediate medical attention if you have taken too much or worried with your conditions.

While you are taking Provincace

Things you must do

Always wash your hand before handle the tablets. Take the tablets with water and try to take at the same time each day.

Things you must not do

Do not chew the tablets and swallow it with water.

Do not take this medicine by yourself without prescription from your doctor or pharmacist.

Things to be careful of

Tell your doctor or pharmacist if you:

- are allergic to any ingredients in this medicine.
- have cough upon taking this medicine.
- develop low blood pressure and/or angioedema.
- have increased potassium levels in blood.

- have abnormal reading of white blood cells.
- have anaemia (deficiency in red blood cells).
- have liver failure.
- are pregnant or plan to pregnant.
- are breast-feeding or plan to start breast-feeding.

Possible side effects

- Headache, dizziness, tingling or pricking sensation
- Vision disturbance
- Ringing or buzzing in ears (tinnitus)
- Low blood pressure
- Cough
- Difficulty in breathing
- Nausea, vomiting, stomach pain
- Taste sense distorted, indigestion
- Diarrhoea, constipation
- Skin rashes and itchiness
- Muscle cramps
- Weak or lack of energy

Seek immediate medical attention if you experience any side effects or allergic reactions.

How should you keep Provincace

Store at room temperature below 30 °C.

Protect from moisture.

Keep out of the reach of the children.

Do not use this medicine after the expiry date.

Product Description

How Provincace looks like

White color, normal convex tablet with break line on one side and plain on the reverse.

Available in blister strips of 10's in packing of 30 tablets per box.

What Provincace contains

It contain Perindopril erbumine 4mg.

Other ingredients are Colloidal Silicon Dioxide, Cellactose, Microcrystalline Cellulose, Lactose Anhydrous and Magnesium Stearate.

Manufactured and Marketed by

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd
1-5 Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka,
Malaysia.

Registration number

MAL04125486A

Date of Revision: 17 August 2012

Provinace Tablet 4mg

Setiap tablet mengandungi Perindopril Erbumine 4mg.

Apakah yang ada pada risalah ini?

- Apakah kegunaan Provinace
- Bagaimana Provinace berfungsi
- Sebelum mengambil Provinace
- Cara mengambil Provinace
- Semasa mengambil Provinace
- Kesan-kesan sampingan
- Cara penyimpanan Provinace
- Deskripsi produk

Apakah kegunaan Provinace

Ia digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi (hipertensi) dan kegagalan jantung.

Bagaimana Provinace berfungsi

Perindopril merupakan perencat bagi angiotensin converting enzyme (ACE). Ia menyekat penukaran angiotensin (hormon) kepada bentuk aktif yang mengecutkan saluran darah dan seterusnya meningkatkan tekanan darah.

Sebelum mengambil Provinace

Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil ubat ini jika anda:

- alahan (hipersensitif) kepada perindopril, bahan lain yang terkandung di dalam ubat ini atau perencat ACE yang lain.
- pernah mengalami angioedema (bengkak pada muka, mata, bibir, lidah) setelah mengambil perencat ACE.
- ahli keluarga pernah mengalami angioedema (kebengkakan) di bawah sebarang keadaan.
- hamil atau merancang untuk hamil.
- sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusu.

Sebelum mula mengambil

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- mempunyai tekanan darah yang rendah
- mempunyai saluran darah tersumbat
- mempunyai kegagalan fungsi ginjal dan/atau menjalani rawatan hemodialisis
- mempunyai sejarah keluarga angioedema (bengkak pada muka, mata, bibir, lidah)
- akan mengambil ubat bius
- mempunyai diabetes
- ada mengambil ubat penurunan tekanan darah yang lain.
- ada mengambil litium

Jika mengambil lain-lain ubat

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang atau kebelakangan ini

mengambil ubat lain. Ini termasuk sebarang ubat tanpa preskripsi.

Cara mengambil Provinace

Berapa banyak harus diambil

Tekanan darah tinggi:

4mg sekali sehari. Dos boleh ditingkatkan kepada 8mg sekali sehari berdasarkan preskripsi.

Kegagalan jantung:

2mg sekali sehari. Dos boleh ditingkatkan kepada 4mg sekali sehari berdasarkan preskripsi.

Doktor atau ahli farmasi akan preskrip kekuatan ubat yang bersesuaian, bergantung kepada keadaan anda, rawatan semasa dan risiko berlainan setiap individu

Bila perlu diambil

Satu kali sehari, diambil pada awal pagi sebelum sarapan.

Berapa lama perlu diambil

Berdasarkan preskripsi doktor atau ahli farmasi. Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini untuk tempoh masa yang lebih panjang.

Jika anda terlupa mengambil

Ambil secepat mungkin apabila anda teringat. Jika dos seterusnya adalah hampir, ambil dos yang seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

Jika mengambil berlebihan

Simptom akibat dos berlebihan termasuk:

- tekanan darah yang rendah
- kekurangan bekalan darah di dalam badan
- ketidakseimbangan elektrolit
- kegagalan fungsi ginjal
- denyutan jantung tidak normal (terlalu cepat atau terlalu perlahan)
- pening
- batuk
- kegelisahan

Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda terambil berlebihan atau bimbang akan keadaan yang dialami.

Semasa mengambil Provinace

Perkara yang harus dilakukan

Sentiasa cuci tangan sebelum mengambil tablet. Makan tablet bersama air dan cuba mengambilnya pada waktu yang sama setiap hari.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan kunyah tablet. Telan tablet dengan air. Jangan ambil ubat ini tanpa preskripsi doktor atau ahli farmasi.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- alahan kepada bahan yang terkandung di dalam ubat ini.
- batuk setelah mengambil ubat ini.
- mengalami tekanan darah rendah dan/atau angioedema.
- mengalami peningkatan paras kalium dalam darah.
- mempunyai bacaan sel darah putih yang tidak normal.
- mempunyai (kurang sel darah merah) anemia.
- mempunyai kegagalan fungsi hati.
- hamil atau merancang untuk hamil.
- sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusu.

Kesan-kesan sampingan

- Sakit kepala, pening, sesemut atau sakit seperti ditusuk.
- Gangguan penglihatan.
- Bebunyi di telinga (tinnitus).
- Tekanan darah rendah.
- Batuk.
- Sukar untuk bernafas.
- Loya, muntah, sakit perut.
- Gangguan deria rasa, masalah penghadaman.
- Cirit-birit, sembelit.
- Ruam kulit dan gatal-gatal.
- Kekejangan otot.
- Lemah atau kurang bertenaga.

Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan atau masalah alahan.

Cara penyimpanan Provinace

Simpan dalam suhu bilik di bawah 30°C.

Lindungi dari kelembapan.

Jauhi dari kanak-kanak.

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput.

Deskripsi produk

Rupa dan warna produk

Tablet cembung biasa, berwarna putih dengan garis tengah pada satu belah dan tanpa garis pada sebelah yang lain.

Didapati dalam blister strips 10's di dalam kotak bungkusan 30 tablet.

Bahan-bahan kandungan

mengandungi Perindopril erbumine 4mg.

bahan-bahan kandungan lain ialah, Colloidal Silicon Dioxide, Cellactose,

Microcrystalline Cellulose, Lactose
Anhydrous and Magnesium Stearate.

Dikilangkan dan dipasarkan oleh

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd
1-5 Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka,
Malaysia.

Nombor pendaftaran

MAL04125486A

Tarikh kemaskini: 17 Ogos 2012