

# ASMIN TABLET 2MG

# ASMIN TABLET 4MG

# ASMIN SYRUP

Salbutamol 2mg / Salbutamol 4mg

Salbutamol 2mg/5ml

---

## **What is in this leaflet**

- What *Asmin* is used for
- How *Asmin* work
- Before you use *Asmin*
- How to take *Asmin*
- While you are using *Asmin*
- Side effects
- After using *Asmin*
- Product description
- Manufacturer
- Marketing authorization holder
- Date of revision

## **What *Asmin* is used for**

For the relief of wheezing or difficulty in breathing in asthma, and other conditions involving airway obstruction.

## **How *Asmin* work**

Salbutamol is a direct acting sympathomimetic amines. It acts selectively on beta-2-adrenergic receptors in the lung to relax bronchial smooth muscle, thereby relieving breathing difficulties or wheezing and reducing airway resistance.

## **Before you use *Asmin***

*When you must not take it*

Avoid if you are allergic to sympathomimetic drugs.

*Before you start to take it*

Caution if there are heart disorders, including coronary insufficiency and hypertension, overactive thyroid glands and diabetes mellitus.

*Taking other medications*

**Beta adrenergic blocking agents-**

Concurrent use may result in mutual reduction in therapeutic effects. **Monoamine oxidase**

**inhibitors (MAO) or tricyclic**

**antidepressants-co-administration** may increase the action of salbutamol on the vascular system. **Xanthines or other sympathomimetics**-concurrent use may increase central nervous system (CNS) stimulation and other additive toxic effects.

## **How to take *Asmin***

*How much to take*

Adult and children over 12 years: Oral, 2 to 4mg 3 or 4 times daily, or as directed by physician. The total daily dose should not exceed 32mg.

*When to take it*

Take salbutamol exactly as your doctor has told you.

*How long to take it*

You should check with your doctor or pharmacist.

*If you forget to take it*

Do not take a double dose to make up for a forgotten tablet.

*If you take too much (overdose)*

Signs of overdose include chest pains, hypertension, irregular heartbeat. For treatment of overdose, consult doctor immediately if symptoms exist.

## **While you are using *Asmin***

*Things you must do*

Inform doctor of medications you are taking. Check with doctor before discontinuing medication.

*Things you must not do*

You must take your medication as directed.

*Things to be careful of*

If you are pregnant or become pregnant or breast-feeding during treatment, you should not take salbutamol unless your doctor tells you to. This is because the

risk to your unborn baby is not yet known.

## **Side effects**

Nausea, nervousness or restlessness, fast or pounding heartbeat and trembling may occur.

## **After using *Asmin***

*Storage*

Store in cool, dry place below 30°C. Protect from light. Keep out of reach of children.

*Disposal*

Do not dispose via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required.

## **Product description**

*What it looks like*

**Asmin 2:** White, round, flat, top-scored.

**Asmin 4:** White, round, flat, top-scored.

**Asmin syrup:** Red coloured, strawberry flavoured syrup.

*Ingredients*

**Asmin 2:** salbutamol sulphate, lactose, cornstarch, polyvinylpyrrolidone and magnesium stearate.

**Asmin 4:** salbutamol sulphate, lactose, cornstarch, polyvinylpyrrolidone and magnesium stearate.

**Asmin syrup:** salbutamol sulphate, liquid glucose, raspberry red, methyl parabens, propyl parabens, strawberry flavour, purified water and syrup.

**MAL NO:** **Asmin 2:** MAL19900025A

**Asmin 4:** MAL19900026A

**Asmin syrup:** MAL19890567A

## **Manufacturer**

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.

1505, Lorong Perusahaan Utama 1

Taman Perindustrian Bukit Tengah

14000 Bukit Mertajam, Penang, Malaysia.

## **Date of revision**

01-03-2012

## **Marketing Authorization Holder**

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.

Penang, Malaysia.

# ASMIN TABLET 2MG

# ASMIN TABLET 4MG

# ASMIN SYRUP

Salbutamol 2mg / Salbutamol 4mg  
Salbutamol 2mg/5ml

---

## Apakah yang ada pada risalah ini

- Apakah kegunaan *Asmin*
- Bagaimana *Asmin* berfungsi
- Sebelum mengambil *Asmin*
- Cara menggunakan *Asmin*
- Semasa menggunakan *Asmin*
- Kesan-kesan sampingan
- Cara penyimpanan dan pelupusan *Asmin*
- Maklumat lanjut
- Pengilang
- Tarikh kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan *Asmin*

Untuk melegakan kesukaran bernafas dalam penyakit asma, dan keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan halangan saluran pernafasan.

## Bagaimana *Asmin* berfungsi

Salbutamol adalah ubat yang bertindak terus pada bahagian paru-paru. Ia merehatkan otot-otot paru-paru supaya dapat melegakan kesukaran bernafas dan mengurangkan halangan pada saluran pernafasan.

## Sebelum mengambil *Asmin*

*Bila tidak boleh mengambil*

Jikalau ada kesan alergi kepada ubat-ubat simpatomimetik.

*Sebelum mula mengambil*

Berhati-hati jika ada penyakit jantung, termasuk kelemahan jantung dan penyakit tekanan darah tinggi, kelenjar tiroid yang terlalu aktif dan penyakit kencing manis.

*Jika mengambil ubat-ubat lain*

Ubat penghalang beta-

Penggunaan serentak mungkin mengakibatkan pengurangan salingan kesan terapeutik. Ubat perencat monoamin oksidase (MAO) atau ubat pengawal depresi trisiklik-penggunaan bersama mungkin meningkatkan kesan tindakan salbutamol pada system saluran. Xantin atau ubat simpatomimetik lain-penggunaan bersama mungkin meningkatkan rangsangan system saraf pusat (SSP) dan kesan tagihan lain.

## Tarikh kemaskini RiMUP

01-03-2012

## Cara menggunakan *Asmin*

*Berapa banyak harus diambil*

Dewasa dan kanak-kanak berumur 12 tahun: Oral, 2 to 4mg 3 atau 4 kali sehari, atau ikut arahan doktor. Jumlah dos harian tidak melebihi 32mg.

*Bila perlu diambil*

Ambil salbutamol mengikut arahan oleh doktor.

*Berapa lama perlu diambil*

Perlu mengikut nasihat doktor atau ahli farmasi.

*Jika terlupa mengambil*

Jangan mengambil dos berganda

sebagai gantian dos yang terlepas.

*Jika mengambil berlebihan(terlebih dos)*

Tanda-tanda lebih dos ialah sakit dada, tekanan darah tinggi, denyutan jantung tak teratur. Perlu dapatkan rawatan segera doktor jikalau terdapat tanda-tanda terlebih dos.

## Semasa menggunakan *Asmin*

*Perkara yang perlu dilakukan*

Beritahu doktor ubat yang sedang diambil. Dapatkan nasihat doktor sebelum hentikan pengambilan ubat, pengurangan dos perlu dilakukan secara beransuran dalam rawatan penyakit arteri jantung.

*Perkara yang tidak boleh dilakukan*

Pengambilan ubat mestilah seperti yang diarahkan.

*Perkara yang perlu diberi perhatian*

Beritahu doktor jikalau hamil atau penyusuan semasa rawatan, atenolol tidak boleh diambil tanpa arahan doktor. Ini adalah kerana tiada maklumat mengenai risiko kepada bayi dalam kandungan.

## Kesan-kesan sampingan

Loya, keresahan, denyutan jantung cepat lagi kuat dan menggeletar mungkin berlaku.

## Cara penyimpanan dan pelupusan

*Asmin*

*Penyimpanan*

Simpan di tempat yang dingin dan kering, bawah 30°C. Jauhkan dari cahaya. Jauhkan dari kanak-kanak.

*Pelupusan*

Jangan dibuang dalam air sisa atau sisa buangan. Dapatkan nasihat ahli farmasi cara pelupusan ubat yang ingin dibuang.

## Maklumat lanjut

*Rupa dan warna produk*

*Asmin 2*: Tablet bulat, rata dan berwarna putih.

*Asmin 4*: Tablet bulat, rata dan berwarna putih.

*Asmin syrup*: Sirap warna merah dan berperisa strawberi.

*Bahan-bahan kandungan*

*Asmin 2*: salbutamol sulphate, laktos, tepung jagung, polivinilpirolidon dan magnesium stearat.

*Asmin 4*: salbutamol sulphate, laktos, tepung jagung, polivinilpirolidon dan magnesium stearat.

*Asmin syrup*: salbutamol sulphate, glukos cair, merah raspberi, metilparaben, propilparaben, perisa strawberi, air dan sirap.

*MAL NO*: *Asmin 2*: MAL19900025A

*Asmin 4*: MAL19900026A

*Asmin syrup*: MAL19890567A

## Pengilang

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.  
1505, Lorong Perusahaan Utama 1  
Taman Perindustrian Bukit Tengah  
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang,  
Malaysia.

## Pemegang pendaftaran keluaran

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.  
Pulau Pinang, Malaysia.