

GLIX Tablet
Glipizide 5 mg

What is in this leaflet

This leaflet answers some common questions about GLIX tablets. It does not contain all the available information. Please talk to healthcare professionals for further information.

What GLIX is used for

For the control of high blood glucose level in type 2 diabetes.

How GLIX works

It helps to lower blood sugar level by stimulating the release of insulin from pancreas.

Before you use GLIX

When you must not take it

When you are allergic to glipizide. If you have diabetic ketoacidosis, severe hepatic and renal problems, you must not take this medicine.

Before you start to take it

Tell your doctor if you have allergies to any medicines or if you have any medical conditions.

Taking other medicines

Tell your doctor if you are taking any other medications. There may be an interaction between glipizide and some other medications, including NSAIDs, salicylates, sulfonamides, chloramphenicol, probenecid, MAOIs and beta blockers.

How to take GLIX

How much to take

Initially, the recommended dosage is 2.5-5mg daily, dosage up to 15mg may be given as a single dose and the maximum daily dosage is 40 mg.

When to take it

GLIX should be taken 30 minutes before breakfast.

How long to take it

GLIX should be taken according to your doctor's instruction.

If you forgot to take it

If you miss a dose of GLIX and you are taking it regularly, take it as soon as possible. If several hours have passed or if it is nearing time for the next dose, do not double the dose to catch up, unless advised by your health care provider. Do not take 2 doses at once.

If you take too much

Hypoglycemia with symptoms such as loss of consciousness may occur. Quickly seek for medical attention.

While you are using GLIX

Things you must do

Take this medicine according to doctor's instruction.

Things you must not do

Do not stop taking this medicine or change the dosage without first checking with your doctor. Do not give this medicine to anyone else, even if their symptoms seem similar to yours.

Things to be careful of

GLIX should be taken with caution in patients with impaired renal or hepatic function. Hypoglycemia state may occur while taking this drug especially in combination with other oral antidiabetic medication.

Side effects

Possible side effects include low blood pressure, nausea, diarrhea, constipation, allergic skin reactions, lowering of white blood cells count, dizziness and others.

After using GLIX

Storage

Store below 30°C, protect from light and moisture.

Disposal

Dispose when you stop taking the tablets as instructed by your doctor or pharmacist or the tablets have passed their expiry date. Ask them what to do with any tablets that are left over.

Product description

What it looks like

A white to off-white round-shaped tablet, one side impressed with a score, and the other side with a mark "G".

Ingredients

Glipizide
Sodium Starch Glycolate
Silicon Dioxide
Starch
Stearic Acid
Cellulose
Lactose

MAL no.

MAL 19988493A

Manufacturer

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3, 5 & 7, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru
Bangi, 43000 Kajang, Selangor D.E.,
Malaysia.

Date of revision :

16th Dec. 2011

Marketing Authorization Holder

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

GLIX Tablet
Glipizide 5 mg

Apakah yang ada pada risalah ini

Risalah ini bertujuan untuk menjawab soalan-soalan yang kerap ditanya tentang GLIX tablet. Risalah ini hanya mengandungi sebahagian maklumat. Sila rujuk kepada pakar kesihatan untuk keterangan lanjut.

Apakah kegunaan GLIX

Digunakan untuk mengawal penyakit kencing manis jenis kedua.

Bagaimana GLIX berfungsi

Menurunkan tahap gula darah dengan merangsang perembesan insulin oleh pankreas.

Sebelum Mengambil GLIX

Bila tidak boleh mengambil

Jika anda alah dengan glipizide. Elakkan pengambilan ubat ini jika anda mempunyai ketoasidosis diabetik, masalah hati dan ginjal yang serius.

Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor jika anda alah terhadap sebarang ubat ataupun mempunyai sebarang masalah kesihatan.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat. Interaksi dengan ubat-ubatan seperti NSAIDs, salicylates, sulfonamides, chloramphenicol, probenecid, MAOIs dan beta blocker mungkin akan berlaku.

Cara menggunakan GLIX

Berapa banyak harus diambil

Dos permulaan yang dicadangkan ialah 2.5-5mg sehari, dos sehingga 15mg boleh diberikan sebagai dose tunggal dan dos maksima sehari adalah 40mg.

Bila perlu diambil

GLIX perlu diambil 30 minit sebelum sarapan.

Berapa lama perlu diambil

GLIX perlu diambil mengikut arahan doktor anda.

Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa satu dos dan anda mengambil ubat itu secara berterusan, ambil dos itu secepat mungkin. Jika sudah beberapa jam selepas masa makan ubat berlalu ataupun sudah mendekati masa pengambilan dos yang kedua, jangan mengambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa, kecuali dinasihati oleh doktor. Jangan mengambil 2 dos pada masa yang sama.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hipoglisemia dengan simptom seperti hilang kesedaran mungkin akan berlaku. Minta nasihat daripada doktor dengan segera.

Semasa menggunakan GLIX

Perkara yang perlu dilakukan

Ikut arahan doktor anda semasa mengambil ubat ini.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah pengambilan dos tanpa arahan doktor. Jangan memberi ubat ini kepada sesiapa walaupun simptom mereka serupa dengan anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Perhatian perlu diberi jika digunakan oleh pesakit dengan kemerosotan fungsi ginjal dan hati. Keadaan hipoglisemia mungkin akan berlaku semasa mengambil ubat ini terutamanya jika digabungkan bersama ubat oral antidiabetik yang lain.

Kesan-kesan sampingan

Kesan sampingan termasuk tekanan darah rendah, rasa loya, cirit-birit, sembelit, masalah alahan kulit, pengurangan sel darah putih, pening dan sebagainya.

Selepas menggunakan GLIX

Cara penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

Cara pelupusan

Jika anda berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini telah luput tarikh. Sila bertanya kepada doktor atau ahli farmasi tentang cara pengendalian ubat yang tertinggal.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Tablet berwarna putih dan berbentuk bulat dengan skor pada bahagian tengah pada satu permukaan dan 'G' pada permukaan yang lain.

Bahan-bahan kandungan

Glipizide

Sodium Starch Glycolate

Silicon Dioxide

Starch

Stearic Acid

Cellulose

Lactose

MAL no.

MAL 19988493A

Pengilang

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor D.E., Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP :

16th Dec. 2011

Marketing Authorization Holder:

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.