

## **GARBOSE Tablet**

Acarbose 50 mg & 100 mg

### **What is in this leaflet**

This leaflet answers some common questions about GARBOSE tablets. It does not contain all the available information. Please talk to healthcare professionals for further information.

### **What GARBOSE is used for**

Additional therapy in association with diet in patients with diabetes mellitus.

### **How GARBOSE works**

It works by inhibiting intestinal enzyme involved in the degradation of carbohydrates, which delay the digestion and absorption of food, thus lowering blood glucose level.

### **Before you use product GARBOSE**

#### **When you must not take it**

When you are allergic to acarbose. If you have chronic intestinal disorders, severe hepatic and renal problems, you must not take this medicine.

#### **Before you start to take it**

Tell your doctor if you have allergies to any medicines or if you have any medical conditions.

#### **Taking other medicines**

Tell your doctor if you are taking any other medications. There may be an interaction between acarbose and some other medications, including hypoglycemic agents, intestinal absorbents and digestive enzyme products, neomycin, cholestyramine and digoxin.

### **How to take GARBOSE**

#### **How much to take**

The dosage must be adjusted by the doctor to suit each patient, because efficacy and tolerability vary from one individual to another. Please consult your doctor if you have any question.

#### **When to take it**

To be swallowed whole with a little liquid before meal or to be chewed with the first few mouthfuls of the meal.

#### **How long to take it**

GARBOSE should be taken according to your doctor's prescription.

#### **If you forgot to take it**

If you miss a dose of GARBOSE and you are taking it regularly, take it as soon as possible. If several hours have passed or if it is nearing time for the next dose, do not double the dose to catch up, unless advised by your health care provider. Do not take 2 doses at once.

#### **If you take too much**

Symptoms include meteorism, flatulence, and diarrhea may occur. In cases of over dosage the patient should not be given drinks or meals containing carbohydrates for next 4-6 hours.

### **While you are using product GARBOSE**

#### **Things you must do**

Take this medicine according to doctor's prescription.

#### **Things you must not do**

Do not stop taking this medicine or change the dosage without first checking with your doctor. Do not give this medicine to anyone else, even if their symptoms seem similar to yours.

#### **Things to be careful of**

GARBOSE usually does not cause hypoglycemia when used alone. But, be careful if GARBOSE is used with other antidiabetic agents. You are advised to follow strict adherence to diabetic diet and exercise regularly while taking GARBOSE.

### **Side effects**

The most common side effects include flatulence, diarrhea and gastrointestinal pain.

### **After using product GARBOSE**

#### **Storage**

Store below 30°C, protect from light and moisture.

#### **Disposal**

Tell your doctor or pharmacist if you stop taking the tablets or the tablets have passed their expiry date. Ask them what to do with any tablets that are left over.

### **Product description**

#### **What it looks like**

**50 mg:** A white to yellowish white color round-shaped tablet, one side is impressed with a score in the middle, 'G' on the top and '50' on the bottom.

**100 mg:** A white to yellowish white color round-shaped tablet, one side is impressed with a score in the middle, 'G' on the top and '100' on the bottom.

### **Ingredients**

Acarbose 50mg & 100mg

Hydroxypropyl Cellulose

Silicon Dioxide

Magnesium Stearate

Starch

Cellulose

### **MAL no.**

50mg: MAL 09100265A

100mg: MAL 09100266A

### **Manufacturer**

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

### **Marketing Authorization Holder**

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

### **Date of revision :**

17<sup>th</sup> November 2011

## **GARBOSE Tablet**

Acarbose 50 mg & 100 mg

### **Apakah yang ada pada risalah ini**

Risalah ini bertujuan untuk menjawab soalan-soalan yang kerap ditanya tentang GARBOSE tablet. Risalah ini hanya mengandungi sebahagian maklumat. Sila rujuk kepada ahli profesional kesihatan untuk keterangan lanjut.

### **Apakah kegunaan GARBOSE**

Terapi tambahan bersama dengan diet pada pesakit diabetis melitus.

### **Bagaimana GARBOSE berfungsi**

GARBOSE merencat enzim usus yang terlibat dalam degradasi karbohidrat yang akan melambatkan penghadaman dan penyerapan makanan. Dengan itu, tahap glukosa darah dapat diturunkan.

### **Sebelum Mengambil GARBOSE**

#### **Bila tidak boleh mengambil**

Jika anda alah terhadap acarbose. Elakkan pengambilan ubat ini jika anda mempunyai penyakit usus yang kronik, masalah hati dan masalah buah pinggan yang serius.

#### **Sebelum mula mengambil**

Beritahu doktor jika anda alah terhadap sebarang ubat ataupun mempunyai sebarang masalah kesihatan.

#### **Jika mengambil ubat-ubat lain**

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat. Interaksi dengan ubat-ubatan seperti agen hipoglisemia, bahan penyerap dan enzim penghadaman, neomycin, cholestyramine dan digoxin mungkin akan berlaku.

### **Cara menggunakan GARBOSE**

#### **Berapa banyak harus diambil**

Dos GARBOSE harus diberi berdasarkan keadaan pesakit kerana keberkesanan ubat dan toleransi untuk setiap individu adalah berbeza. Sila rujuk kepada doctor atau ahli farmasi anda jika ada sebarang soalan.

#### **Bila perlu diambil**

GARBOSE boleh ditelan dengan sedikit air sebelum makan ataupun dikunyah bersama dengan beberapa suapan makanan yang pertama.

#### **Berapa lama perlu diambil**

GARBOSE perlu diambil mengikut preskripsi doktor anda.

#### **Jika terlupa mengambil**

Jika anda terlupa satu dos dan anda mengambil ubat ini secara berterusan, ambil dos itu secepat mungkin. Jika sudah beberapa jam selepas masa makan ubat berlalu ataupun sudah mendekati masa pengambilan dos yang kedua, jangan mengambil dos yang berganda untuk mengantikan dos yang terlupa, kecuali dinasihat oleh doktor. Jangan mengambil 2 dos pada masa yang sama.

#### **Jika mengambil terlebih (terlebih dos)**

Sимptom seperti meteorism, perut kembung dan cirit birit mungkin akan berlaku. Bagi kes berlebihan dos, pesakit tidak dibenarkan untuk minum atau makan makanan mengandungi karbohidrat dalam tempoh 4-6 jam yang berikutnya.

### **Semasa menggunakan GARBOSE**

#### **Perkara yang perlu dilakukan**

Iikut preskripsi doktor anda semasa mengambil ubat ini.

#### **Perkara yang tidak boleh dilakukan**

Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah pengambilan dos tanpa arahan doktor. Jangan memberi ubat ini kepada sesiapa walaupun simptom mereka serupa dengan anda.

#### **Perkara yang perlu diberi perhatian**

GARBOSE biasanya tidak menyebabkan hypoglycemia. Akan tetapi, sila berhati-hati jika digunakan bersama dengan ubat antidiabetic yang lain. Anda dinasihat supaya mengikuti diet antidiabetic dan kerap bersenam semasa mengambil ubat ini.

### **Kesan-sesan sampingan**

Kesan sampingan yang biasa termasuk perut kembung, cirit birit, dan sakit gastrous.

### **Selepas menggunakan GARBOSE**

#### **Cara penyimpanan**

Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

#### **Cara pelupusan**

Beritahu doktor anda jika anda berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini telah luput tarikh. Sila bertanya kepada doktor tentang cara pengendalian ubat yang tertinggal.

### **Maklumat lanjut**

#### **Rupa dan warna produk**

50 mg: Tablet yang berwarna putih keputih kekuningan yang berbentuk bulat dengan skor pada bahagian tengah satu permukaan, 'G' pada sebelah atas dan '50' pada sebelah bawah.

100 mg: Tablet yang berwarna putih keputih kekuningan yang berbentuk bulat dengan skor pada bahagian tengah satu permukaan, 'G' pada sebelah atas dan '100' pada sebelah bawah.

### **Bahan-bahan kandungan**

Acarbose 50mg & 100mg

Hydroxypropyl Cellulose

Silicon Dioxide

Magnesium Stearate

Starch

Cellulose

### **MAL no.**

50mg: MAL 09100265A

100mg: MAL 09100266A

### **Pengilang**

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

### **Marketing Authorization Holder:**

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.

Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

### **Tarikh kemaskini RiMUP :**

17<sup>th</sup> November 2011