

PRECARBAY

Acarbose

Consumer Medicine Information

What is in this leaflet

This leaflet answers some common questions about PRECARBAY. It does not contain all the available information. It does not take the place of talking to your doctor or pharmacist.

All medicines have risks and benefits. Your doctor has weighed the risks of you taking PRECARBAY against the benefits they expect it will have for you.

As PRECARBAY is a prescription medicine, it should only be used under medical supervision.

If you have any concerns about taking this medicine, ask your doctor or pharmacist.

Keep this leaflet with the medicine.

You may need to read it again.

What PRECARBAY is used for

PRECARBAY tablets contain the active drug acarbose. They are used for the treatment of a type of diabetes commonly known as Type 2 diabetes mellitus.

PRECARBAY helps to control your blood sugar levels in conjunction with diet, exercise, weight loss and other measures by slowing down the digestion of carbohydrates (complex sugars) from your diet. This reduces the abnormally high blood sugar levels that occur after each meal.

Ask your doctor if you have any questions about why this medicine has been prescribed for you.

Your doctor may have prescribed it for another reason.

Before you take PRECARBAY

When you must not take it

Do not take PRECARBAY if you have an allergy to:

- acarbose, the active ingredient in PRECARBAY.
- any of the ingredients listed at the end of this leaflet.

Some of the symptoms of an allergic reaction may include:

- shortness of breath
- wheezing or difficulty breathing
- swelling of the face, lips, tongue or other parts of the body
- rash, itching or hives on the skin.

Do not take PRECARBAY if:

- you have a severe kidney disorder (creatinine clearance <25 mL/min).
- you suffer from intestinal obstruction, inflammation or ulceration of the bowel, e.g. ulcerative colitis or Crohn's disease.
- you have a hernia or have had previous abdominal surgery. If so, consult your doctor first.

Do not give this medicine to a child under the age of 18 years.

Do not take this medicine after the expiry date printed on the pack and blister.

If it has expired return it to your pharmacist for disposal.

Do not take this medicine if the packaging is torn or shows signs of tampering.

If the packaging is damaged, return it to your pharmacist for disposal.

If you are not sure whether you should start taking this medicine, talk to your doctor.

Before you start to take it

Tell your doctor if you have allergies to any other medicines, foods, preservatives or dyes.

Tell your doctor if you are pregnant or intend to become pregnant.

Like most medicines of this kind, PRECARBAY is not recommended to be used during pregnancy. Your doctor will discuss the risks and benefits of using it if you are pregnant.

Tell your doctor if you are breastfeeding or planning to breastfeed.

It is not known whether PRECARBAY passes into breast milk.

If you have not told your doctor about any of the above, tell him/her before you start taking PRECARBAY.

Taking other medicines

Tell your doctor or pharmacist if you are taking other medicines, including any you have bought without a prescription from your pharmacy, supermarket or health food shop.

Some medicines and PRECARBAY may interfere with each other. These include:

- Neomycin
- Cholestyramine
- Intestinal adsorbents
- Digestive enzyme preparations
- Digoxin

These medicines may be affected by PRECARBAY or may affect how well it works. You may need different amounts of your medicines, or you may need to take different medicines.

Your doctor and pharmacist have more information on medicines to be careful with or avoid while taking this medicine.

You should avoid taking cane sugar (sucrose) and products containing sugar. They may cause stomach discomfort or even diarrhoea if taken while you are on PRECARBAY tablets.

If you are taking other medicines containing sulfonylureas or metformin and tend to have low blood sugar levels, tell your doctor before using PRECARBAY.

If you have not told your doctor or pharmacist about any of the above, tell them before you start taking PRECARBAY.

How to take PRECARBAY

Follow all directions given to you by your doctor or pharmacist carefully.

They may differ from the information contained in this leaflet.

If you do not understand the instructions printed on the pharmacist label, ask your doctor or pharmacist for help.

How much to take

To gain the maximum benefit from

PRECARBAY it is important that you follow the prescribed diet as well as taking the exact dose prescribed by your doctor. This will help control your blood sugar levels and reduce side effects experienced.

The average adult dose is one PRECARBAY 100 mg tablet taken three times daily.

How to take it

Chew the tablets with the first few mouthfuls of food. If you prefer not to chew the tablets then swallow them whole with a little liquid immediately before the meal.

When to take it

Take your medicine at about the same time each day with breakfast, lunch and dinner.

Taking it at the same time each day will have the best effect. It will also help you remember when to take it.

When you first start your treatment, your doctor may recommend that you take your tablets once or twice a day, before increasing your dose to three times a day.

How long to take it

Do not stop taking the tablets unless you are told to do so by your doctor.

This medicine helps to control your condition, but does not cure it. It is important to keep taking your medicine even if you feel well. If you do not feel well while you are taking them, see your doctor.

If you forget to take it

If you forget to take PRECARBAY at the time you are supposed to, do not take the tablets between meals.

Wait until it is time for you to take your next dose and take PRECARBAY with your meal and continue as before. Do not take a double dose.

If you take too much (Overdose)

If you have taken too many PRECARBAY tablets, avoid foods or drinks containing carbohydrates and telephone your or go to Accident and Emergency at the nearest hospital, if you think that you or anyone else may have taken too much PRECARBAY. Do this even if there are no signs of discomfort or poisoning.

You may need urgent medical attention.

When PRECARBAY is taken with drinks and/or meals containing carbohydrates, over dosage can lead to diarrhoea and other intestinal symptoms such as flatulence (wind) and abdominal cramps.

While you are taking PRECARBAY

Things you must do

If you are about to be started on any new medicine, remind your doctor and pharmacist that you are taking PRECARBAY.

Tell any other doctors, dentists, and pharmacists who treat you that you are taking this medicine.

Take PRECARBAY exactly as instructed by your doctor. If you do not follow your doctor's instructions, your blood sugar level may not be controlled.

Things you must not do

Do not take PRECARBAY to treat any other complaints unless your doctor tells you to.

Do not give your medicine to anyone else, even if they have the same condition as you.

Do not stop taking your medicine or lower the dosage

without checking with your doctor.

If you stop taking it suddenly, your condition may worsen or you may have unwanted side effects.

What to be careful of

Treating hypoglycaemia: (“hypos” or low blood sugar):

As a diabetic you may also be receiving other medicines for your diabetes. If PRECARBAY is prescribed for you in addition to sulfonylureas, metformin or insulin to control your diabetes, your doctor may need to adjust the dosages of these drugs to avoid the occurrence of “hypos” (low blood sugar levels).

When taking PRECARBAY together with these drugs, do not treat a “hypo” with ordinary sugar (sucrose). It will not work fast enough. Instead, you should take some GLUCOSE (also known as dextrose) tablets, honey, syrup or sweets which should be available from your local chemist.

Side effects

Tell your doctor or pharmacist as soon as possible if you do not feel well while you are taking PRECARBAY.

All medicines have side effects. Sometimes they are serious; most of the time they are not. In serious cases, you may need to obtain medical treatment.

Some patients may experience unwanted side effects during PRECARBAY treatment. These side effects are more common at the start of the treatment, but some may persist or develop after treatment, or when dosage of PRECARBAY is adjusted by your doctor.

Do not be alarmed by the following lists of side effects. You may not experience any of them. Ask your doctor or

pharmacist to answer any questions you may have.

Tell your doctor or pharmacist if you notice any of the following and they worry you:

- flatulence (wind)
- abdominal “rumbling” noises
- a feeling of fullness
- softer stools or have diarrhea; particularly if you have eaten foods containing sugar

The above list includes the more common side effects of your medicine. Normally these symptoms will disappear if you continue treatment and keep to your prescribed diet. These symptoms may get worse if you do not keep to your prescribed diet.

If your symptoms persist for more than 2 or 3 days, or if they are severe, consult your doctor or nearest emergency department particularly in the case of diarrhoea.

Do not take antacids to treat these symptoms as they are unlikely to give you any relief.

This list includes the less common side effects of your medicine.

- stomach cramps
- nausea
- indigestion
- vomiting
- increased appetite
- dizziness
- loss of appetite

Tell your doctor as soon as possible if you notice any of the following. This list includes rare side effects of your medicine.

- jaundice (yellowing of the skin)
- swelling from fluid retention
- inflammation of the liver (hepatitis)
- intestinal obstruction
- decrease in platelet count
- skin reactions such as redness, rash and urticaria (hives)

If while undergoing treatment with PRECARBAY, you

experience any side-effects or symptoms which you think may be due to this medication (whether or not it is mentioned in this leaflet) please inform your doctor or pharmacist as early as possible. You may need medical treatment in some cases.

PRECARBAY tablets may cause an increase in the results of certain liver function tests.

These effects go away when treatment is stopped.

Tell your doctor or pharmacist if you notice anything that is making you feel unwell.

Other side effects not listed above may also occur in some people.

After taking PRECARBAY

When treatment with PRECARBAY is to be stopped, your prescribing doctor may need to alter the dose of other medication(s) accordingly and monitor your condition.

Storage

Keep your tablets in the pack until it is time to take them.

If you take the tablets out of the pack they may not keep well.

Keep your tablets in a cool dry place where the temperature stays below 25°C.

Do not store it or any other medicine in the bathroom, near a sink, or on a window-sill. Do not leave it in the car.

Heat and damp can destroy some medicines.

Keep it where children cannot reach it.

A locked cupboard at least one-and-a-half metres above the ground is a good place to store medicines.

Disposal

If your doctor tells you to stop taking this medicine or the expiry date has passed, ask your pharmacist what to do with any medicine that is left over.

Return any unused medicine to your pharmacist.

Product Description

What it looks like

PRECARBAY tablets are available in a blister pack of 100s in two strengths.

PRECARBAY Tablets 50mg are round 7mm, white to off white tablet, scored on one side with the marking "DUO 861" on the scored side and 'duo' on the other side.

PRECARBAY Tablets 100mg are round 9mm, white to off white with marking 'duo' on both sides.

Ingredients

Active ingredient per tablet:

- Precarbay 50 – acarbose 50 mg
- Precarbay 100 – acarbose 100mg

Manufacturer / Distributor

PRECARBAY is manufactured and distributed in Malaysia by:

DUOPHARMA (M) SDN. BHD. (42491-M)

WHOLLY OWNED BY CCM
DUOPHARMA BIOTECH
BERHAD (524271-W)
Lot. 2599, Jalan Seruling 59,
Kawasan 3, Taman Klang Jaya,
41200 Klang,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Marketing Authorization Holder

DUOPHARMA (M) SDN. BHD. (42491-M)

WHOLLY OWNED BY CCM
DUOPHARMA BIOTECH
BERHAD (524271-W)
Lot. 2599, Jalan Seruling 59,
Kawasan 3, Taman Klang Jaya,
41200 Klang, Selangor Darul
Ehsan, Malaysia.

Malaysian Registration Numbers:

PRECARBAY 50mg -
MAL06030800A

PRECARBAY 100mg -
MAL06030801A

This leaflet was prepared on
November 2011.

PRECARBAY

Acarbose

Risalah Maklumat Ubat Pengguna

Kandungan risalah

Risalah ini menjawab beberapa soalan lazim mengenai PRECARBAY. Ia tidak mengandungi semua maklumat yang ada mengenainya. Ini tidak bermakna anda tidak perlu mendapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi.

Semua ubat mempunyai risiko dan manfaat. Doktor anda telah menimbang risiko dan manfaat yang dijangkakan sebelum anda mengambil PRECARBAY.

Precarbay adalah ubat preskripsi dan hanya boleh digunakan di bawah pengawasan ahli perubatan.

Jika anda mempunyai apa-apa soalan tentang pengambilan ubat ini, hubungi doktor atau ahli farmasi anda.

Simpan risalah ini bersama dengan ubat anda. Anda mungkin perlu membacanya lagi.

Apakah kegunaan PRECARBAY

Tablet PRECARBAY mengandungi acarbose sebagai bahan aktifnya. Ia digunakan di dalam rawatan penyakit kencing manis jenis II.

PRECARBAY membantu untuk mengawal tahap gula dalam darah bersama dengan kaedah pemakanan, senaman, penurunan berat badan dan lain-lain. Ia bertindak dengan cara melambatkan penghadaman karbohidrat (gula kompleks) daripada diet anda.

Ini mengurangkan peningkatan luar biasa tahap gula darah yang berlaku selepas setiap hidangan.

Tanya doktor anda jika anda mempunyai sebarang soalan mengapa PRECARBAY dipreskrip untuk anda.

Doktor anda mungkin telah mempreskrip PRECARBAY atas sebab-sebab lain.

Sebelum mengambil PRECARBAY

Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil PRECARBAY jika anda alah terhadap:

- acarbose, bahan aktif di dalam ubat PRECARBAY.
- sebarang bahan kandungannya yang disenaraikan pada penghujung risalah ini

Sebahagian daripada gejala-gejala tindakbalas alahan termasuklah:

- sesak nafas
- nafas berdehrit atau sukar bernafas
- pembengkakan pada muka, bibir, lidah atau lain-lain bahagian badan
- kulit beruam atau gatal-gatal

Jangan mengambil PRECARBAY jika:

- anda mempunyai masalah buah pinggang yang teruk (paras kreatinin <25 mL/min).
- anda menghidap penyakit usus tersumbat, keradangan atau ulser usus seperti penyakit ulser colitis atau penyakit Crohn.
- anda mempunyai hernia atau pernah menjalani pembedahan perut sebelum ini. Jika ya, rujuk kepada doktor anda terlebih dahulu.

Jangan beri ubat ini kepada kanak-kanak di bawah umur 18

tahun.

Jangan mengambil ubat ini selepas tarikh luput yang dicetak pada pek dan blister.

Jika ia telah tamat tempoh pulangkan kepada ahli farmasi anda untuk dilupuskan.

Jangan mengambil ubat ini jika pembungkusannya koyak atau ada tanda-tanda telah dibuka.

Jika pembungkusannya telah rosak, pulangkan kepada ahli farmasi anda untuk dilupuskan.

Jika anda tidak pasti sama ada anda harus mula mengambil ubat ini, tanya doktor anda.

Sebelum mula mengambil

Maklumkan kepada doktor anda jika anda alah terhadap sebarang ubat-ubatan, makanan, bahan pewarna atau pengawet.

Maklumkan kepada doktor anda jika anda hamil atau merancang untuk hamil.

Seperti kebanyakan ubat-ubatan jenis ini, PRECARBAY tidak disyorkan untuk digunakan semasa hamil. Doktor akan berbincang dengan anda mengenai risiko dan manfaat penggunaannya ketika hamil.

Maklumkan kepada doktor anda jika anda sedang atau merancang untuk menyusukan bayi.

Kemungkinan PRECARBAY meresap masuk ke dalam susu badan adalah tidak diketahui.

Jika anda belum memaklumkan perkara tersebut kepada doktor anda, maklumkan segera sebelum mula mengambil PRECARBAY.

Jika mengambil ubat-ubatan lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda ada mengambil sebarang ubat, termasuk ubat yang boleh diperolehi tanpa preskripsi di kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat dan PRECARBAY boleh bertindakbalas antara satu sama lain. Ini termasuklah:

- Ubat Neomycin
- Ubat Cholestyramine
- Ubat penjerap usus (*Intestinal adsorbents*)
- Ubat enzim pencernaan
- Ubat Digoxin

Ubat-ubatan ini boleh terjejas disebabkan oleh PRECARBAY atau mungkin menjejaskan kesan PRECARBAY itu sendiri. Anda mungkin memerlukan sukatan ubat yang berbeza, atau anda mungkin perlu mengambil ubat-ubatan yang berbeza.

Doktor atau ahli farmasi anda mempunyai lebih banyak maklumat tentang ubat yang perlu diberi perhatian atau perlu dielakkan ketika mengambil ubat ini.

Elakkan pengambilan gula (sukrosa) dan produk-produk yang mengandunginya. Ia boleh menyebabkan ketidakselesaan perut atau cirit-birit jika diambil ketika pengambilan PRECARBAY.

Jika anda sedang mengambil ubat-ubatan lain yang mengandungi sulfonilurea atau metformin dan cenderung untuk menurunkan paras gula dalam darah, maklumkan kepada doktor anda sebelum mula mengambil PRECARBAY.

Jika anda belum memaklumkan perkara tersebut kepada doktor anda, maklumkan segera sebelum mula mengambil PRECARBAY.

Cara menggunakan PRECARBAY

Patuhi semua arahan yang telah diberikan oleh doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti.

Ia mungkin berbeza dengan maklumat yang terdapat di dalam risalah ini.

Jika anda tidak faham arahan yang dinyatakan pada label pek, minta bantuan doktor atau ahli farmasi anda.

Berapa banyak perlu diambil

Patuhi arahan dos dan pemakanan yang diarahkan doktor anda kerana ia penting untuk mendapatkan manfaat maksimum PRECARBAY. Ini akan membantu mengawal tahap gula dalam darah anda dan mengurangkan kesan-kesan sampingan yang dialami

Dos purata untuk pesakit dewasa adalah satu tablet PRECARBAY 100 mg diambil tiga kali sehari.

Cara pengambilan

Kunyah tablet bersama-sama dengan suapan makanan pertama. Jika anda tidak suka mengunyah tablet, telan tablet tersebut dengan sedikit air sebaik sebelum makan.

Bila untuk mengambil

Ambil ubat anda pada waktu yang sama setiap hari ketika sarapan pagi, makan tengahari dan makan malam.

Mengambil ubat pada waktu yang sama setiap hari akan memberikan kesan yang terbaik. Ia juga akan membantu anda mengingati waktu pengambilan ubat.

Pada peringkat permulaan rawatan, doktor anda mungkin mengesyorkan anda mengambil tablet sekali atau dua kali sehari, sebelum mula meningkatkan dos anda kepada tiga kali sehari.

Berapa lama perlu mengambil

Jangan berhenti mengambil ubat anda tanpa merujuk pada doktor.

Ubat ini membantu mengawal penyakit anda, tetapi tidak menyembuhkannya. Penting untuk anda terus mengambil ubat ini walaupun anda berasa telah sihat. Jika anda berasa tidak sihat ketika mengambil ubat ini, berjumpalah dengan doktor anda.

Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa mengambil ubat PRECARBAY pada waktu yang sepatutnya, jangan mengambilnya antara waktu makan.

Tunggu sehingga waktu dos yang berikutnya dan ambil PRECARBAY pada waktu makan dan terus mengambil seperti sebelumnya. Jangan gandakan dos anda.

Jika mengambil berlebihan (Terlebih dos)

Jika anda mengambil tablet PRECARBAY berlebihan, elakkan makanan atau minuman yang mengandungi karbohidrat dan hubungi doktor anda dengan segera melalui panggilan telefon atau kunjungi hospital yang berdekatan jika anda fikir anda atau orang lain telah mengambil PRECARBAY.

Lakukan perkara tersebut sekalipun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan.

Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan dengan segera.

Apabila PRECARBAY diambil dengan minuman dan / atau makanan yang mengandungi karbohidrat, terlebih dos boleh menyebabkan cirit-birit dan gejala-gejala usus yang lain seperti kembung perut (angin) dan kekejangan perut.

Semasa menggunakan PRECARBAY

Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda perlu mengambil ubat-ubatan lain, maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda bahawa anda sedang mengambil PRECARBAY.

Maklumkan mana-mana doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil ubat ini.

Ambil PRECARBAY seperti yang telah diarahkan oleh doktor anda. Jika anda tidak mematuhi arahan doktor, paras gula dalam darah anda mungkin tidak terkawal.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil PRECARBAY untuk merawat mana-mana penyakit lain kecuali atas arahan doktor anda.

Jangan beri ubat anda kepada orang lain walaupun penyakit mereka sama seperti anda.

Jangan berhenti mengambil ubat anda atau mengurangkan dosnya tanpa pengetahuan doktor anda.

Jika anda berhenti mengambilnya secara tiba-tiba, keadaan penyakit anda mungkin menjadi lebih teruk atau anda mungkin mengalami kesan-kesan sampingan yang tidak diingini.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Merawat hipoglisemia: (paras gula dalam darah rendah):

Sebagai penghidap penyakit kencing manis anda mungkin juga diberi ubat-ubatan lain untuk merawatnya. Jika anda diberi PRECARBAY sebagai tambahan kepada ubat sulfonilurea, metformin atau insulin untuk mengawal penyakit kencing manis, doktor anda perlu mengubah sukatan dos ubat-ubatan tersebut untuk

mengelakkan keadaan hipoglisemia (paras gula dalam darah rendah).

Jika mengambil PRECARBAY dengan ubat-ubatan tersebut, jangan merawat keadaan hipoglisemia dengan gula biasa (sukrosa) Ia tidak memberi kesan dengan cepat. Sebaliknya, anda patut mengambil tablet GLUKOSA (juga dikenali sebagai dextrosa), madu, sirap atau gula-gula yang boleh didapati di kedai-kedai farmasi berdekatan.

Kesan-kesan sampingan

Maklumkan segera kepada doktor atau ahli farmasi jika anda berasa tidak sihat ketika mengambil PRECARBAY.

Semua ubat-ubatan mempunyai kesan sampingan. Kadang kala ianya serius, tetapi selalunya tidak. Anda perlu mendapatkan rawatan perubatan jika anda mengalami kesan-kesan sampingan tersebut.

Sesetengah pesakit akan mengalami kesan-kesan sampingan yang tidak diingini ketika mengambil PRECARBAY. Biasanya kesan-kesan sampingan ini terjadi pada permulaan rawatan, tetapi ada yang berterusan atau terjadi selepas rawatan, atau apabila doktor anda mengubah dos PRECARBAY anda.

Jangan berasa cemas dengan kesan-kesan sampingan yang disenaraikan. Anda mungkin tidak akan mengalami sebarang kesan sampingan tersebut. Tanya doktor atau ahli farmasi untuk menjawab sebarang soalan anda.

Laporkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami kesan sampingan berikut dan ianya membimbangkan anda:

- kembung perut (angin)
- perut berbunyi
- rasa kenyang
- najis lembik atau cirit-birit; terutama jika anda telah memakan makanan yang mengandungi gula.

Kesan-kesan sampingan di atas selalu berlaku dengan pengambilan ubat anda. Lazimnya gejala-gejala tersebut akan hilang jika anda meneruskan rawatan dan mematuhi amalan pemakanan yang diarahkan. Gejala-gejala tersebut akan menjadi teruk sekiranya anda tidak mematuhi amalan pemakanan tersebut.

Jika gejala-gejala anda berterusan sehingga melebihi 2 atau 3 hari, atau menjadi semakin teruk, dapatkan nasihat doktor anda atau pergi ke jabatan kecemasan terutama jika anda mengalami cirit-birit.

Jangan mengambil ubat antasid untuk merawat gejala tersebut kerana ia tidak berkesan.

Kesan-kesan sampingan berikut jarang berlaku dengan pengambilan ubat anda:

- kejang perut
- loya
- senak perut
- muntah
- selera makan meningkat
- pening
- hilang selera makan

Laporkan kepada doktor dengan segera jika anda mengalami keadaan berikut. Kesan-kesan sampingan berikut amat jarang berlaku dengan pengambilan ubat anda

- jaundis (kulit menjadi kuning)
- bengkak akibat pengumpulan cecair dalam badan
- radang hati (hepatitis)
- usus tersumbat
- bilangan platelet dalam darah rendah
- tindakbalas kulit contohnya ruam, kulit menjadi kemerahan dan gatal-gatal

Jika anda mengalami sebarang kesan sampingan atau gejala-gejala yang anda fikir disebabkan oleh pengambilan PRECARBAY, laporkan kepada doktor atau ahli farmasi anda dengan segera walaupun kesan sampingan tersebut tidak disenaraikan di dalam risalah ini. Anda mungkin

memerlukan rawatan perubatan dalam sesetengah kes.

Tablet PRECARBAY boleh menyebabkan peningkatan sesetengah bacaan ujian fungsi hati.

Kesan-kesan ini akan hilang apabila rawatan anda dihentikan.

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda rasakan ada sesuatu yang membuatkan anda merasa kurang sihat.

Kesan-kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas mungkin terjadi dikalangan sesetengah pesakit.

Selepas menggunakan PRECARBAY

Apabila rawatan dengan PRECARBAY akan dihentikan, doktor anda perlu mengubah sukatan dos ubat-ubatan yang lain dengan sewajarnya dan memantau keadaan anda.

Penyimpanan

Simpan ubat tablet anda di dalam pek sehingga tiba masa untuk menggunakannya.

Jika anda mengeluarkan tablet daripada pek asalnya, ia tidak tersimpan dengan sempurna

Simpan ubat anda di tempat kering dan sejuk pada suhu bawah 25°C.

Jangan menyimpan ubat anda di dalam bilik air atau berdekatan sinki. Jangan tinggalkannya di dalam kereta atau ditepi tingkap.

Haba dan kelembapan boleh merosakkan ubat.

Jauhkan ubat daripada capaian kanak-kanak. Simpan ubat di dalam almari berkunci yang terletak sekurang-kurangnya satu setengah meter tinggi.

Pelupusan

Jika doktor anda mengarahkan anda berhenti mengambil ubat ini, atau sudah tamat tarikh luputnya, hubungi ahli farmasi anda untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan terhadap baki tersebut.

Pulangkan baki ubat yang tidak digunakan kepada ahli farmasi anda.

Deskripsi produk

Rupa dan warna

Tablet PRECARBAY boleh didapati didalam pek blister 100 biji tablet di dalam dua kekuatan.

Tablet PRECARBAY 50mg adalah bulat, 7mm, berwarna putih ke putih pudar, bertanda "DUO 861" dan garisan belah di tengah pada satu belah dan bertanda "duo" pada belah yang satu lagi.

Tablet PRECARBAY 100mg adalah bulat, 9mm, berwarna putih ke putih pudar, bertanda "duo" pada dua-dua belah.

Bahan kandungan

Bahan aktif setiap tablet:

- PRECARBAY 50 - mengandungi 50 mg acarbose
- PRECARBAY 100 - mengandungi 100mg acarbose

Pengilang / Penedar

PRECARBAY dikilangkan dan diedarkan di Malaysia oleh:

DUOPHARMA (M) SDN. BHD. (42491-M)

WHOLLY OWNED BY CCM DUOPHARMA BIOTECH BERHAD (524271-W)

Lot. 2599, Jalan Seruling 59, Kawasan 3, Taman Klang Jaya, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran

DUOPHARMA (M) SDN. BHD. (42491-M)

WHOLLY OWNED BY CCM DUOPHARMA BIOTECH BERHAD (524271-W)

Lot. 2599, Jalan Seruling 59, Kawasan 3, Taman Klang Jaya, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Nombor Pendaftaran:

PRECARBAY 50mg -
MAL06030800A

PRECARBAY 100mg -
MAL06030801A

Tarikh risalah ini disediakan:
November 2011.