

## **MINISON Tablet 1mg**

Prazosin Hydrochloride 1.095mg (eq. to Prazosin 1 mg)

### **What is in this leaflet**

This leaflet answers some common questions about MINISON tablet. It does not contain all the available information. Please talk to healthcare professionals for further information.

### **What MINISON Tablet 1mg is used for**

For the treatment of hypertension.

### **How MINISON Tablet 1mg works**

MINISON is an alpha blocker that relaxes certain muscles and helps small blood vessels to remain open. MINISON works by keeping the hormone norepinephrine (noradrenaline) from tightening the muscles in the walls of smaller arteries and veins. This effect causes the vessels to remain open and relaxed. This improves blood flow and lowers blood pressure.

### **Before you use MINISON Tablet 1mg**

#### **When you must not take it**

When you are allergic to Prazosin Hydrochloride.

#### **Before you start to take it**

Tell your doctor if you are using any other medicines or you have other health problems.

#### **Taking other medicines**

Tell your doctor if you are taking any other medications. There may be an interaction between digoxin, chlorpromazine and amitriptyline or any other groups of drug such as diuretics, antihypertensive agents, analgesics and calcium-channel blocker.

### **How to take MINISON Tablet 1mg**

#### **How much to take**

Initial dose: 0.5mg, 2-3 times daily. Increase dose to 1mg, 2-3 times daily after 3-7 days. Maintenance dose: 6mg to 15mg daily given in divided doses.

#### **When to take it**

The initial dose should be taken before going to bed at night to avoid postural hypotension synapse. MINISON Tablet should be taken according to doctor's instruction.

#### **How long to take it**

MINISON Tablet should be taken according to doctor's instruction.

#### **If you forgot to take it**

If you miss a dose of MINISON and you are taking it regularly, take it as soon as possible. If several hours have passed or if it is nearing time for the next dose, do not double the dose to catch up, unless advised by your health care provider. Do not take 2 doses at once.

#### **If you take too much**

Quickly seek for medical attention if you think that you or anyone else have taken too much MINISON.

### **While you are using MINISON Tablet**

#### **Things you must do**

Take the tablet according to doctor's instruction.

#### **Things you must not do**

Do not stop taking this medicine or change the dosing regimen without instruction of your doctor. Do not give MINISON to anyone else, even if they have the same condition as you.

### **Things to be careful of**

Should be used with caution in patient with angina, renal failure or hepatic failure, and in elderly. There is risk of sudden collapse following initial dose and may cause drowsiness. This product should be used cautiously in pregnant and nursing women.

### **Side effects**

Serious drop of blood pressure due to a change of body position with fainting, dizziness, drowsiness, headache, fatigue, nausea, rapid or irregular heartbeat, swelling, chest pain, shortness of breath, constipation, diarrhea, vomiting, depression, hallucination, sensation of numbness and tingling on the skin, nasal congestion, dryness of mouth, urinary frequency, reddening of eye, blurred vision, ringing in the ears, skin rashes, itchiness, and excessive sweating.

### **After using Minison Tablet 1mg**

#### **Storage**

Store below 30°C, protect from light & moisture.

#### **Disposal**

If your doctor or pharmacist tells you to stop taking MINISON or the tablet has passed the expiry date, ask your doctor or pharmacist what to do with any that is left over.

### **Product description**

#### **What it looks like**

A light salmon color elliptical tablet with one side scored.

#### **Ingredients**

Prazosin Hydrochloride  
Magnesium Aluminium Silicate  
Magnesium Stearate  
Starch  
Sodium Starch Glycolate  
Talc  
Lactose  
Sunset Yellow

#### **MAL no.**

MAL 19990104A

#### **Manufacturer**

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.  
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor D.E., Malaysia.

#### **Marketing Authorization Holder**

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.  
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13,  
Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi,  
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan,  
Malaysia.

#### **Date of revision :**

16<sup>th</sup> Dec. 2011

## **MINISON Tablet 1mg**

Prazosin Hydrochloride 1.095mg (eq. to Prazosin 1 mg)

### **Apakah yang ada pada risalah ini**

Risalah ini ditulis untuk menjawab soalan-soalan yang kerap ditanya tentang MINISON Tablet. Risalah ini hanya mengandungi sebahagian maklumat. Sila rujuk kepada pakar kesihatan untuk keterangan lanjut.

### **Apakah kegunaan MINISON Tablet 1mg**

Digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi.

### **Bagaimana MINISON Tablet 1mg berfungsi**

MINISON ialah sejenis perencat alfa yang boleh mengendurkan otot tertentu dan memastikan saluran darah kecil sentiasa dalam keadaan terbuka. MINISON menghalang norepinephrine hormon (noradrenalin) daripada mengecutkan otot-otot pada dinding arteri dan vena yang lebih kecil. Ini akan menyebabkan saluran darah sentiasa dalam keadaan terbuka dan mengendur. Justeru memperbaiki aliran darah dan menurunkan tekanan darah.

### **Sebelum Mengambil MINISON Tablet 1mg**

#### **Bila tidak boleh mengambil**

Jika anda alah dengan prazosin hydrochloride.

#### **Sebelum mula mengambil**

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat ataupun mempunyai sebarang masalah kesihatan.

#### **Jika mengambil ubat-ubat lain**

Beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat. Interaksi diantara MINISON dengan ubat yang lain seperti digoxin, chlorpromazine dan amitriptyline atau kumpulan ubat yang lain seperti diuretic, agen antihipertensif yang lain, analgesik dan penyekat saluran kalsium mungkin akan berlaku.

### **Cara menggunakan MINISON Tablet 1mg**

#### **Berapa banyak harus diambil**

Dos permulaan: 0.5mg, 2-3 kali sehari. Dos boleh dinaikkan kepada 1mg, 2-3 kali sehari selepas 3-7 hari. Dos penyelenggaraan: 6-15 mg sehari (pembahagian dose).

#### **Bila perlu diambil**

Dos permulaan perlu diambil sebelum tidur untuk mengelakkan sinaps hipotensi postural. Ambil ubat ini mengikut arahan doktor.

#### **Berapa lama perlu diambil**

Ia perlu diberikan bergantung kepada arahan doktor.

#### **Jika terlupa mengambil**

Jika anda terlupa satu dos dan anda mengambil dos ini secara berterusan, ambil dos itu secepat mungkin. Jika sudah beberapa jam selepas masa makan ubat berlalu ataupun sudah mendekati masa pengambilan dos yang kedua, jangan mengambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa, kecuali dinasihati oleh doktor. Jangan mengambil 2 dos pada masa yang sama.

#### **Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)**

Minta perhatian perubatan dengan segera jika anda atau orang lain telah mengambil dos berlebihan.

### **Semasa menggunakan MINISON Tablet**

#### **Perkara yang perlu dilakukan**

Ikut arahan doktor anda semasa mengambil ubat ini.

#### **Perkara yang tidak boleh dilakukan**

Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah pengambilan dos tanpa arahan doktor. Jangan memberi ubat ini kepada sesiapa walaupun simptom mereka serupa dengan anda.

### **Perkara yang perlu diberi perhatian**

Perhatian perlu diberi jika diguna oleh pesakit angina, pesakit yang mempunyai kegagalan ginjal, kegagalan hati, dan orang tua. Pesakit mungkin akan pening atau pitam selepas pengambilan dos permulaan. Produk ini perlu diguna dengan berhati-hati pada wanita mengandung dan menyusu.

### **Kesan-kesan sampingan**

Penurunan tekanan darah yang serius disebabkan oleh perubahan kedudukan badan, pening, mengantuk, sakit kepala, keletihan, loya, debaran jantung, edema, sakit dada, susah bernafas, sembelit, cirit-birit, muntah, kemurungan, vertigo, khayalan, sensasi kebas pada kulit, kesesakan hidung, kekeringan mulut, kerap kencing, mata merah, penglihatan kabur, berdengung di telinga, ruam kulit, kegatalan, dan berpeluh secara berlebihan.

### **Selepas menggunakan MINISON Tablet**

#### **Cara penyimpanan**

Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

#### **Cara pelupusan**

Jika doktor atau ahli farmasi anda mengarahkan supaya berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini telah luput tarikh. Sila bertanya kepada doktor atau ahli farmasi tentang cara pengendalian ubat yang tertinggal.

### **Maklumat lanjut**

#### **Rupa dan warna produk**

Tablet berbentuk elips yang berwarna jingga muda dengan skor pada satu permukaan.

#### **Bahan-bahan kandungan**

Prazosin Hydrochloride  
Magnesium Aluminium Silicate  
Magnesium Stearate  
Starch  
Sodium Starch Glycolate  
Talc  
Lactose  
Sunset Yellow

#### **MAL no.**

MAL 19990104A

#### **Pengilang**

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.  
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor D.E., Malaysia.

#### **Marketing Authorization Holder:**

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.  
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13, Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

#### **Tarikh kemaskini RiMUP :**

15<sup>th</sup> Dec. 2011