

Mucoease Syrup 2%
(Carbocisteine 100 mg)

Mucoease Syrup 5%
(Carbocisteine 250 mg)

What is in this leaflet

1. What Mucoease Syrup is used for
2. How Mucoease Syrup works
3. Before you take Mucoease Syrup
4. How to take Mucoease Syrup
5. While you are taking Mucoease Syrup
6. Side effects
7. Storage and Disposal of Mucoease Syrup
8. Product Description
9. Manufacturer
10. Marketing Authorisation Holder
11. Date of Revision

What Mucoease Syrup is used for

Mucoease Syrup is used for problems with the breathing passages (respiratory tract). These problems happen when too much mucus is made or the mucus is too sticky.

How Mucoease works

It works by making mucus (phlegm) less sticky. This makes the mucus easier to cough up.

Before you take Mucoease

When you must not take it

Do not take Mucoease Syrup if:

- You are allergic (hypersensitive) to carbocisteine or any of the other ingredients of Mucoease Syrup. Signs of an allergic reaction include: a rash, swallowing or breathing problems, swelling of the lips, face, throat or tongue.
- You have an ulcer in your stomach or gut (small intestine)

Do not take this medicine if any of the above applied to you. If you are not sure, talk to your doctor or pharmacist before taking Mucoease Syrup.

Before you start to take it

Always take Mucoease Syrup exactly as your doctor has told you. You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Taking other medicines

You should always tell your doctor if you are taking or have recently taken any other medicines including those obtained without a prescription.

How to take Mucoease

How much to take

Always take Mucoease Syrup exactly as your doctor has told you. You should check with your

doctor or pharmacist if you are not sure.

Mucoease Syrup 5%

- Usual dose is 10 ml three times a day.

Mucoease Syrup 2%

- Children 2-5 years old: Usual dose is 5 mL two times a day.
- Children over 5 years old: Usual dose is 5 mL three times a day.

Doctors sometimes prescribe different doses to these. The label on the pack will tell you which dose you should take. If you are still not sure, ask your doctor or pharmacist.

When to take it

Your doctor will tell you when to take it. Read the label on the carton to follow exactly what your doctor has told you. Try to take mucoease Syrup at the same time every day.

How long to take it

Keep taking Mucoease Syrup for as long as your doctor recommends.

Always continue with the course even if you feel better. If your conditions get worse or you do not start to feel better within a few days, go back and see your doctor.

If you forget to take it

If you forget to take Mucoease Syrup take it as soon as you can. Take your next dose at the right

time. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

If you take too much (overdose)

If you take more Mucoease Syrup than you should, tell your doctor or go to a hospital straight away. Take the medicine pack with you. This is so the doctor knows what you have taken. If you take too much Mucoease Syrup, it is likely that you will get an upset stomach (gastrointestinal disturbance).

While you are using Mucoease Syrup

Things you must do

Talk to your doctor before taking this medicine if:

- You are pregnant, might become pregnant or think you may be pregnant. This medicine should not be taken during the first three months of your pregnancy.
- You are breast-feeding or planning to breast-feed

Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine if you are pregnant or breast-feeding.

Things you must not do

Please do not take Mucoease Syrup if you have active peptic ulcers. Please talk to your doctor before taking Mucoease Syrup if

you have been previously diagnosed with peptic ulcers.

Things to be careful of

Patients with rare hereditary problems of fructose intolerance, glucose-galactose malabsorption or sucrase-isomaltase insufficiency should not take this medicine. Please talk to your doctor if you have these conditions.

Side effects

Like all medicines, Mucoease Syrup can cause side effects, although not everybody gets them. Stop taking Mucoease Syrup and see a doctor or go to a hospital straight away if:

- You have an allergic reaction. The signs may include skin rash.
- You have nausea, headache, gastric discomfort or diarrhea.

Tell a doctor straight away if you notice any of the following serious side effects:

- Blood in your vomit or black tarry stools.

Talk to your doctor or a pharmacist if you notice any side effects not listed in this leaflet.

Storage and Disposal of Mucoease Syrup

Storage

Keep all medicines out of the sight and reach of children.

Do not take this medicine after the expiry date stamped on the pack/bottle.

Store below 25°. Protect from light.

Disposal

Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

Product Description

What it looks like

Mucoease Syrup 2%

Clear, red syrup.

Mucoease Syrup 5%

Clear, orange syrup.

Ingredients:

Mucoease Syrup 2% contains Carbocisteine 100 mg, Sodium hydroxide, Xylitol C, Metyl paraben, Allura red, Vanilla flavor, Cherry flavor, Hydrochloric acid, Sucrose, Purified water.

Mucoease Syrup 5% contains Carbocisteine 250 mg, Sodium hydroxide, Xylitol C, Metyl paraben, Ariavit sunset yellow, Vanilla flavor, Prune extract,

Hydrochloric acid, Sucrose,
Purified water.

MAL NO:

Mucoease Syrup 2%

MAL20040881X

Mucoease Syrup 5%

MAL20040880X

Manufacturer:

Pharmaniaga Manufacturing
Berhad (60016-D),
11A, Jalan P/1, Kawasan
Perusahaan Bangi, 43650 Bandar
Baru Bangi, Selangor Darul
Ehsan, Malaysia.

Marketing Authorisation

Holder:

Pharmaniaga Manufacturing
Berhad (60016-D),
11A, Jalan P/1, Kawasan
Perusahaan Bangi, 43650 Bandar
Baru Bangi, Selangor Darul
Ehsan, Malaysia.

Date of revision:

21 January 2013

Mucoease Syrup 2%
(Carbocisteine 100 mg)

Mucoease Syrup 5%
(Carbocisteine 250 mg)

Kandungan risalah ini

1. Apakah kegunaan Sirap Mucoease
2. Bagaimana Sirap Mucoease berfungsi
3. Sebelum pengambilan Sirap Mucoease
4. Cara pengambilan Sirap Mucoease
5. Semasa pengambilan Sirap Mucoease
6. Kesan-kesan sampingan
7. Penyimpanan dan Pelupusan Sirap Mucoease
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran
11. Tarikh kemaskini risalah

Apakah Kegunaan Sirap Mucoease

Sirap Mucoease digunakan untuk mengubati masalah saluran pernafasan (saluran pernafasan). Masalah ini berlaku apabila mukus (lendir) terlalu banyak atau terlalu pekat.

Bagaimana Sirap Mucoease berfungsi

Ubat ini berfungsi dengan cara mencairkan mukus (kahak). Ini

memudahkan mukus ini terkeluar apabila batuk.

Sebelum pengambilan Sirap

Mucoease

Bila tidak patut mengambil

Jangan ambil Sirap Mucoease sekiranya:

- Anda alah (hipersensitif) kepada carbocisteine atau apa-apa bahan lain dalam Sirap Mucoease. Antara tanda-tanda tindak balas alahan ialah: masalah ruam, sukar menelan atau bernafas, bengkak pada bibir, muka, tekak atau lidah.
- Anda mengalami ulser dalam perut atau usus (usus kecil).

Jangan makan ubat ini sekiranya anda mengalami sebarang keadaan yang disebutkan di atas. Sekiranya anda tidak pasti, berbincang dengan doktor anda atau ahli farmasi sebelum memulakan pengambilan Sirap Mucoease.

Sebelum anda mula mengambil

Sirap Mucoease perlu diambil sebagaimana yang ditetapkan oleh doktor. Dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi sekiranya anda tidak pasti mengenainya.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Anda hendaklah sentiasa memberitahu doktor anda jika anda mengambil atau baru-baru

ini mengambil sebarang ubat lain termasuk ubat yang diperoleh tanpa preskripsi.

Cara pengambilan Sirap

Mucoease

Berapa banyak perlu diambil

Sirap Mucoease perlu diambil sebagaimana yang ditetapkan oleh doktor. Dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi sekiranya anda tidak pasti mengenainya.

Sirap Mucoease 5%

- Dos yang biasa ialah 10 ml tiga kali sehari.

Sirap Mucoease 2%

- Kanak-kanak 2-5 tahun: Dos yang biasa ialah 5mL dua kali sehari.
- Kanak-kanak melebihi 5 tahun: Dos yang biasa ialah 5mL tiga kali sehari.

Kadang-kadang, doktor menetapkan dos yang berbeza untuk peringkat umur ini. Label pada pek menyediakan maklumat mengenai dos yang perlu diambil. Sekiranya anda masih tidak pasti, dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi.

Bila perlu diambil

Doktor anda akan memberitahu anda bila perlu mengambilnya. Baca label pada kotak untuk mengikut arahan doktor anda dengan betul. Seboleh-bolehnya,

ambil Sirap mucoease pada waktu yang sama setiap hari.

Berapa lama perlu diambil

Teruskan pengambilan Sirap Mucoease selagi doktor anda mengesyorkannya.

Teruskan juga pengambilan walaupun anda berasa sudah sihat. Sekiranya keadaan anda bertambah teruk atau tidak menunjukkan tanda-tanda makin pulih dalam masa beberapa hari setelah pengambilannya, jumpa doktor anda semula.

Jika terlupa mengambil

Sekiranya anda terlupa mengambil Sirap Mucoease, makan ubat tersebut sesegera yang boleh. Ambil dos anda yang berikutnya pada masa yang betul. Jangan ambil dos berganda sebagai ganti dos yang anda terlupa ambil.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya anda mengambil Sirap Mucoease lebih daripada yang sepatutnya, maklumkan kepada doktor anda atau terus pergi ke hospital. Bawa bungkus ubat bersama anda. Tujuannya ialah supaya doktor anda mengetahui jenis ubat yang anda ambil. Sekiranya anda terlebih ambil Sirap Mucoease, kemungkinan anda akan berasa sakit perut (gangguan gastrousus).

Semasa menggunakan Sirap

Mucoease

Perkara yang anda perlu lakukan

Berbincang dengan doktor anda sebelum mengambil ubat ini sekiranya:

- Anda hamil, mungkin akan hamil atau merasakan anda mungkin hamil. Ubat ini tidak harus diambil semasa tiga bulan pertama kehamilan anda.
- Anda menyusui bayi atau merancang untuk menyusui bayi.

Dapatkan nasihat daripada doktor anda atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat sekiranya anda hamil atau menyusui bayi.

Perkara yang anda tidak boleh lakukan

Jangan ambil Sirap Mucoease sekiranya ulser peptik anda aktif. Sila berbincang dengan doktor anda sebelum mengambil Sirap Mucoease sekiranya anda dikenal pasti menghidap ulser peptik sebelum ini.

Perkara yang perlu diawasi

Para pesakit yang mengalami masalah penyakit keturunan yang jarang berlaku seperti tidak tahan fruktosa, ketidaknormalan penyerapan glukosa-galaktosa atau kekurangan sukrase-isomaltase tidak seharusnya

mengambil ubat ini. Sila berbincang dengan doktor anda sekiranya anda mengalami keadaan-keadaan ini.

Kesan sampingan

Sebagaimana ubat-ubatan lain, Sirap Mucoease boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun tidak pada semua orang. Hentikan pengambilan Sirap Mucoease dan berjumpa dengan doktor anda atau pergi terus ke hospital sekiranya:

- Anda mengalami tindak balas alahan. Antara tanda-tandanya ialah ruam pada kulit.
- Anda mengalami rasa loya, sakit kepala, sakit gastrik atau cirit-birit.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda dapati anda mengalami sebarang kesan sampingan yang serius seperti berikut:

- Anda muntah yang bercampur darah atau najis anda hitam dan pekat.

Berbincang dengan doktor anda atau ahli farmasi sekiranya anda mengalami sebarang kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini.

Penyimpanan dan Pelupusan

Sirap Mucoease

Penyimpanan

Pastikan semua ubat tidak dapat dilihat dan dicapai oleh kanak-kanak.

Jangan ambil ubat ini sekiranya telah melepasi tarikh luput yang dicetak pada bungkusan/botolnya.

Simpan di tempat yang bersuhu bawah 25°. Lindungi daripada pancaran cahaya.

Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Makluman Lanjut

Rupa ubat

Ubat Mucoease 2%

Sirap jernih yang berwarna merah.

Ubat Mucoease 5%

Sirap jernih yang berwarna oren.

Ramuan:

Sirap Mucoease 2% mengandungi Carbocisteine 100

mg, Sodium hydroxide, Xylitol C, Metyl paraben, Allura red, Vanilla flavor, Cherry flavor, Hydrochloric acid, Sucrose, Air tulen.

Sirap Mucoease 5% mengandungi Carbocisteine 250 mg, Sodium hydroxide, Xylitol C, Metyl paraben, Ariavit sunset yellow, Vanilla flavor, Prune extract, Hydrochloric acid, Sucrose, Air tulen..

Nombor MAL:

Ubat Mucoease 2%

MAL20040881X

Ubat Mucoease 5%

MAL20040880X

Pengilang:

Pharmaniaga Manufacturing Berhad (60016-D),
11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran:

Pharmaniaga Manufacturing Berhad (60016-D),
11A, Jalan P/1, Kawasan Perusahaan Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tarikh kemaskini risalah:
21 Januari 2013