

GLIMICRON 80 MG TABLET

Gliclazide 80 mg tablet

What is in this leaflet?

1. What Glimicron Tablet is used for
2. How Glimicron Tablet works
3. Before you take Glimicron Tablet
4. How to take Glimicron Tablet
5. While you are taking Glimicron Tablet
6. Side effects
7. After using Glimicron Tablet
8. Product description
9. Manufacturer
10. Marketing Authorisation Holder
11. Date of revision

What Glimicron Tablet is used for

Glimicron tablet is used to control blood glucose (the amount of sugar in the blood) in people with Type 2 diabetes mellitus. This type of diabetes is also known as Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM).

How Glimicron Tablet works

Glimicron tablet belongs to a group of medicines called sulfonylureas.

These medicines lower blood glucose by promoting the release of insulin from pancreas.

If your blood glucose is not properly controlled, you may experience or hypoglycaemia (low blood glucose) or hyperglycaemia (high blood glucose).

Before you use Glimicron Tablet

When you must not take it

Do not take Glimicron if you are allergic to:

- medicines containing gliclazide
- sulfonamide ("sulfa") antibiotics or "sulfa" medicines including sulfamethoxazole and acetazolamide

- any of the ingredients of this medicine

Some of the symptoms of an allergic reaction may include skin rash, itching or hives; swelling of the face, lips or tongue which may cause difficulty in swallowing or breathing; wheezing and shortness of breath.

Do not take Glimicron if you have any of the following medical conditions:

- Type 1 diabetes mellitus, also known as insulin dependent diabetes or juvenile onset diabetes
- unstable diabetes that is not well controlled
- diabetic ketoacidosis, or a history of repeated episodes of ketoacidosis (this a symptom of uncontrolled diabetes, in which substances called ketone bodies build up in the blood)
- diabetic coma or pre-coma, which may follow on from diabetic ketoacidosis mentioned above
- severe kidney disease
- severe liver disease.

Do not take Glimicron if you are pregnant or plan to become pregnant.

Insulin is more suitable for controlling blood glucose during pregnancy. Your doctor will replace Glimicron with insulin while you are pregnant.

Glimicron is not recommended while you are breastfeeding.

Do not give Glimicron to children. There is not enough experience with the use of Glimicron in children.

Do not take this medicine after the expiry date printed on the pack or if the packaging is torn or shows signs of tampering.

Before you start to take it

Tell your doctor if you are allergic to any other medicines, foods, dyes or preservatives.

Tell your doctor if you have any medical conditions, especially the following:

- kidney problems
- liver problems
- glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency, a condition in which the body does not have enough of the enzyme G6PD
- a history of diabetic coma
- adrenal, pituitary or thyroid problems
- heart failure.

Tell your doctor if you:

- drink alcohol
- do not eat regular meals
- do a lot of exercise
- are ill or feeling unwell.

Alcohol, diet, exercise and your general health all strongly affect the control of your diabetes. Discuss these with your doctor.

If you have not told your doctor about any of the above, tell them before you start taking Glimicron.

Taking other medicines

Tell your doctor if you are taking any other medicines, including any that you buy without a prescription from a pharmacy, supermarket or health food shop.

Some medicines may be affected by Gliclazide, or may affect how well it works. These include:

- other medicines used to treat diabetes, including insulin and metformin

- medicines that contain alcohol, such as cough and cold syrups
- beta blockers, a group of medicines used to treat high blood pressure and other heart conditions, such as atenolol and metoprolol
- monoamine oxidase inhibitors (MAOIs), a group of medicines used to treat depression, such as tranlycypromine and phenelzine
- non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), a group of medicines used to relieve pain, swelling and other symptoms of inflammation, including arthritis, such as ibuprofen
- medicines used to prevent blood clots such as warfarin
- cimetidine, a medicine used to treat reflux and ulcers
- clofibrate, a medicine used to reduce high blood fat levels
- corticosteroids such as prednisone and cortisone
- oestrogens in oral contraceptives and hormone replacement therapy
- certain types of fluid tablets (thiazide diuretics), used to treat high blood pressure and swelling, such as hydrochlorothiazide and chlorthalidone
- barbiturates, medicines used to treat epilepsy or for sedation, such as phenobarbitone.

Your doctor or pharmacist can tell you what to do if you are taking any of these medicines. They also have more information on medicines to be careful with or avoid while taking Glimicron.

If you are not sure whether you are taking any of these medicines, check with your doctor or pharmacist.

How to take Glimicron Tablet

How much to take

The usual dose of Glimicron tablet 80 mg is half a tablet to one tablet daily.

Your doctor may increase this dose up to four tablets a day, depending on how you respond to Glimicron.

Doses of more than 2 tablets daily should be given in 2 divided doses.

Swallow the tablets with a glass of water.

When to take it

Do not skip meals while taking Glimicron.

It does not matter if you take Glimicron before, during or after food.

However, it is important that you take it at the same time each day.

If you need to take more than two tablets per day, take them as two divided doses, in the morning and evening.

How long to take it

Keep taking Glimicron for as long as your doctor recommends.

Glimicron will help control diabetes but will not cure it. Most people will need to take Glimicron for a long period of time.

If you forget to take it

If it is almost time for your next dose, skip the dose you missed and take your next dose when you are meant to.

Otherwise, take the missed dose as soon as you remember, and then go back to taking your tablets as you would normally.

Do not take a double dose to make up for the dose you missed.

If you are not sure what to do, ask your doctor or pharmacist.

If you take too much (overdose)

If you or someone else has taken too much gliclazide, contact your doctor or pharmacist immediately.

If you take too much gliclazide, you may experience symptoms of hypoglycaemia (low blood glucose).

If not treated quickly, these symptoms may progress to loss of co-ordination, slurred speech, confusion, fits or loss of consciousness. At the first signs of hypoglycaemia, raise your blood glucose quickly by ingestion of a source of sugar.

While you are taking Glimicron Tablet

Things you must do

Before starting any new medicine, tell your doctor or pharmacist that you are taking Glimicron.

Tell all the doctors, dentists and pharmacists who are treating you that you are taking Glimicron.

If you become pregnant while taking Glimicron, tell your doctor immediately.

Make sure that you, your friends, family and work colleagues can recognize the symptoms of hypoglycaemia and hyperglycaemia and know how to treat them.

Check your blood glucose levels regularly. This is the best way to tell if your diabetes is being controlled properly. Your doctor or diabetes educator will show you how and when to do this.

Carefully follow your doctor's and dietitian's advice on diet, drinking alcohol and exercise.

If you drink alcohol while taking Glimicron, you may get flushing, headache, breathing difficulties, rapid heart beat, stomach pains or feel sick and vomit.

The combination of alcohol and Glimicron also increases the risk of hypoglycaemia occurring.

Tell your doctor immediately if you notice the return of any symptoms of hyperglycaemia you have experienced before starting Glimicron.

These may include lethargy or tiredness, headache, thirst, passing large amounts of urine and blurred vision. These may be signs that Glimicron is no longer working, even though you may have been taking it successfully for some time.

Things you must not do

Do not skip meals while taking Glimicron.

Do not stop taking Glimicron, or change the dose, without checking with your doctor.

Do not give Glimicron to anyone else even if they have the same condition as you.

Things to be careful of

Be careful driving or operating machinery until you know how Glimicron affects you.

Glimicron may cause dizziness in some people. Drinking alcohol can make this worse. If either of these occur, do not drive, operate machinery or do anything else that could be dangerous.

Be careful not to let your blood glucose levels fall too low. Low blood glucose levels may slow your reaction time and affect your ability to drive or operate machinery.

If you become sick with a cold, fever or flu, it is very important to continue taking Glimicron and eating your normal meals.

If you have trouble eating solid food, use sugar-sweetened drinks as a carbohydrate substitute or eat small amounts of bland food.

Your diabetes educator or dietician can give you a list of foods to eat on sick days.

When you are travelling, it is a good idea to:

- wear some form of identification (e.g. bracelet) showing you have diabetes
- carry some form of sugar to treat hypoglycaemia if it occurs, for example, sugar sachets or jelly beans
- carry emergency food rations in case of a delay, for example, dried fruit, biscuits or muesli bars
- bring enough Glimicron with you, so you don't miss any doses.

Side effects

All medicines can cause unwanted side effects. These effects can be serious but most of the time, they are mild and temporary.

Tell your doctor or pharmacist as soon as possible if you do not feel well while you are taking Glimicron.

Glimicron helps most people with diabetes, but it may have unwanted side effects in some people.

Ask your doctor or pharmacist to answer any questions you may have.

Do not be alarmed by this list of possible side effects. You may not experience any of them.

Tell your doctor if you notice any of the following and they worry you:

- signs of hypoglycaemia which may include weakness, trembling or shaking, sweating, lightheadedness, headache, dizziness, irritability and tearfulness
- stomach upset including nausea (feeling sick), heartburn
- constipation or a feeling of fullness in the stomach
- headache
- tiredness, weariness.

Tell your doctor immediately if you notice any of the following:

- skin rash, itching, hives

- swelling of the face, lips or tongue which may cause difficulty in swallowing or breathing; wheezing; or shortness of breath.

Tell your doctor if you notice anything that is making you feel unwell.

Other unwanted side effects not listed may occur. Tell your doctor immediately.

After using Glimicron Tablet

Storage

Keep out of reach of children. Store below 25°C. Protect from moisture.

Disposal

No specific instructions. Please ask your pharmacist how to dispose unused medicines properly.

Product description

What it looks like?

Round, white uncoated tablet, flat faces, bevel-edged, cross score embossed on one face.

Ingredients

Each tablet contains Gliclazide 80 mg.

MAL NO: MAL19960983A

Manufacturer and Marketing Authorisation Holder

HOVID Berhad
121, Jalan Tunku Abdul Rahman,
30010 Ipoh, Malaysia.

Date of revision

December 2011

GLIMICRON 80 MG TABLET

Gliclazide 80 mg tablet

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan Glimicron Tablet
2. Bagaimana Glimicron Tablet berfungsi
3. Sebelum mengambil Glimicron Tablet
4. Cara menggunakan Glimicron Tablet
5. Semasa menggunakan Glimicron Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Glimicron Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Kelulusan Pemasaran
11. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Glimicron Tablet

Glimicron tablet digunakan untuk mengawal glukosa darah (jumlah gula di dalam darah) untuk orang yang menghidapi diabetes mellitus Jenis 2.

Jenis penyakit kencing manis ini juga dikenali sebagai *Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus* (NIDDM).

Bagaimana Glimicron Tablet berfungsi

Glimicron tablet tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai *sulfonylureas*.

Ubat ini membantu merendahkan glukosa dalam darah dengan menggalakkan pelepasan insulin daripada pankreas.

Jika glukosa darah anda tidak dikawal dengan betul, anda mungkin mengalami *hypoglycaemia* (glukosa darah rendah) atau *hyperglycaemia* (glukosa darah tinggi).

Sebelum mengambil Glimicron Tablet

Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil Glimicron jika anda alah kepada:

- ubat-ubatan yang mengandungi gliclazide
- sulfonamide ("sulfa") antibiotik atau ubat-ubatan "sulfa" termasuk *sulfamethoxazole* dan *acetazolamide*
- mana-mana bahan-bahan bahan-bahan kandungan ubat ini

Sesetengah gejala-gejala alahan mungkin termasuk termasuk ruam kulit, gatal-gatal, bengkak di muka, bibir atau lidah yang boleh menyebabkan kesukaran menelan atau bernafas; berdehit dan sesak nafas.

Jangan mengambil Glimicron jika anda mempunyai apa-apa rawatan perubatan berikut:

- *Type 1 diabetes mellitus*, juga dikenali sebagai *insulin dependent diabetes or juvenile onset diabetes*
- kencing manis yang tidak stabil yang tidak kawal dengan baik
- *ketoacidosis* kencing manis, atau sejarah episod yang berulang-ulang *ketoacidosis* (gejala diabetes yang tidak terkawal, di mana bahan-bahan yang dipanggil *ketone bodies* terkumpul dalam darah)
- *diabetic coma or pre-coma*, yang mungkin berlanjutan daripada *ketoacidosis diabetes* yang dinyatakan di atas
- penyakit buah pinggang yang serius
- penyakit hati yang serius

Jangan mengambil Glimicron jika anda mengandung atau bercadang untuk hamil.

Insulin adalah lebih sesuai untuk mengawal glukosa dalam darah semasa mengandung. Doktor anda akan

menggantikan Glimicron dengan insulin semasa anda hamil.

Glimicron adalah tidak digalakkan semasa anda sedang menyusukan.

Jangan memberi Glimicron kepada kanak-kanak. Tidak ada pengalaman yang cukup dengan penggunaan Glimicron di kalangan kanak-kanak.

Jangan mengambil ubat ini selepas tarikh luput yang dicetak pada pek atau jika bungkusan koyak atau menunjukkan tanda-tanda koyak.

Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor anda jika anda alah kepada apa-apa ubat-ubatan lain, makanan, pewarna atau pengawet.

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai apa-apa keadaan perubatan, terutamanya yang berikut:

- masalah buah pinggang
- masalah hati
- *glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency*, satu keadaan di mana badan tidak mempunyai cukup enzim G6PD
- sejarah kencing manis koma
- masalah adrenal, pituitari atau tiroid
- kegagalan jantung.

Beritahu doktor anda jika anda:

- minum alcohol
- tidak tetap makan
- melakukan banyak senaman
- sakit atau rasa tidak sihat. Alcohol, diet, senaman dan kesihatan umum anda semua amat mempengaruhi kawalan diabetes anda.

Bincangkan ini dengan doktor anda.

Jika anda tidak memberitahu doktor anda tentang mana-mana di atas, beritahu mereka sebelum anda mula mengambil Glimicron.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil sebarang ubat-ubatan yang lain dalam apa jua bentuk termasuk apa-apa yang anda membeli atau diperolehi tanpa preskripsi.

Sesetengah ubat mungkin terjejas oleh Gliclazide, atau boleh memberi kesan kepada fungsi ubat. Ini termasuk:

- ubat-ubatan lain yang digunakan untuk merawat kencing manis, termasuk insulin dan metformin
- ubat-ubatan yang mengandungi alkohol, seperti sirap batuk dan sejuk
- *beta blockers*, kumpulan ubat-ubatan yang digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi dan keadaan jantung yang lain, seperti *atenolol* dan *metoprolol*
- *monoamine oxidase inhibitors* (MAOIs), kumpulan ubat-ubatan yang digunakan untuk merawat kemurungan, seperti *tranylcypromine* dan *phenelzine*
- *non-steroidal anti-inflammatory drugs* (NSAID), sekumpulan ubat-ubatan yang digunakan untuk melegakan kesakitan, bengkak dan lain-lain gejala radang, termasuk *arthritis*, seperti *ibuprofen*
- ubat-ubatan yang digunakan untuk mengelakkan pembekuan darah seperti *warfarin*
- *cimetidine*, ubat yang digunakan untuk merawat *reflux* dan ulser
- *clofibrate*, ubat yang digunakan untuk mengurangkan paras lemak darah yang tinggi
- *corticosteroids* seperti *prednisone* dan *cortisone*
- *oestrogens* dalam pil perancang dan terapi hormon gention
- beberapa jenis tablet bendalir (*thiazide diuretics*), digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi dan bengkak, seperti *hydrochlorothiazide* dan *chlorthalidone*
- *barbiturates*, ubat-ubatan yang digunakan untuk merawat *epilepsy* atau untuk ubat pelali, seperti *phenobarbitone*.

Doktor atau ahli farmasi anda boleh memberitahu anda apa yang boleh dilakukan jika anda mengambil mana-mana ubat-ubatan ini. Mereka juga mempunyai maklumat lanjut mengenai ubat-ubatan untuk ubat-ubatan yang memerlukan perhatian atau perlu dielakkan sementara mengambil Glimicron.

Jika anda tidak pasti sama ada anda mengambil apa ubat ini, periksa dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Cara menggunakan Glimicron Tablet

Berapa banyak harus diambil

Dos kebiasaan untuk Glimicron mg tablet 80 adalah setengah hingga satu tablet setiap hari.

Doktor anda boleh meningkatkan dos ini sehingga empat pil sehari, bergantung kepada respond anda kepada Glimicron.

Dos yang lebih daripada 2 tablet setiap hari perlu diberi dalam 2 dos yang dibahagikan.

Menelan tablet dengan segelas air.

Bila perlu diambil

Jangan melangkau waktu makan semasa mengambil Glimicron.

Ia tidak kira sama ada anda mengambil Glimicron sebelum, semasa atau selepas makan.

Walau bagaimanapun, ia adalah penting bahawa anda mengambil ia pada masa yang sama setiap hari.

Jika anda perlu mengambil lebih daripada dua tablet sehari, mengambil mereka sebagai dua dos dibahagikan, pada waktu pagi dan petang.

Berapa lama perlu diambil

Sila terus mengambil Glimicron selama mana yang diarahkan oleh doktor anda.

Glimicron akan membantu mengawal *diabetes* tetapi tidak dapat menyembuhkan. Kebanyakan orang

akan perlu mengambil Glimicron untuk tempoh masa yang panjang.

Jika terlupa mengambil

Jika hampir masa untuk mengambil dos yang seterusnya, tinggalkan dos yang anda terlupa ambil dan mengambil dos yang seterusnya pada waktu yang ditetapkan.

Atau, mengambil dos itu sebaik sahaja anda teringat dan mengambil dos yang lain seperti biasa.

Jangan gandakan dos bagi menggantikan dos yang tertinggal. Ini akan meningkatkan peluang untuk mendapatkan kesan sampingan yang tidak diingini. Jika anda tidak pasti apa harus dilakukan, sila berhubung dengan doktor atau ahli farmasi.

Sekiranya anda mempunyai masalah untuk mengingatkan waktu untuk mengambil ubat, sila mendapatkan bantuan daripada ahli farmasi anda.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda atau orang lain telah mengambil gliclazide terlalu banyak, hubungi doktor atau ahli farmasi dengan segera.

Jika anda mengambil terlalu banyak gliclazide, anda mungkin mengalami simptom *hypoglycaemia* (glukosa darah rendah).

Jika tidak dirawat dengan segera, gejala-gejala ini boleh berlanjut kepada kehilangan *co-ordination*, pertuturan yang tidak jelas, kekeliruan, sawan atau tidak sedarkan diri.

Semasa tanda-tanda *hypoglycaemia* yang pertama, meningkatkan glukosa darah anda dengan segera melalui pemakanan makanan gula.

Semasa menggunakan Glimicron Tablet

Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda akan bermula untuk mengambil sebarang ubat yang baru, sila beritahu doktor atau ahli farmasi bahawa anda sedang mengambil Glimicron.

Sila beritahu doktor lain, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Glimicron.

Jika anda telah hamil semasa mengambil ubat ini, sila beritahu doktor anda dengan secepat mungkin.

Pastikan bahawa anda, rakan-rakan anda, keluarga dan rakan sekerja anda boleh mengenali tanda-tanda *hypoglycaemia* dan *hyperglycaemia* dan tahu bagaimana untuk merawatnya.

Periksa paras glukosa darah anda secara berkala. Ini adalah cara yang terbaik untuk memastikan sama ada diabetes anda dikawal dengan betul. Doktor atau pendidik diabetes anda akan menunjukkan kepada anda bagaimana dan bila untuk melakukan ini.

Patuh kepada arahan doktor dan pakar pakar pemakanan tentang diet, minum arak dan senaman.

Jika anda minum arak semasa mengambil Glimicron, anda boleh mendapatkan *flushing*, sakit kepala, sesak nafas, degupan jantung yang cepat, sakit perut atau rasa sakit dan muntah.

Gabungan alkohol dan Glimicron juga meningkatkan risiko *hypoglycaemia*.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mendapati apa-apa gejala *hyperglycaemia* yang anda pernah alami sebelum bermula Glimicron.

Ini mungkin termasuk kelesuan atau keletihan, sakit kepala, dahaga, kerap kencing dan penglihatan yang kabur. Ini mungkin tanda-tanda bahawa Glimicron tidak lagi berfungsi, walaupun anda

mungkin ia telah berfungsi dengan baik untuk lama.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan melangkau waktu makan semasa mengambil Glimicron.

Jangan berhenti mengambil Glimicron, atau menukar dos, tanpa memeriksa dengan doktor anda.

Jangan memberi Glimicron kepada orang lain walaupun mereka mempunyai gejala-gejala yang sama seperti anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati semasa memandu atau mengendalikan jentera sehingga anda tahu bagaimana Glimicron memberi kesan kepada anda.

Glimicron boleh menyebabkan pening pada sesetengah orang. Minum arak boleh menerukan keadaan. Jika sama satu perkara ini berlaku, jangan memandu, mengendalikan jentera atau berbuat apa-apa lain yang boleh membahayakan.

Berhati-hati supaya tidak membiarkan paras glukosa darah anda jatuh terlalu rendah. Paras glukosa darah yang rendah boleh melambatkan masa tindak balas anda dan menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera.

Jika anda jatuh sakit dengan demam sejuk, atau selesema, ia adalah sangat penting untuk terus mengambil Glimicron dan makan makanan biasa anda.

Jika anda mempunyai masalah untuk makan makanan pejal, gunakan gula minuman manis sebagai pengganti karbohidrat atau makan sejumlah kecil makanan hambar.

Pendidik diabetes anda atau pakar pemakanan boleh memberi anda senarai makanan untuk makan sewaktu sakit.

Apabila anda berlancong, ia adalah idea yang baik untuk:

- memakai beberapa bentuk pengenalan (contohnya gelang) yang menunjukkan anda menghidap diabetes
- membawa beberapa bentuk gula untuk merawat *hypoglycaemia* jika ia berlaku, sebagai contoh, sebungkus gula atau kacang jeli
- membawa bekalan makanan kecemasan dalam hal kelewatan, sebagai contoh, buah-buahan kering, biskut atau bar muesli
- membawa Glimicron yang cukup bersama dengan anda, supaya anda tidak terlepas mana-mana dos.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat akan menyebabkan kesan sampingan yang tidak diinginkan dan boleh menjadi serius tetapi kebiasaannya, ia tidak serius dan bersifat sementara.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda secepat mungkin jika anda tidak berasa sihat semasa anda mengambil Glimicron.

Glimicron membantu kebanyakan orang dengan kencing manis, tetapi ia mungkin mempunyai kesan sampingan yang tidak diinginkan pada sesetengah orang.

Tanya doktor atau ahli farmasi untuk menjawab apa-apa pertanyaan, sekiranya anda mempunyai soalan.

Jangan terkejut dengan senarai kesan-kesan sampinganyang mungkin. Anda mungkin tidak mengalami mana-mana daripada mereka.

Beritahu doktor anda jika anda notis keadaan yang berikut dan keadaan ini membimbangkan anda:

- tanda-tanda *hypoglycaemia* yang mungkin termasuk lemah, menggeletar, berpeluh, sakit kepala, pening, cepat marah dan *tearfulness*
- sakit perut termasuk loya (rasa sakit), pedih hulu hati
- sembelit atau rasa kenyang dalam perut
- sakit kepala

- keletihan

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mendapati mana-mana perkara-perkara berikut:

- ruam kulit, gatal-gatal
- bengkak di muka, bibir atau lidah yang boleh menyebabkan kesukaran menelan atau bernafas; berdehit atau sesak nafas.

Beritahu doktor anda jika anda mendapati apa-apa yang membuat anda merasa kurang sihat.

Lain-lain kesan sampingan yang tidak diingini yang tidak disenaraikan mungkin berlaku. Maklumkan kepada doktor anda dengan segera.

Cara penyimpanan dan pelupusan Glimicron Tablet

Penyimpanan

Jauhkan daripada kanak-kanak. Simpan dibawah 25^oC. Jauhi daripada kelembapan.

Pelupusan

Tiada arahan yang ditetapkan. Sila rujuk pegawai farmasi untuk mengetahui cara pelupusan ubat yang betul.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Bulat, tablet putih tidak bersalut, muka rata, *bevel-edged*, *cross score* yang timbul di salah satu muka.

Bahan-bahan kandungan

Setiap tablet mengandungi Gliclazide 80 mg.

MAL NO: MAL19960983A

Pengilang dan Pemegang Kelulusan Pemasaran

Hovid Berhad
121, Jalan Tunku Abdul Rahman,
30010 Ipoh, Perak, Malaysia.

Tarikh kemaskini RIMUP

Disember 2011