

## **Rinalix Tablet 2.5mg**

Each tablet contains Indapamide 2.5mg.

### **In this leaflet:**

- *What is Rinalix used for*
- *How Rinalix works*
- *Before you take Rinalix*
- *How to take Rinalix*
- *While you are taking Rinalix*
- *Possible side effects*
- *How should you keep Rinalix*
- *Product description*

### **What is Rinalix used for**

It is used for the treatment of high blood pressure (hypertension).

### **How Rinalix works**

Indapamide belongs to thiazide diuretics that acts directly on the kidney to increase water excretion and thus decrease blood volume and pressure of the blood vessels.

### **Before you take Rinalix**

#### ***When you must not take it***

Do not take Rinalix if you:

- are allergic (hypersensitivity) to indapamide, other sulfonamide-derived drugs or any ingredients in the medicines.
- have severe liver disease.
- have stroke.
- experience absence of urine (anuria).

#### ***Before start to take it***

Tell your doctor or pharmacist if you:

- have liver and/or renal impairment.
- have high uric acid level (hyperuricemia) and gout.
- have fluid and electrolyte imbalance.
- have disorder of parathyroid glands (hyperthyroidism)
- are pregnant or plan to pregnant.
- are breast-feeding or plan to start breast-feeding.

#### ***Taking other medicines***

Tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without prescription.

### **How to take Rinalix**

#### ***How much to take***

One tablet daily, with or without food.

#### ***When to take it***

Preferably in the morning.

#### ***How long to take it***

Follow the prescription from your doctor or pharmacist.

Ask your doctor or pharmacist before prolonged use of this medicine.

### ***If you forget to take it***

Take it as soon as you remember, unless it is nearly time for your next dose, skip the missed dose. Then go on as before. Never double up on the next dose to make up for the one missed.

### ***If you take too much***

Signs of overdose include nausea, vomiting, weakness, gastrointestinal disorders, electrolyte imbalance, low blood pressure and difficulty in breathing.

### **While you are taking Rinalix**

#### ***Things you must do***

Always wash your hand before handle the tablets. Take the tablets with water and try to take at the same time each day.

#### ***Things you must not do***

Do not chew the tablets and swallow it with water.

Do not take this medicine by yourself without prescription from your doctor or pharmacist.

#### ***Things to be careful of***

Tell your doctor or pharmacist if you:

- have problems with your liver or kidney.
- have high uric acid levels (hyperuricemia) and gout.
- have fluid and electrolyte imbalance.
- have disorder of parathyroid glands (hyperthyroidism).
- are allergic to any of the ingredients in this medicine.
- are pregnant or plan to pregnant.
- are breast-feeding or plan to start breast-feeding.

### **Possible side effects**

- low level of potassium in blood (hypokalemia).
- low blood pressure when standing up.
- allergic reactions, including skin rashes and itchiness.
- Slight increase in uric acid level.

Seek immediate medical attention if you experience any side effects or allergic reactions.

### **How should you keep Rinalix**

Store at room temperature below 30 °C.

Protect from light and moisture.

Keep out of the reach of the children.

Do not use this medicine after the expiry date.

### **Product Description**

#### ***How Rinalix looks like***

Pink color, round and deep convex film-coated tablet, 5.5 mm diameter.

Available in blister strips of 15's, packing of 60 tablets per box.

#### ***What Rinalix contains***

It contains indapamide 2.5mg.

Other ingredients are Colloidal Silicone Dioxide, HPMC Compound Mix, Povidone, Ponceau 4R Colour, Starch, Opaglos, Isopropyl Alcohol, Magnesium Stearate, Microcrystalline Cellulose, Lactose, Purified Water.

#### ***Manufactured and Marketed by***

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd  
1-5 Cheng Industrial Estate,  
75250 Melaka,  
Malaysia.

#### ***Registration number***

MAL19991142A

***Date of Revision:*** 17 August 2012

## **Rinalix Tablet 2.5mg**

Setiap tablet mengandungi Indapamide 2.5mg.

### **Apakah yang ada pada risalah ini:**

- *Apakah kegunaan Rinalix*
- *Bagaimana Rinalix berfungsi*
- *Sebelum mengambil Rinalix*
- *Cara mengambil Rinalix*
- *Semasa mengambil Rinalix*
- *Kesan-kesan sampingan*
- *Cara penyimpanan Rinalix*
- *Deskripsi produk*

### **Apakah kegunaan Rinalix**

Ia digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi (hipertensi).

### **Bagaimana Rinalix berfungsi**

Indapamide tergolong dalam kumpulan thiazide diuretik yang bertindak secara langsung pada ginjal bagi meningkatkan perkumuhan air, di mana ini akan mengurangkan isipadu darah serta tekanan pada salur darah.

### **Sebelum mengambil Rinalix**

#### ***Bila tidak boleh mengambil***

Jangan mengambil ubat ini jika anda:

- alahan (hipersensitif) terhadap indapamide, bahan terbitan-sulfonamide yang lain atau bahan-bahan lain yang terkandung dalam ubat ini.
- mempunyai penyakit hati yang serius.
- mempunyai strok.
- pernah mengalami ketiadaan air kencing (anuria).

#### ***Sebelum mula mengambil***

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- mempunyai kerosakkan hati dan/atau ginjal.
- mempunyai paras asid urik yang tinggi (hyperuricemia) dan gout.
- mempunyai ketidakseimbangan bendalir dan elektrolit.
- mempunyai gangguan kelenjar paratiroid (hyperthyroidism).
- hamil atau merancang untuk hamil.
- sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusu.

#### ***Jika mengambil lain-lain ubat***

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang atau kebelakangan ini mengambil ubat lain. Ini termasuk sebarang ubat tanpa preskripsi.

### **Cara mengambil Rinalix**

#### ***Berapa banyak harus diambil***

Satu tablet sehari, diambil sebelum atau selepas makan.

#### ***Bila perlu diambil***

Disarankan pengambilan pada waktu pagi.

#### ***Berapa lama perlu diambil***

Berdasarkan preskripsi doktor atau ahli farmasi.

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini untuk tempoh masa yang lebih panjang.

#### ***Jika anda terlupa mengambil***

Ambil secepat mungkin apabila anda teringat. Jika dos seterusnya adalah hampir, ambil dos yang seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

#### ***Jika mengambil berlebihan***

Tanda-tanda pengambilan dos berlebihan termasuk rasa loya, muntah, lemah, gangguan gastrousus, ketidakseimbangan elektrolit, tekanan darah yang rendah dan sukar untuk bernafas.

### **Semasa mengambil Rinalix**

#### ***Perkara yang harus dilakukan***

Sentiasa cuci tangan sebelum mengambil tablet. Makan tablet bersama air dan cuba mengambilnya pada waktu yang sama setiap hari.

#### ***Perkara yang tidak harus dilakukan***

Jangan kunyah tablet. Telan tablet dengan air. Jangan ambil ubat ini tanpa preskripsi doktor atau ahli farmasi.

#### ***Perkara yang perlu diberi perhatian***

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- mempunyai masalah hati atau ginjal.
- mempunyai paras asid urik yang tinggi (hyperuricemia) dan gout.
- mempunyai ketidakseimbangan bendalir dan elektrolit.
- mempunyai gangguan kelenjar paratiroid (hyperthyroidism).
- alahan (hipersensitif) terhadap indapamide atau terbitan-sulfonamide lain atau bahan lain yang terkandung dalam ubat ini.
- hamil atau merancang untuk hamil.
- sedang menyusukan anak atau rancangan untuk menyusu.

### **Kesan-kesan sampingan**

- paras kalium darah yang rendah (hypokalemia).
- tekanan darah yang rendah apabila berdiri.
- reaksi alahan, termasuk ruam kulit dan gatal-gatal.

- sedikit peningkatan pada paras asid urik.

Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan atau masalah alahan.

### **Cara penyimpanan Rinalix**

Simpan di bawah suhu 30°C.

Lindungi dari cahaya dan kelembapan.

Jauhi dari kanak-kanak.

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput

### **Deskripsi produk**

#### ***Rupa dan warna produk***

Tablet bulat dan cembung, bersalut lapis (5.5 mm diameter) berwarna merah jambu. Didapati dalam blister strips 15's di dalam kotak bungkusan 60 tablet.

#### ***Bahan-bahan kandungan***

mengandungi Indapamide 2.5mg.

Bahan-bahan kandungan lain ialah

Colloidal Silicone Dioxide, HPMC Compound Mix, Povidone, Ponceau 4R Colour, Starch, Opaglos, Isopropyl Alcohol, Magnesium Stearate, Microcrystalline Cellulose, Lactose, Purified Water.

#### ***Dikilangkan dan Dipasarkan oleh***

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd  
1-5 Cheng Industrial Estate,  
75250 Melaka,  
Malaysia.

#### ***Nombor pendaftaran***

MAL 19991142A

#### ***Tarikh kemaskini: 17 Ogos 2012***