

AMOD TABLETS

Amlodipine Tablets (5mg, 10mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

- Apakah kegunaan Amod
- Bagaimana Amod berfungsi
- Sebelum mengambil Amod
- Cara menggunakan Amod
- Semasa menggunakan Amod
- Kesan-kesan sampingan
- Cara Penyimpanan dan Pelupusan Amod
- Maklumat lanjut
- Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
- Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Amod

Amod digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi (hipertensi) atau jenis kesakitan dada disebabkan oleh penyempitan arteri koronari otot jantung (angina pectoris) atau sakit dada yang jarang berlaku disebabkan oleh kekejangan arteri koronari daripada otot jantung .

Bagaimana Amod berfungsi?

Tekanan darah tinggi berpunca dari tolakan darah yang kuat kepada salur darah. Amod akan melegakan salur darah anda dimana aliran darah akan lebih mudah dan membantu mengurangkan tekanan darah. Kandungan bahan aktif dalam Amod dapat mengurangkan risiko strok dan serangan jantung.

Angina ialah kesakitan atau ketidakselesaan yang sentiasa berulang sekiranya jantung kekurangan darah. *Angina* akan menyebabkan pesakit terasa kesakitan seperti ditekan atau diperah kebiasaannya di bahagian bawah tulang dada. Kesakitan tersebut akan sesekali dirasakan pada bahu, lengan, leher, rahang atau belakang. Amod membantu melegakan kesakitan ini.

Sebelum anda menggunakan Amod

Bila anda tidak boleh mengambilnya

Jangan ambil ubatan ini sekiranya anda alergic kepada amlodipine (bahan aktif) atau kepada bahan-bahan tidak aktif. Doktor atau ahli farmasi anda boleh memberikan anda senarai bahan-bahan ini.

Sebelum anda mula mengambilnya

Beritahu doktor sekiranya anda;

- Pernah mengalami sakit jantung
- Pernah mengalami sakit hati
- Sedang hamil, atau merancang untuk hamil. Doktor anda akan membuat keputusan andainya Amod adalah rawatan terbaik untuk anda.
- Sedang menyusukan anak. Jangan menyusukan anak semasa mengambil Amod. Anda boleh berhenti menyusukan anak atau mengambil ubatan lain.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Sebelum mengambil ubatan ini, sila beritahu doktor anda,

- Sekiranya anda mengambil atau baru-baru ini telah mengambil sebarang ubat, termasuk ubat diperolehi secara preskripsi atau bukan preskripsi termasuk ramuan semulajadi atau herba.

Anda boleh mengambil *nitroglycerin* bersama dengan Amod. Sekiranya anda mengambil *nitroglycerin* untuk *angina*, jangan berhenti mengambil ubat ini semasa anda sedang mengambil Amod.

Cara menggunakan Amod?

Berapa banyak harus digunakan?

Ambil Amod sekali sehari.

Bila perlu digunakan?

Adalah baik untuk mengambil ubat anda pada masa yang sama.

Berapa lama perlu digunakan?

Ambil *amlodipine* untuk sepanjang tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda. Jangan mengambil ubat dalam jumlah yang besar dan melebihi tempoh yang ditetapkan oleh doktor. Ikut arahan yang dicatatkan pada label preskripsi.

Beritahu doktor anda sekiranya keadaan anda tidak berubah atau bertambah teruk.

Sekiranya anda terlupa untuk mengambil Amod

Sekiranya anda terlupa untuk ambil Amod, ambil dos tersebut sebaik sahaja anda teringat. Jangan mengambil Amod sekiranya tempoh dos tersebut melebihi 12 jam dari dos yang tertinggal. Tunggu dan ambil dos seterusnya pada masa yang sama.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya anda mengambil terlalu banyak Amod, sila hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke bahagian kecemasan hospital yang terdekat.

Semasa menggunakan Amod

Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor anda sekiranya kesakitan berterusan atau bertambah teruk; sakit kepala, mengantuk, panans kemerahan, pening, loya, sakit perut, bengkak buku lali, bengkak umum (oedema) atau keletihan.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Amlodipine tidak akan menyebabkan rasa mengantuk sekiranya diambil pada dos yang ditetapkan. Jangan memandu atau menggunakan alatan mesin atau menjalankan aktiviti yang memerlukan tahap kepekaan yang tinggi sehingga anda pasti boleh melakukan aktiviti tersebut dengan selamat.

AMOD TABLETS

Amlodipine Tablets (5mg, 10mg)

Perkara yang perlu diberi perhatian

- Gunakan dengan berhati-hati pada warga tua.
- Penyakit hati: Amlodipine akan kekal lama dalam badan pesakit yang menghadapi masalah fungsi hati.
- Pesakit yang mempunyai masalah rentak jantung dan salur aortic jantung yang sempit perlu menggunakan ubat ini dengan berhati-hati.

Kesan-kesan Sampingan

Amod berkemungkinan boleh menyebabkan kesan sampingan seperti yang di bawah:

- Sakit kepala
- Pembengkakan kaki atau buku lali anda
- Keletihan, rasa mengantuk melampau
- kepeningan
- panas kemerahan (rasa panas atau hangat pada muka anda)
- *Tachycardia* (kadar denyutan jantung yang terlalu cepat)
- palpitasi jantung (denyutan jantung sangat laju)

Beritahu doktor anda sekiranya anda bimbang atau mengalami salah satu kesan sampingan. Ini bukanlah semua kemungkinan kesan-kesan sampingan Amod. Untuk senarai lengkap, sila bertanya kepada doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan-kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui no. telefon: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (*Consumers-> Reporting*)

Cara penyimpanan dan Pelupusan Amos

Penyimpanan

- Simpan di tempat yang kering dibawah suhu 25°C.
- Lindungi dari pancaran cahaya matahari
- Jauhkan dari kanak-kanak

Pelupusan

Ubat tidak boleh dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Sila bertanya kepada ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi persekitaran.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Amod 5 mg Tablets: Berwarna kuning, berbentuk bulat dan permukaan rata, tablet tidak bersalut dan mempunyai satu garisan tengah pada satu belah permukaan.

Amod 10 mg Tablets: Berwarna oren, berbentuk bulat dan permukaan rata, tablet tidak bersalut dan mempunyai satu garisan pada satu belah permukaan.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

Amod 5 mg Tablet mengandungi 5 mg amlodipine & **Amod 10mg Tablet** mengandungi 10mg amlodipine

Bahan-bahan tidak aktif:

Dibasic Calcium Phosphate, Maize Starch, Sodium Starch Glycolate (Primojel), Polyvinyl Pyrollidone (Kollidon-30), Colour Quinoline Yellow untuk Amod 5mg, Colour Sunset Yellow Supra untuk Amod 10mg, Purified Talc, Magnesium Stearate, Purified Water

Amod-5 dan **Amod-10** boleh didapati dalam kotak dengan 10x10's (10 blister pek yang mengandungi 10 tablet).

MAL No.

Amod-5 MAL12050002A

Amod-10 MAL12050003A

Pengilang:

Plethico Pharmaceuticals Ltd,
Dharavara , Kalaria – 453 001 ,
Indore (M.P.), India

Pemegang Pendaftaran Produk:

Bio Care Pharmaceutical(M) Sdn Bhd.
2-3-5, 3rd floor, Menara KLH, Business Centre, Jalan Kasipillay off Jalan Ipoh, 51200 Kuala Lumpur.

Tarikh kemaskini: 17/03/2014