

APO-CAPTO TABLET

Captopril (12.5mg, 25mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Apo-Capto
2. Bagaimana Apo-Capto berfungsi
3. Sebelum menggunakan Apo-Capto
4. Cara menggunakan Apo-Capto
5. Semasa menggunakan Apo-Capto
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Apo-Capto
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apa kegunaan Apo-Capto

Captopril adalah perencat ACE. ACE bermaksud "*angiotensin converting enzyme*".

Captopril diindikasikan untuk rawatan hipertensi *essential* (tekanan darah tinggi tanpa sebab yang dikenal pasti) atau tekanan darah tinggi *renovascular* (tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh tindak balas hormon buah pinggang terhadap penyempitan saluran darah).

Apo-Capto diindikasikan untuk kegagalan jantung yang tidak bertindak balas secukupnya kepada atau tidak boleh dikawal oleh diuretik konvensional dan terapi digitalis.

Bagaimana Apo-Capto berfungsi

Captopril berfungsi dengan menyekat enzim dalam badan yang diperlukan untuk menghasilkan sejenis bahan yang menyebabkan penyempitan saluran darah. Akibatnya, saluran darah menjadi kurang tegang dan ini merendahkan tekanan darah.

Sebelum menggunakan Apo-Capto

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan captopril jika anda hamil. Berhenti menggunakan captopril dan beritahu doktor dengan segera jika anda hamil. Captopril boleh menyebabkan kecederaan atau kematian kepada bayi dalam kandungan jika ia diambil semasa trimester kedua atau ketiga. Gunakan kawalan kelahiran yang berkesan semasa mengambil ubat ini. Captopril

boleh menyerap masuk ke dalam susu ibu dan mungkin boleh membahayakan bayi. Jangan menyusu anak semasa pengambilan captopril.

- Sebelum mula mengguna

Jangan mengambil ubat ini jika anda alah kepada captopril atau mana-mana perencat ACE yang lain.

Untuk memastikan anda boleh mengambil captopril secara selamat, beritahu doktor jika anda mempunyai keadaan-keadaan seperti berikut:

- Penyakit buah pinggang (atau jika anda bergantung kepada dialisis);
- Penyakit hati;
- Penyakit jantung atau kegagalan jantung kongestif;
- *Angioedema* (kebengkakan bawah kulit);
- kencing manis;
- Penyakit tisu penghubung seperti sindrom *Marfan*, sindrom *Sjogren*, *lupus*, *scleroderma*, atau artritis reumatoid.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda tentang semua ubat-ubatan lain yang anda gunakan, terutama sekali:

- litium;
- Suplemen kalium;
- Garam gantian yang mengandungi kalium;
- Ubat-ubatan yang boleh meluaskan saluran darah;
- aspirin atau NSAID lain-lain (ubat anti-radang yang bukan steroid)
- Diuretik (pil air).

Beritahu kepada doktor mengenai semua ubat yang anda gunakan.

Cara menggunakan Apo-Capto

- Berapa banyak harus digunakan

Dos yang dicadangkan untuk orang dewasa bermula dari 6.25 mg 3 kali sehari hingga 150 mg 3 kali setiap hari seperti mana yang ditetapkan oleh doktor anda. Ambil betul-betul seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

- Bila perlu digunakan

Apo-Capto harus diambil 1 jam sebelum makan.

- Berapa lama perlu digunakan

Jangan berhenti mengambil Apo-Capto tanpa terlebih dahulu berbincang dengan doktor anda. Menghentikan pengambilan Apo-Capto secara tiba-tiba mungkin boleh memburukkan lagi keadaan anda.

- Jika terlupa menggunakan

Mengambil dos yang terlepas secepat mungkin bila anda teringat.

Jika ia sudah hampir masa untuk dos seterusnya, terus ambil dos seterusnya mengikut jadual masa yang ditetapkan tanpa menghirau dos yang terlepas. Jangan gandakan dos untuk ubat ini.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika dos berlebihan berlaku, dalam semua kes, terapi dengan Apo-Capto harus dihentikan dengan serta-merta dan anda perlu menghubungi doktor atau pergi ke bahagian kecemasan di hospital yang terdekat.

Penggunaan secara berlebihan boleh mengakibatkan hipotensi (penurunan tekanan darah).

Semasa menggunakan Apo-Capto

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Apo-Capto.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Apo-Capto dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jangan gunakan garam gantikan atau suplemen kalium semasa mengambil captopril, melainkan jika doktor mengarahkan anda.

Keadaan-keadaan yang mungkin boleh menyebabkan tekanan darah yang sangat rendah termasuk: muntah, cirit-birit, banyak berpeluh, sakit jantung, dialisis, diet garam yang rendah, atau mengambil diuretik (pil air). Ikut arahan doktor mengenai jenis dan jumlah cecair anda perlu minum semasa mengambil captopril. Beritahu doktor jika anda mempunyai penyakit yang berpanjangan yang menyebabkan cirit-birit atau muntah-muntah.

Kesan sampingan

Hubungi doktor anda serta-merta jika mengalami kesan sampingan yang serius seperti berikut semasa mengambil captopril:

- Rasa ringan kepala, pengsan;
- Membuang air kecil lebih atau kurang daripada biasa, atau tidak sama sekali;
- Demam;
- Kulit pucat, rasa ringan kepala atau kesukaran bernafas, kadar denyutan jantung yang cepat, masalah menumpukan perhatian;
- Mudah lebam, pendarahan luar biasa (hidung, mulut, faraj, atau rektum), bintik ungu atau merah di bawah kulit anda;
- Degupan jantung yang cepat, berdebar-debar, atau tidak sekata;
- Sakit dada;
- Bengkak, berat badan naik dengan cepat

Kesan sampingan Captopril yang kurang serius mungkin termasuk:

- batuk;
- Kehilangan rasa sensasi, hilang selera makan;
- Pening, mengantuk, sakit kepala;
- Masalah tidur (insomnia);
- Mulut kering, kudis dalam mulut anda atau pada bibir anda;
- Loya, cirit-birit, sembelit;
- Kulit gatal-gatal atau ruam ringan.

Ini bukan senarai kesan sampingan yang lengkap dan kemungkinan terdapat kesan sampingan yang lain.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (*Consumers* → *Reporting*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Apo-Capto

- Penyimpanan

Anda diingatkan supaya menyimpan Apo-Capto dan semua ubat-ubat lain jauh daripada kanak-kanak.

Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh bulan dan tahun seperti mana yang ditulis pada EXP di bekas.

Simpan Apo-Capto pada suhu bilik terkawal (antara 15°- 25 ° C). Lindungi daripada kelembapan.

- Pelupusan

Tanya ahli farmasi apa yang perlu dilakukan dengan baki tablet jika doktor anda mengarah anda berhenti mengambilnya, atau telah lupus tarikh penggunaannya.

Maklumat Lanjut

-Rupa dan warna produk

Apo-Capto 12.5mg: Tablet putih, berbentuk kapsul, permukaan yang rata, dengan tepi yang serong, dibahagi dua di kedua-dua belah, "APO" di satu permukaan dan "12.5" di sebelah permukaan yang lain.

Apo-Capto 25mg: tablet putih, empat segi, dwicembung, satu permukaan dibahagikan kepada empat bahagian yang sama, "APO" diukir atas "25" di sebelah permukaan yang lain.

- Bahan-bahan Kandungan

Bahan Aktif: Captopril

Bahan tidak aktif: *Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, magnesium stearate, croscarmellose sodium dan colloidal silicon dioxide.*

- Nombor MAL

Apo-Capto 12.5mg
MAL 19987341AR

Apo-Capto 25mg
MAL 19987340AR

Pengilang

Apotex Inc.
150 Signet Drive
Weston Toronto Ontario
M9L 1T9 Canada

Pemegang Pendaftaran Produk

Pharmaforte (M) Sdn Bhd
2, Jalan PJU 3/49
Sunway Damansara
47810 Petaling Jaya

Tarikh Kemaskini RiMUP

4/12/2014

Nombor siri

BPFK(R4/1)031214/00070