

CASLOT TABLETS

Carvedilol Tablest (6.25 mg, 12.5 mg and 25.0 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan **Caslot Tablets**
2. Bagaimana **Caslot Tablets** berfungsi
3. Sebelum mengambil **Caslot Tablets**
4. Cara menggunakan **Caslot Tablets**
5. Semasa menggunakan **Caslot Tablets**
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan **Caslot Tablets**
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan **Caslot Tablets**

Caslot Tablets mengandungi ubat yang dipanggil carvedilol. Ia tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dipanggil '*beta-blockers* (penghalang beta)'.

Caslot Tablets digunakan untuk merawat berikut:

- Kegagalan jantung kronik
- Tekanan darah tinggi (hipertensi)
- Angina (sakit dada atau ketidakselesaan yang berlaku apabila jantung anda tidak mendapat oksigen yang mencukupi).

Bagaimana **Caslot Tablets** berfungsi

Caslot Tablets berfungsi dengan membuat saluran darah anda mengendur dan meluas.

- Ini membantu untuk menurunkan tekanan darah anda
- Jika anda mempunyai kegagalan jantung yang kronik, ini akan memudahkan jantung anda mengepam darah ke seluruh badan anda
- Jika anda mempunyai angina, ini akan membantu menghentikan sakit dada.

Doktor anda mungkin memberi anda ubat-ubatan lain serta **Caslot Tablest** untuk membantu merawat keadaan anda.

Sebelum mengambil **Caslot Tablets**

Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil **Caslot Tablets** jika:

- Anda alah (hipersensitif) dengan carvedilol atau mana-mana bahan-bahan lain **Caslot Tablets** (disenaraikan dalam bahagian maklumat lanjut).
- Anda telah pernah berdehit disebabkan oleh asma atau penyakit paru-paru yang lain.
- Anda mempunyai pembendungan cecair yang teruk (bengkak tangan, buku lali dan kaki) yang sedang dirawat dengan ubat-ubatan yang diberi ke dalam salah satu urat anda (secara intravena).
- Anda mempunyai masalah dengan hati anda.
- Anda mempunyai masalah dengan jantung anda (contohnya, 'sekatan jantung' atau denyutan jantung yang perlahan). **Caslot Tablets** tidak sesuai untuk sesetengah orang dengan masalah jantung yang tertentu.
- Anda mempunyai tekanan darah yang sangat rendah.

Jika anda tidak pasti sama ada anda perlu mula mengambil ubat ini berbincanglah dengan doktor anda.

Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai alahan dengan mana-mana ubat-ubatan lain, makanan, bahan pengawet atau pewarna.

Beritahu doktor anda jika anda ada atau pernah ada mana-mana keadaan perubatan yang berikut:

- Masalah dengan buah pinggang anda
- Anda mempunyai penyakit kencing manis
- Anda memakai kanta lekap
- Anda mempunyai masalah jantung, denyutan jantung yang perlahan
- Anda mempunyai masalah dengan saluran darah anda (penyakit vaskular periferai)
- Anda pernah mempunyai masalah dengan tiroid anda
- Anda pernah mempunyai tindak balas alahan yang serius (contohnya, bengkak secara tiba-tiba, menyebabkan kesukaran bernafas atau menelan, bengkak tangan, kaki dan buku lali atau ruam yang teruk)

- Anda mempunyai alahan dan sedang mendapat rawatan untuk mengurangkan kepekaan anda.
- Anda mempunyai masalah dengan peredaran darah di jari dan jari kaki anda ('fenomena *Raynaud*')
- Anda mempunyai penyakit kulit yang dipanggil 'psoriasis', selepas mengambil ubat *beta-blocker*
- Anda mempunyai jenis angina dipanggil 'angina varian Prinzmetal'
- Anda mempunyai masalah pernafasan seperti bronkitis, asma,
- Anda mempunyai ketumbuhan yang jarang berlaku di kelenjar adrenal ('*phaeochromocytoma*'). Ia menyebabkan pelepasan bahan kimia dengan banyak seperti *epinephrine* dan *norepinephrine* yang mengawal kadar jantung, metabolisme, dan tekanan darah
- Anda merancang untuk menjalani pembedahan. Beritahu doktor bahawa anda mengambil **Caslot Tablets**. Ini adalah kerana beberapa anestetik boleh menurunkan tekanan darah anda dan ia boleh menjadi terlalu rendah.
- Anda dijadualkan untuk pembedahan katarak dan telah mengambil atau sedang mengambil **Caslot Tablets**. Ini boleh menyebabkan penyakit yang dipanggil sindrom iris *Intraoperative floppy*. Ini dicirikan oleh pengembangan anak mata (*pupil*) yang lemah, sebelum pembedahan dan semasa pembedahan, *iris billowing/kepuh* dan *floppiness*, penyempitan progresif anak mata (miosis) semasa pembedahan.

Kehamilan

Beritahu doktor anda jika anda hamil atau merancang untuk hamil.

Ia tidak diketahui sama ada **Caslot Tablets** adalah merbahaya kepada bayi yang belum lahir apabila diambil oleh wanita hamil. Doktor anda akan membincangkan risiko dan manfaat menggunakan **Caslot Tablet** semasa kehamilan anda. Jangan mengambil **Caslot Tablet**, melainkan jika doktor anda memberitahu anda.

Penyusunan

Jangan mengambil ubat ini jika anda sedang menyusukan bayi. Jangan mengambil **Caslot Tablets**, melainkan jika doktor anda memberitahu anda.

Maklumat penting tentang beberapa bahan-bahan:

Ubat ini mengandungi laktosa dan sukrosa, yang merupakan sejenis gula. Jika anda telah diberitahu oleh doktor anda bahawa anda tidak bertoleransi atau mencerna beberapa gula (anda tidak toleransi kepada beberapa gula), berbincang dengan doktor anda sebelum mengambil ubat ini.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil mana-mana ubat-ubatan lain, termasuk apa-apa yang anda mendapat tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Secara khususnya, beritahu doktor anda atau ahli farmasi jika anda mengambil mana-mana ubat-ubatan berikut:

- Ubat-ubatan lain untuk jantung atau tekanan darah anda, termasuk pil air (diuretik), 'penghalang saluran kalsium' (contohnya *diltiazem* atau *verapamil*), *digoxin* dan *amiodarone*
- Ejen pengurang *catecholamine* (sejenis bahan kimia dalam badan), contohnya *reserpine* dan perencat *monoamine oxidase*, yang digunakan untuk merawat kemurungan.
- *Fluoxetine* (digunakan untuk merawat kemurungan)
- Ubat untuk kencing manis seperti insulin atau ubat antidiabetik oral
- *Clonidine* (digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi, migrain dan sensasi kehangatan semasa putus haid)
- *Rifampicin* (digunakan untuk merawat jangkitan)
- *Cyclosporin* (digunakan selepas pemindahan organ)
- Ubat anti-radang bukan steroid, sebagai contoh *aspirin*, *Indomethacin* dan *ibuprofen*
- *Beta-agonist* bronkodilator (digunakan untuk merawat sesak dada dan berdehit disebabkan asma atau keadaan dada yang lain (sebagai contoh salbutamol dan terbutaline sulfat))

- Ubat-ubatan lain yang boleh membantu menurunkan tekanan darah anda
- Ejen pembiusan .

Cara menggunakan Caslot Tablets
Berapa banyak harus digunakan
Ikut semua arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti.

Kegagalan jantung kronik: Apabila digunakan untuk kegagalan jantung, rawatan dengan Caslot Tablets harus dimulakan oleh doktor pakar.

- Dos permulaan yang biasa adalah satu 3.125 mg tablet dua kali sehari selama dua minggu
- Doktor anda akan meningkatkan dos perlahan-lahan, selama beberapa minggu, sehingga 25 mg dua kali sehari
- Jika berat badan anda lebih daripada 85 kg dos boleh dinaikkan sehingga 50 mg dua kali sehari
- Jika anda telah berhenti mengambil Caslot Tablets selama lebih daripada satu minggu, anda perlu berbincang dengan doktor anda. Mereka akan memerlukan anda untuk kembali ke dos permulaan sekali lagi.

Tekanan darah tinggi:

- Dos permulaan yang biasa ialah 12.5 mg sekali sehari selama dua hari
- Selepas dua hari dos biasanya 25 mg, sekali sehari.
- Jika tekanan darah anda tidak berada di bawah kawalan, doktor anda boleh meningkatkan dos anda secara perlahan-lahan, setiap dua minggu sehingga 50 mg sehari atau dua dos yang dibahagikan.

Angina:

- Dos permulaan yang biasa ialah 12.5 mg dua kali sehari selama dua hari.
- Selepas dua hari dos biasanya 25 mg dua kali sehari. Jika perlu, doktor anda boleh meningkatkan dos selepas sekurang-kurangnya 2 minggu kepada maksimum 100 mg setiap hari dalam dua dos yang dibahagikan.

Pesakit dengan masalah hati Anda tidak sepatutnya mengambil **Caslot Tablets** jika anda mempunyai masalah hati.

Kanak-kanak

Caslot Tablets tidak harus diberikan kepada kanak-kanak (di bawah umur 18 tahun).

Bila perlu digunakan

Anda perlu mengambil tablet anda pada masa yang sama.

Telan tablet dengan minum segelas air. **Caslot Tablets** harus diambil dengan makanan.

Berapa lama perlu digunakan

Jangan berhenti mengambil ubat ini tanpa berbincang dengan doktor anda. Mereka mungkin mahukan anda berhenti mengambil **Caslot Tablets** perlahan-lahan dalam masa 1 hingga 2 minggu.

Jika terlupa menggunakan

- Jika anda terlupa untuk mengambil dos, ambil secepat anda ingat. Walau bagaimanapun, jika ianya hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang terlepas.
- Jangan ambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda fikir anda atau sesiapa sahaja yang mungkin telah ambil terlalu banyak **Caslot Tablets**, segera menelefon doktor anda atau pergi ke Unit Kemalangan dan Kecemasan di hospital terdekat anda. Lakukan ini walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Jika anda tidak pasti apa yang perlu dilakukan, hubungi doktor anda atau ahli farmasi. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan yang segera.

Berikut adalah beberapa gejala yang mungkin atau tidak mungkin berlaku.

- tekanan darah rendah, menyebabkan pening atau pingsan
- kadar jantung yang sangat perlahan
- kegagalan jantung
- kesukaran bernafas
- muntah
- kejutan
- kesedaran terganggu
- sawan.

Semasa menggunakan Caslot Tablets.

Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Caslot Tablet. Anda juga perlu memberitahu pakar bedah dan pakar bius anda jika anda akan menjalani pembedahan. Beritahu doktor anda jika anda menjadi

hamil atau sedang menyusui bayi semasa mengambil Caslot Tablet. Beritahu doktor anda jika anda atas apa-apa sebab tidak mengambil ubat anda seperti yang ditetapkan.

Doktor anda boleh memeriksa mata anda dan menguji glukosa darah anda dan fungsi buah pinggang dari masa ke semasa.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil Caslot Tablets atau menukar dos tanpa terlebih dahulu menyemak dengan doktor anda.

Caslot Tablets hanya hendaklah dihentikan dengan mengurangkan jumlah secara beransur-ansur sepanjang tempoh dua minggu.

Jangan memberikan Caslot Tablets kepada orang lain walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati semasa memandu atau mengendalikan jentera sehingga anda tahu bagaimana Caslot Tablet memberi kesan kepada anda.

Caslot Tablets boleh menjejaskan keupayaan anda untuk memandu kereta atau mengendalikan jentera apabila anda bermula mengambilnya atau apabila dos dinaikkan atau dalam kombinasi dengan alkohol.

Jika anda memakai kanta lekap anda juga boleh perasan pengurangan dalam jumlah cecair air mata dalam mata anda.

Kesan-kesan Sampingan

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda secepat mungkin jika anda berasa tidak sihat semasa anda mengambil Caslot Tablets.

Caslot Tablets boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mendapatnya. Jangan terkejut dengan senarai kesan sampingan berikut. Anda mungkin tidak akan mengalami mana-mana daripadanya.

Jika mana-mana yang berikut berlaku, beritahu doktor anda dengan segera, atau pergi ke Unit

Kemalangan dan Kecemasan di hospital terdekat:

- Berdehit secara tiba-tiba, bengkak bibir, lidah dan tekak atau badan, ruam, pengsan atau kesukaran menelan (tindak balas hipersensitiviti)
- Lepuh atau pengelupasan. Boleh terjadi juga lepuh teruk dan pendarahan di bibir, mata, mulut, hidung dan kemaluan. Ini mungkin sindrom *Stevens-Johnson*, *erythema multiforme* atau nekrolisis epidermis toksik

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda perasan mana-mana yang berikut:

- Keletihan, sakit kepala, sesak nafas apabila bersenam, pening dan nampak pucat (anemia)
- Pendarahan atau lebam lebih mudah daripada biasa (*thrombocytopenia*, *Purpura*)
- Jangkitan kerap seperti demam, menggigil yang teruk, sakit tekak atau ulser mulut (leukopenia)
- Berpeluh, kelemahan, kelaparan, pening, menggeletar, sakit kepala, kemerahan atau pucat, kebas, mempunyai denyutan jantung yang cepat, berdebar-debar (hipoglisemia)
- Membuang jumlah besar air kencing, kedahagaan yang berlebihan dan mempunyai mulut dan kulit kering (hiperglisemia)

Caslot Tablets juga boleh menyebabkan perkembangan tanda penyakit kencing manis pada orang yang mempunyai *latent diabetes* (sejenis kencing manis).

- Kemurungan
- Pembendungan cecair. Tanda-tanda termasuk: bengkak keseluruhan badan anda, bengkak bahagian badan anda contohnya tangan, tapak kaki, buku lali, kaki dan paru-paru dan peningkatan dalam jumlah darah yang ada di dalam badan anda
- Kegagalan jantung
- Sekatan jantung, penurunan bekalan darah ke jantung dicirikan oleh sakit dada (iskemia miokardial)
- Masalah dengan peredaran darah di tangan dan kaki anda. Tanda-tanda termasuk sejuk di tangan dan kaki, keputihan, kesemutan dan sakit di jari anda dan sakit di kaki anda yang menjadi lebih teruk apabila anda berjalan

- Kegagalan buah pinggang, perubahan kekerapan membuang air
- Sesetengah wanita mungkin mempunyai masalah dengan kawalan kencing apabila mereka membuang air (inkontinens urinari). Ini biasanya akan pulih apabila rawatan dihentikan
- Isipadu darah rendah menyebabkan tekanan darah sangat rendah
- Strok
- Sawan
- Sakit teruk seperti menikam atau berdenyut sepanjang satu atau lebih saraf (neuralgia)
- Muntah darah atau bahan yang kelihatan seperti serbuk kopi, cirit-birit berdarah (pendarahan gastrousus)
- Batuk, kesukaran bernafas, berdehit (pneumonitis interstitium)

Senarai di atas termasuk kesan sampingan serius yang mungkin memerlukan perhatian perubatan.

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda perasan mana-mana yang berikut dan mereka membimbangkan anda:

- Jangkitan saluran pernafasan (bronkitis), paru-paru (pneumonia), hidung dan tekak (saluran pernafasan atas). Tanda-tanda termasuk berdehit, sesak nafas, sesak dada dan sakit tekak.
- Penambahan berat badan atau kehilangan berat badan
- Tekanan perasaan
- Masalah tidur
- Pening, sakit kepala, pengsan, keletihan
- Sakit
- Rasa pitam, kelemahan otot, dan rasa seperti pengsan (*presyncope*)
- Rasa kesemutan
- Kemerosotan visual, kering mata, air mata berkurangan
- Sakit dada (angina)
- Tekanan darah menurun, pening semasa berdiri, terutamanya apabila bangun dari posisi duduk atau berbaring
- Kesukaran bernafas (dispnea) dan masalah pernafasan yang lain
- Hidung tersumbat, berdehit dan simptom-simptom seperti selesema
- Rasa sakit (loya), menjadi sakit (muntah), cirit-birit, senak, sakit perut, sembelit
- Kering mulut

- Masalah dengan kulit anda, termasuk ruam kulit yang boleh meliputi sebahagian besar badan anda, ruam berketul - ketul (gatal-gatal), rasa gatal dan tompok kering pada kulit
- Kehilangan rambut
- Berpeluh berlebihan
- Sakit di kaki dan tangan
- Tidak mampu untuk mendapatkan ereksi (*erectile dysfunction*), berkurangan dorongan seks
- Sakit sendi, radang sendi
- Batuk
- Demam
- Berdebar-debar
- Tekanan darah tinggi
- Kurang perasaan atau sensitiviti, terutama di kulit (*hypesthesia*)
- Sensasi berputar
- Najis warna hitam
- Nafas berbau, gusi yang kelihatan berwarna merah terang atau merah-ungu, gusi yang mudah berdarah (darah di berus gigi walaupun memberus gigi dengan lembut), gigi longgar, gusi bengkak (*periodontitis*)
- Kekejangan otot, kekuatan otot yang rendah
- Denyutan jantung perlahan atau pantas
- Pergerakan badan yang perlahan (*hypokinesia*)
- Gemuruh, gangguan tumpuan, pemikiran yang tidak normal
- Mimpi yang menakutkan, beremosi
- Nada dering dalam telinga, pendengaran menurun
- Pening, rasa pitam, kebas tangan dan kaki (keadaan yang ditandai oleh tahap rendah karbon dioksida yang dikenali sebagai alkalosis pernafasan)
- Peningkatan kekerapan buang air kencing
- Migrain
- Kelemahan dalam pergerakan sukarela
- Penyakit dengan sendi yang sakit dan bengkak disebabkan oleh kristal asid urik (gout)
- Kehilangan daya ingatan

Keabnormalan makmal

- Jumlah sel-sel darah (merah & sel-sel darah putih dan platelet) yang rendah
- Sejenis keabnormalan sel-sel darah putih

- Peningkatan kolesterol darah dan paras trigliserida dan HDL (sejenis lemak) berkurangan
- Tahap glukosa darah yang tinggi atau rendah
- Peningkatan dalam ALT, AST, GGT dan tahap alkali phosphatise (menunjukkan masalah dengan hati anda)
- Peningkatan dalam nitrogen urea darah dan nitrogen bukan protein
- Meningkatkan tahap asid urik dalam darah
- Tahap nitrogen yang rendah dalam darah
- Pertambahan atau pengurangan tahap kalium dalam darah
- Peningkatan dalam tahap kreatinin dalam darah
- Kehadiran glukosa dalam air kencing (menunjukkan tahap glukosa dalam darah yang tinggi)
- Penurunan prothrombin (penunjuk masa pembekuan darah)
- Kehadiran protein (albumin) dalam air kencing
- Darah dalam air kencing
- Kehadiran bilirubin yang berlebihan dalam darah

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (*Consumer*→*Reporting*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Caslot Tablets

Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30 ° C, dilindungi daripada kelembapan

Pelupusan

Kembali mana-mana ubat yang tidak digunakan atau tamat tempoh kepada doktor anda, ahli farmasi atau pakar penjagaan kesihatan untuk pelupusan selamat.

Maklumat Lanjut

Rupa dan warna Caslot Tablets

Caslot Tablets 6.25 mg:

Berwarna kuning, bulat dwi cembung, tablet *mottled* (tompok warna) tidak bersalut dengan garisan skor di satu sisi dan tidak bertanda di sisi yang lain.

Caslot Tablets 12.5 mg:

Berwarna pic , bulat, dwi cembung, tablet *mottled* (tompok warna) tidak bersalut dengan garisan skor di satu sisi dan tidak bertanda di sisi yang lain.

Caslot Tablets 25 mg:

Warna putih hingga kekuningan , bulat,dwi cembung, tablet *mottled* (tompok warna) tidak bersalut dengan garisan skor di satu sisi dan tidak bertanda di sisi yang lain.

Bahan-bahan kandungan

Bahan Aktif:

Carvedilol 6.25 mg, 12.5 mg dan 25 mg

Bahan-bahan Tidak Aktif:

Lactose Monohydrate, Crospovidone, Colloidal Silicon Dioxide, Povidone K 30, Sucrose, Purified Water, Magnesium Stearate (veg), Ferric Oxide (Yellow), Ferric Oxide (Red)

Nombor MAL:

Caslot Tablets 6.25 mg :

MAL06021195A

Caslot Tablets 12.5 mg :

MAL06021196A

Caslot Tablets 25.0 mg :

MAL05090004A

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

RANBAXY (MALAYSIA) SDN.BHD
Lot 23 Bakar Arang Industrial Estate,
08000 Sungai Petani, Kedah
Malaysia

Tarikh Kemaskini RiMUP:

06/04/2015

Serial No.:

BPFK(R4/1)080115/00004