

Apakah yang ada dalam risalah ini

- 1 Apakah kegunaan Saranto
- 2 Bagaimana Saranto berfungsi
- 3 Sebelum mengambil Saranto
- 4 Cara menggunakan Saranto
- 5 Semasa menggunakan Saranto
- 6 Kesan-kesan Sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Saranto

- Hipertensi (Tekanan Darah Tinggi).
- Tekanan Darah Tinggi pesakit dengan hipertrofi ventrikular Kiri (pembesaran ventrikel kiri jantung).
Indikasi Losartan kalium ialah untuk mengurangkan risiko strok di kalangan pesakit dengan hipertensi (tekanan darah tinggi) dan hipertrofi ventrikular kiri (Pembesaran ventrikel kiri jantung)

- Nephropathy dalam Pesakit Diabetes Jenis 2
Losartan Kalium juga boleh digunakan untuk merawat keadaan lain, sebagai contoh, kegagalan jantung dan penyakit buah pinggang pada pesakit kencing manis dengan tekanan darah tinggi

Bagaimana Saranto berfungsi

Saranto adalah kumpulan ubat yang dikenali sebagai menentang reseptor angiotensin II. Angiotensin-II adalah bahan yang dihasilkan dalam badan yang mengikat pada reseptor dalam saluran darah, menyebabkan mereka untuk mengetatkan. Ini menyebabkan peningkatan dalam tekanan darah. Saranto menghalang mengikat angiotensin II reseptor ini, menyebabkan saluran darah

untuk berehat yang seterusnya merendahkan tekanan darah. Saranto melambatkan penurunan fungsi buah pinggang dalam pesakit dengan tekanan darah tinggi dan diabetes jenis 2.

Sebelum anda mengambil Saranto

➤ *Bila tidak boleh mengambil*

- Jika anda alergi (hipersensitif) kepada losartan atau mana-mana bahan-bahan lain,
- Jika anda hamil.

➤ *Sebelum mula mengambil*

Adalah penting untuk memberitahu doktor anda sebelum mengambil Saranto jika: -

- Anda mempunyai sejarah angioedema (bengkak muka, bibir, tekak, mulut atau lidah) kerana anda mungkin akan lebih cenderung untuk mengalami reaksi alergi.
- Sekiranya anda (atau mungkin) mengandung. Saranto tidak disyorkan pada awal kehamilan, dan tidak boleh diambil jika anda adalah lebih daripada 3 bulan mengandung, kerana ia boleh menyebabkan kesan serius
- Anda mengalami muntah-muntah atau cirit-birit berlebihan membawa kepada kekurangan cecair dan / atau garam dalam badan anda
- anda mengambil diuretik (ubat-ubatan yang meningkatkan pengeluaran air kencing

- atau diet garam yang terhad anda diketahui mempunyai penyempitan atau penyumbatan saluran darah buah pinggang anda atau jika anda telah menerima pemindahan buah pinggang baru-baru ini
- Jika anda mempunyai sejarah masalah hati, dos yang lebih rendah perlu dipertimbangkan

➤ *Jika Mengambil ubat-ubatan lain*

Anda harus mengambil perhatian khusus dan beritahu doktor jika anda mengambil ubat-ubatan lain semasa anda mengambil Saranto:

- khususnya ubat-ubatan lain yang blok angiotensin II atau kesan-kesannya, penggunaan ubat diuretik jenis '*potassium-sparing*' (contohnya, spironolactone, triamterene, amiloride), tambahan kalium, atau yang mengandungi pengganti garam kalium boleh membawa kepada peningkatan garam kalium dalam darah
- Ubat anti-inflamasi bukan steroid (NSAID) termasuk cyclooxygenase-2 inhibitor terpilih (COX-2 inhibitor) boleh mengurangkan kesan ubat diuretik dan ubat antihipertensi lain. Dalam sesetengah pesakit dengan fungsi buah pinggang yang terjejas yang dirawat dengan ubat anti-inflamasi bukan steroid, termasuk cyclooxygenase-2 terpilih inhibitor, bersama-pentadbiran yang menentang reseptor angiotensin II boleh menyebabkan kemerosotan

lagi fungsi renal. Kesan-kesan ini biasanya berbalik.

- Ubat yang mengandungi Litium yang tidak boleh diambil dalam kombinasi dengan losartan tanpa pengawasan rapi oleh doktor anda. Langkah pencegahan khas (contohnya ujian darah) mungkin sesuai.

Cara menggunakan Saranto

➤ *Berapa banyak perlu digunakan*

Saranto boleh diambil dengan ubat-ubat antihipertensi yang lain.

Hipertensi

Pemulaan biasa dan dos penyelenggaraan ialah 50 mg sekali sehari untuk kebanyakan pesakit dan kesan antihipertensi maksimal mencapai 3-6 minggu selepas memulakan terapi. Sesetengah pesakit mungkin menerima manfaat tambahan dengan meningkatkan dos kepada 100 mg sekali sehari.

Tiada pelarasan dos awal adalah perlu untuk pesakit warga tua atau pesakit dengan fungsi buah pinggang yang lemah, termasuk pesakit dialisis. Dos yang lebih rendah patut dipertimbangkan bagi pesakit yang mempunyai sejarah kemerosotan fungsi hati.

Pesakit hipertensi dengan hipertrofi ventrikular kiri (Pembesaran Ventrikel Kiri jantung)

Dos permulaan biasa ialah 50 mg sekali sehari. Doktor anda akan melaraskan dos dan ubat anda berdasarkan respons tekanan darah anda.

Nefropati (Kemunculan aras rendah tetapi luar biasa albumin dalam air kencing) dalam Jenis 2 Pesakit kencing manis

Dos permulaan biasa ialah 50 mg sekali sehari. Doktor anda akan melaraskan dos dan ubat anda berdasarkan respons tekanan darah anda

➤ *Bila perlu digunakan*

Saranto boleh diambil dengan atau tanpa makanan.

➤ *Berapa lama perlu digunakan*

Ia adalah penting untuk terus mengambil Saranto selama yang di syorkan doktor anda menetapkan untuk mengekalkan kawalan lancar tekanan darah anda.

➤ *Jika terlupa menggunakan*

Jika anda secara tidak sengaja terlepas dos harian, anda hanya perlu mengambil dos seterusnya seperti biasa. Jangan mengambil dos berganda menggantikan dos yang anda lupa.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut mengenai penggunaan produk ini, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

➤ *Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*

Jika anda secara tidak sengaja mengambil terlalu banyak pil, hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke jabatan kecemasan hospital terdekat. Gejala akibat dos berlebihan adalah tekanan darah rendah dan perubahan dalam denyutan jantung (degupan jantung meningkat atau degupan

jantung yang mungkin menurun).

Semasa anda menggunakan Saranto

➤ *Perkara yang perlu dilakukan*

Sentiasa mengambil Saranto tepat seperti yang doktor anda telah memberitahu anda. Doktor anda akan menentukan dos yang betul, bergantung kepada keadaan anda dan sama ada anda mengambil ubat-ubatan lain.

Ia adalah penting untuk terus mengambil Saranto selama yang di syorkan oleh doktor anda menetapkan untuk mengekalkan kawalan lancar tekanan darah anda

➤ *Perkara yang tidak boleh dilakukan*

Jangan gunakan Saranto selepas tarikh tamat tempoh yang dinyatakan di atas karton selepas EXP. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut.

➤ *Perkara yang perlu anda berhati-hati*

Jangan mengambil Saranto jika:

- Anda pernah mengalami angioedema (bengkak muka, bibir, tekak, mulut dan / atau lidah) kerana anda mungkin lebih cenderung untuk mengalami reaksi alahan
- Anda berfikir anda (atau mungkin menjadi) mengandung. Saranto tidak digalakkan pada awal kehamilan, dan tidak harus diambil jika anda lebih daripada 3 bulan hamil, kerana ia boleh menyebabkan kemudaratan yang serius kepada bayi

anda jika digunakan pada peringkat itu.

- anda mengalami muntah-muntah atau cirit-birit keterlaluan menyebabkan kehilangan cecair dan / atau garam yang banyak dalam badan anda
- Anda mengambil diuretik atau berada di diet terhad garam
- anda adalah diketahui mempunyai penyempitan atau penyumbatan saluran darah menuju ke buah pinggang anda atau jika anda telah menerima transplantasi buah pinggang baru-baru ini
- fungsi hati terjejas
- Anda mengalami kegagalan jantung dengan atau tanpa masalah buah pinggang atau mempunyai gangguan serius dalam irama jantung anda. Langkah khusus diperlukan jika anda dirawat dengan beta-blocker serentak
- anda mempunyai masalah dengan injap jantung atau otot jantung
- anda mengalami penyakit jantung koronari (disebabkan oleh aliran darah yang lebih rendah dalam saluran darah jantung) atau dari penyakit serebrovaskular (yang disebabkan oleh peredaran darah yang berkurangan di dalam otak),
- Anda mengalami hyperaldosteronism utama (keadaan yang dikaitkan dengan peningkatan sekresi aldosterone hormon oleh kelenjar adrenal)

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Saranto boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapat kesan sampingan. Jika anda mengalami kesan sampingan berikut yang serius, **berhenti mengambil Saranto tablets, dan beritahu doktor anda dengan segera atau pergi ke hospital terdekat. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera atau penghospitalan**

- Reaksi alahan yang teruk (ruam, gatal-gatal, bengkak muka, bibir, mulut dan tekak yang boleh menyebabkan kesukaran menelan atau bernafas),
- sakit dada yang teruk (angina pektoris),
- degupan jantung yang sangat cepat dan tidak teratur (fibrilasi atrium),
- strok.

Kesan sampingan yang lain

Jika anda mengalami apa-apa kesan sampingan yang berikut, atau jika anda mendapati apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Kesan sampingan yang biasa:

- Pening atau rasa berputar
- Tekanan darah rendah
- Lemah
- keletihan (kelesuan)
- Gula darah rendah (hipoglisemia),

- tahap kalium yang tinggi dalam darah (hyperkalaemia).

Jika anda mengalami apa-apa kesan sampingan di atas, atau jika anda dapati kesan sampingan tidak disenaraikan di atas, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel : 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (Consumer →Reporting)

Cara penyimpanan dan pelupusan Saranto

Penyimpanan

Simpan di tempat yang kering di bawah 30 ° C. Jauhkan dari jangkauan dan penglihatan kanak-kanak. Jangan gunakan Saranto selepas tarikh tamat tempoh yang dinyatakan di atas karton selepas EXP. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut. Produk ubat-ubatan ini tidak memerlukan apa-apa syarat simpanan khas.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak boleh dibuang melalui air sisa atau sampah rumah. Tanya ahli farmasi anda cara untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan. Langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

Rupa dan warna produk

Saranto 50 mg tablet bersalut filem: Putih, berbentuk bujur dua tablet bersalut filem debossed dengan 'E' di satu pihak dan '4' dan '6'

SARANTO 50

Losartan Potassium Tablet 50mg

Risalah Maklumat Ubat untuk Pengguna (RiMUP)

dipisahkan oleh scoreline di
sebelah lain.

Bahan Bahan Kandungan

- *Bahan Aktif :*
bahan aktif adalah Losartan kalium.
Setiap tablet yang bersalut filem mengandungi 50 mg Losartan kalium.
- *Bahan tidak aktif:*
bahan-bahan lain adalah microcrystalline selulosa, monohidrat laktosa, kanji pregelatinised (jagung), selulosa hydroxypropyl, stearat magnesium, air tulen dan Opadry Putih.

Nombor MAL : MAL12085064A

Pengilang

Aurobindo Pharma Limited, Unit-III,
Ukur No. 313, Bachupally
kampung,
Quthbullapur Mandal, Ranga
Reddy Daerah,
Andhra Pradesh, INDIA.

Pemegang Pendaftaran Produk

Healol Pharmaceuticals Sdn Bhd
74-3, Jalan 1/27F, KLSC Wangsa
Maju,
53300 Kuala Lumpur.

Tarikh kemaskini RiMUP

28/05/2013