

TANATRIL® 5

Imidapril Hydrochloride 5 mg

Apa kandungan risalah ini

Risalah ini mengandungi jawapan untuk sesetengah persoalan biasa ditanya tentang TANATRIL® 5. Bagaimanapun ia tidak mengandungi semua maklumat tentang TANATRIL® 5.

Ia tidak boleh mengambil alih tugas doktor atau ahli farmasi anda.

Setiap ubat mempunyai risiko dan manfaatnya sendiri. Doktor anda akan menentukan risiko yang ada di sebalik manfaatnya dalam penggunaan TANATRIL® 5.

Sekiranya anda mempunyai sebarang keraguan mengenai pengambilan ubat ini, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

Sila simpan risalah ini bersama-sama dengan ubat ini.

Anda mungkin perlu membacanya semula.

Apa kegunaan ubat ini

TANATRIL® 5 digunakan untuk merawat hipertensi iaitu tekanan darah tinggi.

Bagaimana ubat ini berfungsi

TANATRIL® 5 mengandungi hydrochloride imidapril yang tergolong dalam kelas ubat yang dipanggil perencat enzim penukar angiotensin (ACE). ACE merupakan enzim di dalam badan yang diperlukan untuk pembentukan bahan kimia yang dipanggil angiotensin II. Angiotensin II mengakibatkan penyempitan arteri, seterusnya meningkatkan tekanan darah. Perencat ACE mencegah pembentukan angiotensin II, oleh itu ia meluaskan saluran darah dan membantu menurunkan tekanan darah. TANATRIL® 5

boleh digunakan secara individu atau bersama-sama dengan ubat-ubatan lain untuk mengurangkan tekanan darah.

Sebelum penggunaan

Jangan mengambil ubat ini jika anda:

- Mempunyai atau pernah mengalami reaksi alergi
- Bengkak di bawah permukaan kulit, biasanya berlaku di sekeliling mata dan bibir.
- Menjalani haemodialisis.
- Mengandung atau mungkin mengandung.

Sebelum anda mula mengambil ubat ini, pastikan doktor anda tahu jika anda mempunyai apa-apa masalah jantung, masalah buah pinggang, strok dan iskemia (sekitan bekalan darah ke otak).

Beritahu kepada doktor jika anda mengambil ubat-ubatan lain, termasuk yang sedia ada dibeli tanpa preskripsi, ubat-ubatan herba atau complimentary.

Bagaimana untuk ambil

- Ambil TANATRIL® 5 betul-betul seperti yang diarahkan oleh doktor anda.
- Keluarkan ubat dari bekas (lapisan PTP) sebelum menggunakan.
- Ubat ini perlu ditelan secara keseluruhan dengan minum air. Ini bermakna anda tidak perlu menghancur atau mengunyah tablet ini.
- Ubat ini biasanya diambil sebiji sehari. Cuba mengambil ubat ini pada tempoh masa yang sama setiap kali supaya tidak berlakunya kelepasan mana-mana dos.
- Jika anda terlupa mengambil dos, ambil seberapa segera

bila anda teringat balik. Kemudian mengambilnya seperti biasa. Jika bila anda teringat, ia sudah hampir masa untuk dos seterusnya, terus ambil dos seterusnya mengikut jadual masa yang ditetapkan tanpa menghirau dos yang terlepas. Jangan mengambil kedua-dua dos sekali sebagai gantian kepada dos terlepas.

- Jika anda mengesyaki anda atau orang lain terlebih mengambil ubat ini, berhenti mengambil ubat ini dan hubungi doktor anda atau pergi ke hospital serta membawa bersama ubat atau bekas ubat yang kosong.

Dalam masa penggunaan

- Pastikan anda hadiri temu janji tetap dengan doktor supaya kemajuan anda boleh dipantau, terutamanya apabila anda menjalani terapi diuretik dan diet sekatan garam ketat.
- Rawatan dengan ubat ini biasanya meliputi sepanjang hayat.
- Berhati-hati dalam menjalankan aktiviti-aktiviti yang memerlukan kewaspadaan seperti memandu kereta, bekerja di tempat tinggi atau mengendalikan jentera.
- Ubat ini tidak sesuai digunakan dalam masa 24 jam sebelum menjalani pembedahan.
- Ubat ini tidak sesuai untuk ibu-ibu menyusu, jika perlu, penyusuan harus dielakkan.
- Jika anda membeli mana-mana ubat, periksa dengan ahli farmasi bahawa mereka selamat untuk digambil bersama dengan TANATRIL® 5.

- Ubat ini adalah untuk anda. Jangan sekali-kali memberinya kepada orang lain walaupun keadaan mereka kelihatan seperti anda.

kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di sini mungkin akan juga berlaku. Semak dengan doktor atau ahli farmasi jika anda terdapat sindrom yang membimbangkan.

Kesan sampingan

Bersama-sama dengan manfaatnya, walaupun tidak semua orang akan mengalaminya, semua ubat terdapat kesan sampingan yang tidak diingini. Biasanya kesan-kesan sampingan akan bertambah baik apabila badan anda mula menyesuaikan diri dengan ubat baru ini, beritahu kepada doktor atau ahli farmasi anda jika terdapat apa-apa kesan sampingan yang berikut berlarutan atau bertukar menjadi bermasalah:

- Batuk, pharynx sensasi aneh dan ketidakselesaan.
- Pening
- Hypotension (tekanan darah rendah)
- Sakit kepala, ringan kepala
- Ruam, pruritus

Dalam kes-kes yang jarang berlaku, tanda-tanda yang digambarkan di bawah boleh menjadi gejala kesan sampingan seperti mana yang ditunjukkan dalam kurungan []. Jika ia berlaku, berhenti mengambil ubat ini dan periksa dengan doktor anda dengan segera.

- Tidak dapat bernafas dengan lancar, bengkak di bahagian muka / lidah / tekak, gatal-gatal [Angioedema]
- Pendarahan dari hidung atau gusi, lebam-lebam di anggota badan [thrombocytopenia]
- Jumlah air kencing berkurangan, muka / anggota badan bengkak, pudar [kegagalan buah pinggang serious, kemerosotan fungsi buah pinggang yang teruk]
- Demam, penyebaran kemerahan kulit yang meluas, mata merah, sakit bibir [Erythroderma (Exfoliative dermatitis), Oculo-muco-kulit, sindrom (sindrom Stevens Johnson), gejala semacam Pemphigus]

Selepas menggunakan ubat ini

- Jauhkan semua perubatan dari jangkauan dan penglihatan kanak-kanak.
- Simpan ubat di bawah 30° C, elakkan perlembapan selepas membukannya.
- Jangan sekali-kali menyimpan ubatan yang telah lulus tarikh penggunaan atau ubat yang tidak diingini. Bawa mereka ke farmasi tempatan untuk dilupuskan

Perihal Produk

Bagaiman rupanya?

TANATRIL®5 merupakan tablet putih

Saiz pek yang didaftarkan:
Kotak 30 tablet (10 tablet x 3)
dalam blister
Kotak 100 tablet (10 tablet x 10)
dalam blister

Bahan-bahan:
Imidapril hydrochloride, Lactose 200 mesh, Macrogol 6000,
Magnesium Stearate

MAL.NO. MAL20034617A

Pengilang

PT. Tanabe Indonesia
Jalan Rumah Sakit No. 104,
Ujungberung, Bandung 40612,
Indonesia

Pemegang Hak Pemasaran

Pharmaforte (M) Sdn Bhd
2, Jalan PJU 3/49
Sunway Damansara
47810 Petaling Jaya

Tarikh Semakan

1 Jun 2011