

ROSUCOR TABLET

Rosuvastatin Calcium (20mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Rosucor 20
2. Bagaimana Rosucor 20 berfungsi
3. Sebelum menggunakan Rosucor 20
4. Cara menggunakan Rosucor 20
5. Semasa menggunakan Rosucor 20
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Rosucor 20
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Rosucor 20

Rosucor digunakan untuk menurunkan paras kolesterol tinggi dalam darah di mana pengawalan diet dan bersenam tidak cukup untuk membetulkan tahap kolesterol anda.

Bagaimana Rosucor 20 berfungsi

Rosucor mengandungi rosuvastatin sebagai bahan aktif.

Rosuvastatin tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai statin.

Ia berfungsi dengan membantu menyekat penghasilan kolesterol 'tidak baik' dalam hati anda. Ia juga meningkatkan keupayaan badan anda untuk mengeluarkannya dari darah anda.

Sebelum menggunakan Rosucor 20

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jika anda alergi (hipersensitif) kepada *Rosuvastatin*, atau kepada mana-mana bahan-bahan;
- Jika anda mempunyai penyakit hati
- Jika anda mempunyai masalah buah pinggang yang teruk
- Jika anda telah mengalami sakit otot atau kesakitan yang berulang atau tidak dapat dijelaskan.
- Jika anda mengambil ubat yang dipanggil *ciclosporin*
- Jangan ambil Rosucor 20 jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.
- Jangan ambil Rosucor 20 jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum mula menggunakan Rosucor 20

- Ambil perhatian khususnya jika;
- Jika anda mempunyai masalah dengan buah pinggang anda.

- Jika anda mempunyai masalah dengan hati anda.

- Mengalami sakit otot atau kesakitan yang berulang atau tidak dapat dijelaskan., sejarah peribadi atau keluarga tentang masalah otot, atau pernah mengalami masalah otot apabila mengambil ubat kolesterol lain pada masa dahulu.

- Jika anda kerap minum alkohol dalam jumlah yang banyak.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Beritahu doktor anda jika anda mengambil mana-mana daripada yang berikut:

- *Ciclosporin* (contohnya digunakan selepas pemindahan organ)

- *Protease inhibitors* termasuk *ritonavir*, *atazanavir*, *lopinavir* dan / atau *tipranavir* (ubat antiviral digunakan untuk merawat HIV / AIDS dan hepatitis)

- *Fibrates* (seperti *gemfibrozil*, *fenofibrate*) atau ubat-ubatan lain yang digunakan untuk menurunkan kolesterol (seperti *ezetimibe* dan *niacin*),

- Ubat untuk ketidakhadaman perut (digunakan untuk meneutralkan asid di dalam perut anda),

- *Erythromycin* dan *Fusidic Acid* (antibiotik)

- Ubat yang boleh mengubah keberkesanan Rosucor atau sebaliknya.

- *Warfarin* (atau ubat lain yang digunakan untuk mencairkan darah)

- Ubat pencegah hamil atau terapi gantikan hormon (HRT).

Cara menggunakan Rosucor 20

- Berapa banyak harus digunakan

Dos permulaan biasa adalah Rosucor 5-20 mg sekali sehari dan kebanyakan keadaan pesakit dapat dikawal pada dos ini. Peningkatan dos kepada 20 mg boleh dibuat selepas 4 minggu, jika perlu. Rosuvastatin 40mg hanya digunakan untuk pesakit yang mempunyai paras kolesterol yang tinggi dalam darah (termasuk dengan penghidap *familial high cholesterol level* – kadar kolesterol “jahat” yang di sebabkan faktor keturunan) apabila rawatan menggunakan 20mg tidak berkesan.

Doktor anda akan memutuskan dos yang bersesuaian dengan anda berdasarkan keadaan anda.

- Bila perlu digunakan

Rosucor boleh diberikan pada bila-bila masa, dengan atau tanpa makanan.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Rosucor 20

- Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Rosuvastatin.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mempunyai sakit otot yang tidak dapat dijelaskan atau sakit terutamanya jika anda merasa kurang sihat atau demam.
- Teruskan dengan mengawal pemakanan dan bersenam semasa masih mengambil Rosucor.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi Rosucor 20 dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

Rosuvastatin Calcium (20mg)

- Perkara yang perlu diberi perhatian Memandu dan menggunakan jentera

Rosuvastatin mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera, Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Rosucor 20 boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

- Reaksi hipersensitiviti termasuk *angioedema* (membran mukus bengkak).
- Sakit kepala, pening, *polyneuropathy* (Gejala-gejalanya termasuk berasa lemah, kehilangan perasaan pada badan, rasa seperti dicucuk atau kesemutan).
- Sembelit , loya , sakit perut , radang pankreas , cirit-birit
- *Pruritus* (Gatal-gatal), ruam , urtikaria (jenis ruam kulit),
- Sindrom *Stevens- Johnson* (gangguan kulit dan mukus membran)
- Sakit otot, sakit otot atau kelemahan bukan disebabkan oleh senaman, terutamanya jika anda juga mempunyai demam atau secara amnya merasa kurang sihat, *rhabdomyolysis* (kerosakkan pada otot rangka), sakit sendi
- Kelemahan fizikal yang tidak normal atau kekurangan tenaga, urin mengandungi darah atau protein.
- Jaundis , hepatitis (radang hati) , peningkatan enzim hati.
- Kehilangan ingatan, kealpaan, lemah ingatan , kekeliruan.
- Kandungan gula dalam darah tinggi, peningkatan gula darah semasa puasa.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (*Consumers →Reporting*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Rosucor 20

Penyimpanan

- Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.
- Dilindungi dari kelembapan.
- Simpan di bawah suhu 30°C.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Putih ke putih pudar, bulat, dwikembang, tablet bersalut filem dengan garisan pemisah di sebelah dan kosong di sebelah lain.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Rosuvastatin Calcium
- Bahan tidak aktif
Lactose Monohydrate
Microcrystalline cellulose
Crospovidone XL-20
Magnesium stearate
Hypromellose
Triacetin

- Nombor MAL

MAL10080065A

Pengilang

Torrent Pharmaceuticals Ltd.
Indrad 382 721, District: Mehsana
India

Pemegang Pendaftaran Produk

Laboratories Torrent (Malaysia) Sdn Bhd.,
Suite E-08-08 Plaza Mont Kiara,
No. 2 Jalan Kiara, Mont Kiara.
50480 Kuala Lumpur Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

16/12/2015

Nombor Siri

BPFK(R4/1)181115/00436