

BEZONE CREAM

Betamethasone Valerate (0.1% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Bezone Cream
2. Bagaimana Bezone Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Bezone Cream
4. Cara menggunakan Bezone Cream
5. Semasa menggunakan Bezone Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Bezone Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Bezone Cream

Betamethasone Valerate adalah bahan aktif untuk Bezone Cream. Ia tergolong dalam kumpulan ubat yang dipanggil steroid.

Ia diguna untuk melegakan manifestasi inflamasi kronik atau akut penyakit kulit yang ada tindakbalas terhadap kortikosteroid seperti *dermatitis*, *psoriasis*, *xerosis* dan *pruritus*.

Ia juga digunakan dalam penyakit dermatitis sentuhan allergik atau dermatitis iritasi. Tambahan juga, krim ini akan menyejukkan dan mengeringkan luka berair dan inflamasi akut.

Bagaimana Bezone Cream berfungsi

Betamethasone Valerate adalah sejenis kortikosteroid dan digunakan bagi tindakan anti-inflamasi, anti-kegatalan dan vasokonstriksi (pengecutan saluran darah) pada kulit.

Sebelum menggunakan Bezone Cream

- Bila tidak boleh menggunakan
 - Jika anda alergi (hipersensitif) kepada Betamethasone Valerate atau sebarang kandungan dalam Bezone Cream.

- Sekiranya anda mempunyai penyakit viral kulit seperti *varicella* dan *vaccina*.

- Sebelum menggunakan Bezone Cream

Anda harus beritahu doktor anda sekiranya:

- Anda alergi terhadap ubat yang anda pernah ambil untuk merawat keadaan semasa anda.
- Anda hamil, atau sedang cuba untuk hamil atau sedang menyusu anak.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor dan ahli farmasi anda sekiranya anda sedang mengambil mana-mana ubat, termasuk tonik herbal, pelengkap tambahan dan ubat yang dibeli tanpa preskripsi.

Cara menggunakan Bezone Cream

Sentiasa menggunakan ubat dengan tepat seperti yang diberitahu oleh doktor anda. Anda perlu merujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda tidak pasti. Tidak boleh mengambil ubat ini melalui mulut. Ubat ini hanya untuk kegunaan topikal sahaja.

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa

Krim disapu pada bahagian yang terlibat dua hingga empat kali sehari.

Kanak-kanak

Krim disapu pada bahagian yang terlibat satu kali sehari.

Pembalutan oklusif:

Sapu sedikit krim dengan perlahan ke bahagian yang terlibat sehingga ia diserap. Sapu sekali lagi krim ke

bahagian yang terlibat dengan meninggalkan satu lapisan nipis salutan dan tutup dengan kepingan *polyethylene*, atau, untuk tangan dan kaki, guna beg atau sarung tangan *polyethylene*. Sebanyak yang boleh, keluarkan udara di antara kulit dengan *polyethylene* dan pembalutan ditutup rapat dengan pita pelekat. Ini dibiarkan untuk 48 jam dan sekiranya perlu, diperbaharui setelah kulit dicuci dengan perlahan dan dikeringkan.

Bagaimana anda menggunakan Bezone Cream

1. Cuci tangan anda.
2. Sapu dengan perlahan jumlah krim yang betul ke atas kulit sehingga ia diserap sepenuhnya.
3. Anda boleh menyukat berapa banyak Bezone Cream diperlukan dengan menggunakan hujung jari anda.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Terus menggunakan ubat ini untuk tempoh masa yang telah ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

- Sekiranya anda lupa satu dos, sapu dos itu dengan segera.
- Tetapi, sekiranya telah hampir masa untuk dos yang berikutnya, abaikan dos yang terlepas.
- Jangan menggunakan dos berganda untuk menggantikan dos yang dilupa.

- Jika anda selalu mengguna Bezone Cream, pastikan anda beritahu doktor anda sebelum berhenti menggunakannya.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Simptom toksik berkaitan terapi kortikosteroid topikal boleh dibahagikan sama ada secara sistemik atau tempatan. Simptom dinyatakan pada bahagian ‘Kesan-kesan sampingan’.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Bezone Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

Hubungi doktor jika simptom anda bertambah buruk atau tiada perubahan.

Beritahu doktor sekiranya anda hamil semasa menggunakan Bezone Cream.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan beri Bezone Cream kepada orang lain walaupun simptom mereka seolah-olah serupa ataupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda. Doktor anda telah mempreskripsikan Bezone Cream untuk anda dan keadaan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Kortikosteroid tidak harus diguna dengan kewujudan jangkitan.

Bezone Cream tidak harus disapu dengan pembalutan oklusif ke kawasan badan yang luas kerana peningkatan risiko toksik sistemik.

Krim tidak harus disapu pada ulser kaki.

Penggunaan topikal untuk jangka panjang harus dielakkan terutamanya pada kanak-kanak dan semasa kehamilan.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Bezone Cream boleh juga mempunyai kesan sampingan walaupun bukan semua orang yang mendapatnya. Kesan sampingan berikut mungkin terjadi dengan ubat ini.

- Jangkitan seperti kesakitan, kemerahan atau lepuh yang bernanah.
- Iritasi seperti kepedihan, kegatalan, kelepuhan atau kelupasan pada kulit yang tidak wujud semasa terapi.
- Rawatan dan penggunaan yang berpanjangan pada kawasan yang luas akan menyebabkan muka bulan (ciri-ciri *hypercorticism*), garisan ungu kemerahan pada lengan tangan, kaki, paha dan pangkal paha serta penipisan kulit dengan senang mendapat lebam.

Sekiranya mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau anda mengalami kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda was-was atau untuk maklumat selanjutnya.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers

ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (*Consumers* → *Reporting*)

Cara penyimpanan dan pelupusan Bezone Cream

- Penyimpanan

Jangan guna selepas tarikh tamat tempoh yang dinyatakan pada bungkusan. Tarikh tamat tempoh merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut.

Simpan pada suhu 15-25°C. Lindungi daripada kepanasan dan pembekuan.

Jauhi daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui sisa air atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda cara-cara pelupusan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Krim berwarna putih. Ia dibekalkan dalam tiub aluminium 15g.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Setiap gram mengandungi bahan aktif, Betamethasone Valerate yang bersamaan dengan *Betamethasone 1mg*.

- Bahan tidak aktif
Bahan-bahan lain adalah mineral oil heavy, white petrolatum, cetostearyl alcohol, cetomacrogol 1000, sodium phosphate anhydrous,

citric acid hydrous dan
chlorocresol.

- Nombor MAL
MAL19920300AZ

**Pengilang dan Pemegang
Pendaftaran Produk**

Malaysian Pharmaceutical Industries
Sdn Bhd.
Plot 14, Lebuhraya Kampung Jawa,
11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

16/02/2016

Nombor Siri:

BPFK(R4/1)160216/00033