

PULIN FILM COATED TABLET

Metoclopramide Hydrochloride (10mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan PULIN FILM COATED TABLET
2. Bagaimana PULIN FILM COATED TABLET berfungsi
3. Sebelum menggunakan PULIN FILM COATED TABLET
4. Cara menggunakan PULIN FILM COATED TABLET
5. Semasa menggunakan PULIN FILM COATED TABLET
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan PULIN FILM COATED TABLET
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan PULIN FILM COATED TABLET

PULIN FILM COATED TABLET digunakan untuk mencegah dan sebagai rawatan untuk muntah yang disebabkan oleh pendedahan melampau kepada radiasi, selepas pembedahan, dan ubat yang menyebabkan loya dan muntah.

Bagaimana PULIN FILM COATED TABLET berfungsi

Ia bertindak dengan meningkatkan pergerakan otot dalam saluran gastrousus supaya makanan bergerak lebih cepat dari perut ke usus dan juga menyekat rasa loya yang dicetuskan di dalam otak.

Sebelum menggunakan PULIN FILM COATED TABLET

-Bila tidak boleh menggunakan

Metoclopramide tidak boleh diambil jika:

- anda mempunyai masalah gastrousus seperti pendarahan, halangan atau lubang
- anda mempunyai epilepsi.
- anda mempunyai tumor kelenjar adrenal yang jarang didapati, yang terletak berhampiran buah pinggang (*phaeochromocytoma*).
- anda mengambil ubat yang boleh menyebabkan *extrapyramidal symptoms* (yang menyebabkan gangguan pergerakan).

-Sebelum menggunakan PULIN FILM COATED TABLET

Beritahu doktor jika anda alah terhadap sebarang ubat ataupun menghadapi sebarang masalah kesihatan lain.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Minta nasihat daripada doktor atau ahli farmasi anda jika anda ingin menggunakan PULIN FILM COATED TABLET bersama

dengan ubat yang lain terutamanya *anticholinergics* dan ubat yang mengandungi *opioid*, *phenothiazines* dan *haloperidol*. Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil sebarang ubat, termasuk ubat yang tidak memerlukan preskripsi.

Penggunaan serentak metoclopramide bersama alkohol dan *central nervous system* (CNS) *depressant* boleh meningkatkan kesan sedatif.

Cara menggunakan PULIN FILM COATED TABLET

-Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: 10mg , 3 kali sehari.

Kanak-kanak: 2.5mg hingga 5mg tiga kali sehari, mengikut umur.

Jumlah dos sehari terutamanya untuk kanak-kanak dan orang dewasa muda tidak melebihi 0.5mg/kg berat badan

-Bila perlu digunakan

PULIN FILM COATED TABLET perlu diambil mengikut masa yang dicadangkan oleh doktor anda. Ia boleh diambil sebelum makan.

-Berapa lama perlu digunakan

PULIN FILM COATED TABLET perlu diambil mengikut nasihat doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa satu dos dan anda mengambil ubat ini secara berterusan, ambil dos itu secepat mungkin. Jika mendekati masa pengambilan dos yang kedua, jangan mengambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa, kecuali dinasihati oleh doktor. Jangan mengambil dua dos pada masa yang sama.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Gejala berlebihan dos termasuk mengantuk yang teruk, kekeliruan, kebingungan, reaksi *extrapyramidal* seperti kekejangan otot.

Semasa menggunakan PULIN FILM COATED TABLET

-Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat ini mengikut arahan doktor anda.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah pengambilan dos ubat tanpa arahan doktor. Jangan memberi ubat ini kepada orang lain walaupun keadaan mereka serupa dengan anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Tidak mengambil lebih daripada 0.5mg/kg/sehari. Untuk orang yang pernah mengalami kemurungan, ambil dengan berhati-hati. Ia tidak dicadangkan untuk kehamilan semasa trimester pertama.

Kesan-kesan sampingan

Kesan sampingan biasanya ialah mengantuk, keletihan dan pening, *hyperprolactinaemia* (penghasilan susu oleh lelaki dan wanita yang tidak menyusukan anak), dan tindak balas *extrapyramidal* seperti *akathisia* (keresahan) dan *dystonia* (kekejangan otot).

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No.Tel.: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (*Consumers→Reporting*).

Cara penyimpanan dan pelupusan PULIN FILM COATED TABLET

-Penyimpanan

Simpan dalam bekas kedap udara. Simpan di bawah suhu 30°C, elakkan daripada terdedah kepada cahaya dan kelembapan.

-Pelupusan

PULIN FILM COATED TABLET perlu dilupuskan apabila doktor atau ahli farmasi menyuruh anda berhenti mengambil ubat ini atau ubat ini telah luput tarikh. Sila bertanya kepada ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Tablet bersalut filem berwarna jingga muda.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Metoclopramide HCl
- Bahan tidak aktif
Lactose
Cellulose Calcium
Polyethylene Glycol
Silicon Dioxide
Magnesium Stearate
Sunset Yellow
Titanium Dioxide

Dimethicone
Avicel
Hydroxypropyl Methylcellulose

-Nombor MAL

MAL19973699AZ

Pengilang

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13, Kawasan
Perindustrian Bandar Baru Bangi, 43000
Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd.
Lot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13,
Kawasan Perindustrian Bandar Baru Bangi,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

15/02/2016

Nombor Siri

BPFK(R4/1)150216/00030