

AMPICILLIN CAPSULE®

Ampicillin Trihydrate (250mg, 500mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan AMPICILLIN
2. Bagaimana AMPICILLIN berfungsi
3. Sebelum menggunakan AMPICILLIN
4. Cara menggunakan AMPICILLIN
5. Semasa menggunakan AMPICILLIN
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan AMPICILLIN
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan AMPICILLIN

AMPICILLIN digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Antaranya ialah:

- Jangkitan pada saluran respiratori (seperti jangkitan pada hidung dan tekak, radang paru-paru, bronchitis)
- Jangkitan pada telinga
- Jangkitan pada saluran kencing (seperti jangkitan pada pundi kencing dan uretra)
- Jangkitan gastrousus (seperti jangkitan pada usus).
- Demam kepialu (penyakit berjangkit yang berpunca daripada makan dan minum dari air yang dicemari oleh kuman *Salmonella*)
- Gonorea (penyakit yang berjangkit melalui hubungan kelamin)

Bagaimana AMPICILLIN berfungsi

AMPICILLIN adalah antibiotic dari kumpulan ubat yang dipanggil penicillin. Antibiotik ini bertindak dengan membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan anda.

AMPICILLIN seperti antibiotic lain tidak akan berkesan melawan jangkitan yang disebabkan oleh virus seperti demam dan selsema.

Sebelum mengambil AMPICILLIN

- *Bila tidak boleh menggunakan*
Jangan gunakan AMPICILLIN selepas tarikh luput yang tertera pada pek bungkusan.

Jangan gunakan AMPICILLIN jika pek bungkusan menunjukkan kesan buka atau koyak.

Jangan gunakan AMPICILLIN untuk merawat sebarang penyakit lain kecuali diatas nasihat doktor anda.

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil AMPICILLIN jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil AMPICILLIN jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- *Sebelum menggunakan AMPICILLIN*

AMPICILLIN tidak sesuai untuk semua orang. Pastikan doktor anda sedia maklum akan perkara berikut sebelum anda mula mengambil AMPICILLIN:

Jika anda alah pada :

- Sebarang penicillin
- Sebarang cephalosporin
- Mana-mana bahan yang tersenarai di hujung risalah ini.

Jika anda sedang menghidap:

- Asma, demam atau gatal-gatal.
- Masalah buah pinggang
- Demam kelenjar (jangkitan mononukleosis)
- Penyakit sel darah putih (leukemia)
- Penyakit *Human immunodeficiency virus* (HIV)
- Masalah perdarahan
- Masalah gastrousus

- *Jika mengambil ubat-ubat lain*

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Maklumkan doktor anda jika anda sedang mengambil sebarang ubatan lain contohnya:

- allopurinol dan probenecid, ubat untuk merawat kadar asid uric yang tinggi dalam darah seperti gout dan batu karang.
- Berkemungkinan untuk mengurangkan keberkesanan ubat kontraseptif
- Antikoagulasi, ubat untuk kesan penipisan darah.
- Methotrexate, sejenis ubat yang digunakan untuk merawat arthritis rheumatoid, serta beberapa jenis kanser

Ubat-ubatan ini mungkin mengganggu kesan AMPICILLIN, atau mungkin terganggu kesannya sendiri. Anda mungkin memerlukan dos yang berlainan atau mungkin juga perlu menukar ubat anda. Doktor anda akan membantu anda.

Doktor anda juga akan mempunyai maklumat lanjut mengenai ubat yang perlu diberi perhatian semasa mengambil AMPICILLIN.

Cara menggunakan AMPICILLIN

- *Berapa banyak harus digunakan*

Ikut semua arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Doktor atau ahli farmasi anda akan menjelaskan kepada anda:

- Beberapa biji tablet perlu diambil setiap kali
- Berapa kali anda perlu ambil setiap hari

- Bila anda perlu mengambil setiap hari

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Dos mungkin berbeza mengikut keadaan dan tindak balas daripada badan anda. Doktor anda juga mungkin menggunakan dos yang berbeza untuk tujuan perubatan yang lain.

Dewasa :

Gonorea tidak rumit (gonococci sensitif):

- Satu dos 2g atau 3.5g dengan 1g probenecid.

Demam kepialu:

- 25mg setiap kg berat badan setiap 6 jam.

Dos dewasa biasa ialah 0.25-1g setiap 6 jam. Had biasa untuk dewasa ditetapkan: sehingga 4g sehari.

Kanak-kanak :

Bayi dan kanak-kanak sehingga 20 kg berat badan:

- 12.5 hingga 25mg setiap kg berat badan setiap 6 jam, atau 16.7 untuk 33.3mg setiap kg berat badan setiap 8 jam.

Kanak-kanak 20 kg berat badan dan lebih:

- Dos dewasa biasa.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

Jika anda terlupa mengambil lebih dari satu dos, hubungi doktor atau ahli farmasi anda untuk nasihat.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan AMPICILLIN

- Perkara yang perlu dilakukan

Jika simptom jangkitan anda tidak pulih dalam mada beberapa hari, atau jika ianya menjadi lebih teruk, maklumkan doktor anda.

Jika anda merasa gatal-gatal dan bengkak atau ruam pada kulit atau mengalami kesukaran untuk bernafas semasa anda mengambil AMPICILLIN, berhenti mengambil ubat ini dan maklumkan doktor anda segera.

Jika anda mengalami cirit-birit, maklumkan doktor anda segera. Beri perhatian kepada perkara ini walaupun ianya berlaku beberapa minggu selepas anda berhenti mengambil AMPICILLIN. Cirit-birit menunjukkan keadaan usus anda sedang mengalami suatu keadaan yang serius. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera. Jangan mengambil sebarang ubat untuk cirit birit tanpa memeriksa dengan doktor anda terlebih dahulu.

Jika anda mengalami sakit mulut atau lidah, dah berwarna keputihan, semasa atau sewaktu menambil AMPICILLIN, maklumkan kepada doktor anda. Maklumkan juga jika anda mengalami gatal pada vagina atau keputihan.

Ini menunjukkan anda mungkin mengalami jangkitan kulat dipanggil seriawan. Kadangkala penggunaan AMPICILLIN membolehkan fungsi/kulat untuk tumbuh.

AMPICILLIN tidak berfungsi ke atas fungsi atau kulat.

Jika anda hendak mula mengambil sebarang ubat yang baru, maklumkan doktor anda bahawa anda sedang dirawat dengan AMPICILLIN.

Jika anda akan menjalani ujian darah atau ujian air kencing, maklumkan doktor anda yang anda sedang mengambil AMPICILLIN. AMPICILLIN mungkin akan mempengaruhi keputusan ujian-ujian tersebut.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan AMPICILLIN. Doktor anda akan memberitahu anda sekiranya terdapat arahan tambahan sewaktu anda mengambil AMPICILLIN.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doctor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi AMPICILLIN dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera. Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, AMPICILLIN boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Maklumkan doktor anda segera jika anda mengalami keadaan berikut dan ianya merisaukan anda:

- Seraiwan pada mulut- putih, berbulu, dan sakit pada lidah dan mulut.
- Seraiwan pada faraj sakit, gatal pada kawasan sulit dan mengalami keputihan.
- Gangguan pada kawasan mulut, mual, muntah-muntah atau cirit-birit.

Maklumkan doktor anda segera jika anda mengalami perkara berikut:

- kulit menjadi kemerahan atau gatal-gatal.
- kesukaran untuk bernafas
- bengkak-bengkak
- degup jantung menjadi laju atau tidak seperti biasa.
- alergi yang tiba-tiba seperti ruam, gatal-gatal atau bengkak pada muka.
- kegatalan kulit yang teruk sehingga melecet atau kulit yang mengelupas dan disertai oleh demam, rasa seram sejuk, sakit kepala, bengkak kelenjar, sakit perut dan sendi-sendi dan juga otot-otot.
- Demam, sakit tekak, bengkak kelenjar, ulser mulut, pendarahan yang luar biasa atau lebam-lebam pada kulit.

Kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas mungkin berlaku di kalangan sesetengah pesakit.

Jangan risau akan sebarang kesan sampingan yang tersenarai diatas. Anda mungkin tidak akan mengalaminya.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (Public → Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI/ Vaccine Safety)

Cara penyimpanan dan pelupusan AMPICILLIN

- Penyimpanan

Simpan AMPICILLIN di tempat yang sejuk dan kering pada suhu bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya.

Simpan pil anda dalam peknya sehingga tiba masa untuk mengambilnya. Jika anda mengeluarkan pil daripada peknya, ia mungkin tidak dapat dikekalkan dalam keadaan yang baik.

Jangan simpan AMPICILLIN atau ubat lain dalam bilik mandi atau dekat sinki.

Jangan tinggalkan ubat di dalam kereta atau atas unjuran tapak tingkap. Haba dan kelembapan boleh merosakkan sesetengah ubat.

Simpan di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak. Almari yang berkunci sekurang-kurangnya satu setengah meter dari aras lantai ialah tempat yang sesuai untuk menyimpan ubat.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

- AMPICILLIN CAP 250mg: Kapsul bersaiz 2, berwarna Hitam dan Merah, bertanda 'UPHA/AMP250'.
- AMPICILLIN CAP 500mg: Kapsul bersaiz 0, berwarna Hitam dan Merah, bertanda "UPHA / AMP 500".

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
AMPICILLIN CAP 250mg:
Setiap kapsul mengandungi 250mg ampicillin trihydrate.

AMPICILLIN CAP 500mg:
Setiap kapsul mengandungi 500mg ampicillin trihydrate.

- Bahan tidak aktif
AMPICILLIN CAP 250mg & 500mg
• Sodium Starch Glycolate
• Magnesium Stearate

- Nombor MAL

Ampicillin Capsule 250mg:
MAL19860248AZ

Ampicillin Capsule 500mg
MAL19860002AZ

Pengilang

UPHA PHARMACEUTICAL MFG (M) SDN BHD (53667-M)
Lot 2& 4, Jalan P/7, Seksyen 13, Bangi Industrial Estate
43650 Bandar Baru Bangi.
Selangor Darul Ehsan.

Pemegang Pendaftaran Produk

UPHA PHARMACEUTICAL MFG (M) SDN BHD (53667-M)
Lot 2& 4, Jalan P/7, Seksyen 13, Bangi Industrial Estate
43650 Bandar Baru Bangi.
Selangor Darul Ehsan.

Tarikh kemaskini RiMUP

28/07/2017

Nombor siri:
BPFK (R4/1)280717/00185