

CREOBIC CREAM

Clotrimazole (1% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Creobic Cream
2. Bagaimana Creobic Cream berfungsi.
3. Sebelum mengguna Creobic Cream.
4. Cara menggunakan Creobic Cream
5. Semasa menggunakan Creobic Cream.
6. Kesan- kesan sampingan.
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Creobic Cream.
8. Maklumat lanjut.
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk.
10. Tarikh kemaskini RiMUP.

Apakah kegunaan Creobic Cream
Creobic Cream merupakan sejenis agen antifungal jenis imidiazole.

Bagaimana Creobic Cream berfungsi

Creobic Cream digunakan secara topikal bagi mengawal semua jenis jangkitan kulit yang disebabkan oleh dermatofit, yis, kulat dan fungus lain. Ia termasuk jangkitan kurap (tinea), *athlete's foot*, paronikia (radang pada tisu di sekeliling kuku tangan atau kuku kaki), pitiriasis versikolor (jangkitan kulat), eritrasma (penyakit kulit), intertrigo (keadaan keradangan pada lipatan kulit), ruam lampin, candida vulvitis (jangkitan vagina) dan candida balanitis (jangkitan kepala zakar).

Sebelum mengguna Creobic Cream

-Bila tidak boleh menggunakan Creobic Cream

Jangan guna Creobic Cream jika:

- Ia tidak dipreskripsikan oleh doktor atau ahli farmasi bertaualiah kepada anda.
- Rawatan harus dihentikan jika terdapat tanda-tanda hipersensitiviti.

-Sebelum mula menggunakan Creobic Cream

Sebelum anda mengguna Creobic Cream anda perlu memaklumkan kepada doktor anda:

- Jika anda alergi pada sebarang ubat-ubatan.
- Jika anda mengambil ubat-ubatan lain (termasuk yang tidak dipreskripsikan oleh doktor anda).

-Jika mengambil ubat- ubat lain

Anda harus memberitahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil ubat-ubatan lain.

Ia mungkin selamat bagi anda untuk mengguna Creobic Cream dan doktor akan menentukan apa yang sesuai untuk anda.

Cara menggunakan Creobic Cream

-Berapa banyak harus digunakan

Krim ini adalah untuk penggunaan luaran sahaja.

- Sapu krim secara nipis dan sekata pada kawasan jangkitan 2 hingga 3 kali sehari dan gosok dengan lembut.
- Jika kaki terkena jangkitan, kaki hendaklah dibasuh dan dikeringkan terutamanya di antara jari, sebelum menggunakan krim.
- Dapatkan nasihat doktor jika tiada peningkatan dalam masa 4 minggu (bagi *athlete's foot*) atau 2 minggu (bagi *jock itch*).

-Bila perlu digunakan

Doktor anda akan menentukan sekiranya anda perlu mengguna Creobic Cream bergantung kepada jenis keadaan yang anda miliki.

-Berapa lama perlu digunakan

- Gunakan krim ini seperti yang dicatatkan di dalam risalah ini tanpa melangkaui atau melebihi tempoh pengambilan dalam sehari dan sepanjang pengambilan.
- Kebiasaannya, rawatan perlu diteruskan bagi sekurang-kurangnya sebulan atau sekurang-kurangnya 2 minggu selepas semua tanda-tanda jangkitan tidak kelihatan bagi mengelakkan pengulangan.
- Ikut saranan dan nasihat daripada doktor atau ahli

farmasi tentang berapa lama anda perlu mengambil ubat anda.

-Jika terlupa menggunakan

- Jika anda terlupa untuk menggunakan krim anda pada sesetengah masa, gunakan krim anda dengan segera. Abaikan penggunaan yang terlupa sekiranya masa untuk penggunaan yang seterusnya telah hampir.

-Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Jangan risau jika anda menggunakan krim berlebihan secara tidak sengaja. Jika anda menggunakannya dengan banyak atau tertelan secara tidak sengaja, ia mungkin menyebabkan anda sakit. Anda boleh memaklumkan kepada doktor anda atau pergi hospital dengan segera.

Semasa menggunakan Creobic Cream

-Perkara yang perlu dilakukan

- Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda tentang perkara yang mesti dan tidak patut anda lakukan semasa mengguna ubat ini.
- Maklumkan doktor anda jika tanpa diduga anda perlu mengambil ubatan lain.
- Ambil Creobic Cream mengikut dos yang disarankan.
- Maklumkan doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami kesan sampingan yang tidak tersenarai di dalam risalah ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan menggunakan Creobic Cream lebih daripada frekuensi yang dicadangkan dalam satu hari.
- Jangan sapu secara berlapis-lapis pada kawasan jangkitan.

CREOBIC CREAM

Clotrimazole (1% w/w)

-Perkara yang perlu diberi perhatian

- Hindarkan dari terkena pada mata, telinga, atau membran mukus.
- Jangan guna pada kanak-kanak bawah 2 tahun kecuali di bawah nasihat dan pemerhatian doktor.

Kesan- kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Creobic Cream boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang mendapatnya. Anda adalah dinasihatkan untuk berjumpa dengan doktor/ ahli farmasi untuk maklumat lanjut. Kesan-kesan sampingan berikut telah dilaporkan:

- Iritasi setempat.
- Rasa terbakar yang ringan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (*Public* → *Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Creobic (New Formula)

-Penyimpanan

Jauhkan Creobic Cream daripada jangkauan kanak-kanak. Simpan di bawah 30°C. Pastikan bekas ubat tertutup rapat dan lindungi dari cahaya.

-Pelupusan

Jangan guna Creobic Cream yang melebihi tarikh luput yang dicetak pada kotak.

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Creobic Cream ialah cream berwarna putih dan merupakan krim larut air.

-Bahan- bahan kandungan

Bahan Aktif:
Clotrimazol

Bahan Tidak Aktif:

Dehydag Wax "0", Cremophor A6, Cremophor A25, Liquid Paraffin, Propylene Glycol, Benzyl Alcohol, Sodium Dihydrogen Phosphate Anhydrous, Vitamin E Acetate, Purified Water.

-Nombor MAL

MAL19921472XZ

Pengilang dan pemegang pendaftaran produk

Kotra Pharma (M) Sdn Bhd
No. 1, 2 & 3, Jalan TTC 12,
Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

24/11/2017

Nombor siri

NPRA(R4/1)261217/00374