

DEXALONE TABLET

Dexamethasone (0.5mg , 0.75mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Dexalone Tablet
2. Bagaimana Dexalone Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Dexalone Tablet
4. Cara menggunakan Dexalone Tablet
5. Semasa menggunakan Dexalone Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Dexalone Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Dexalone

Dexamethasone diambil untuk:

- Mengurangkan inflamasi
- Merawat beberapa penyakit yang berkaitan dengan sistem imunisasi badan.

Sila rujuk pada doktor untuk maklumat lanjut.

Bagaimana Dexalone berfungsi

Dexalone Tablet mengandungi dexamethasone, yang tergolong di dalam kumpulan ubat kortikosteroid. Kortikosteroid berfungsi dengan mengurangkan inflamasi.

Sebelum menggunakan Dexalone Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini:

- selepas tarikh luput yang tertera pada pek
- jika bungkus koyak atau terdapat tanda diusik.

- jika anda mempunyai alahan terhadap dexamethasone atau sebarang bahan lain di dalam persediaan ubat ini. Tanda yang menunjukkan anda alah terhadap ubat ini ialah berasa gatal, ruam atau sesak nafas.
- jika anda mempunyai jangkitan
- jika anda mengambil vaksinasi baru-baru ini

Jika anda tidak pasti sama ada anda harus mula mengambil ubat ini, cakap pada doktor atau ahli farmasi anda.

Doktor akan menyediakan beberapa ujian atau pemeriksaan untuk anda seperti ujian darah, ujian kencing, ujian najis, ujian mata, pertumbuhan dan pembesaran untuk kanak-kanak dan remaja.

Mengandung dan menyusui

Jangan ambil Dexalone Tablet jika anda mengandung, cuba untuk mengandung, atau rasa anda mungkin mengandung.

Jangan ambil Dexalone Tablet jika anda menyusukan anak. Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil apa-apa ubat.

Dexamethasone boleh dijumpai di dalam susu ibu dan menyebabkan kesan yang tidak diingini.

- Sebelum menggunakannya

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai:

- *Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*
- Pembedahan usus baru-baru ini

- Masalah jantung
- Tekanan darah tinggi
- Kerosakan buah pinggang atau hati
- Menjalani dialisis
- Pendedahan pada Cacar air atau Campak baru-baru ini
- Kencing manis
- Jangkitan sistemik
- Glaukoma (Tekanan tinggi dalam mata menyebabkan kehilangan penglihatan beransur-ansur)
- Osteoporosis (Tulang berliang dan rapuh)
- *Ocular herpes simplex* (Jangkitan virus mata)
- *Hyperlipidemia* (Jumlah lemak dalam darah tinggi)
- Jumlah hormon tiroid tidak normal
- *Myasthenia gravis* (Kelemahan otot luar biasa)
- *Oral herpetic lesions* (Jangkitan virus menyebabkan luka sakit pada bibir, gusi, lidah, langit mulut, atau bahagian dalam pipi).
- *Tuberculosis* (Batuk kering akibat jangkitan paru-paru)
- *Systemic lupus erythmatusus* (Keadaan dimana sistem imun seseorang menyerang tisu sihat)

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Ubat-ubat lain boleh menjejaskan fungsi Dexalone ataupun Dexalone yang boleh menjejaskan fungsi ubat-ubat lain. Senarai ubat yang terlibat:

- estrogen, ubat perancang kehamilan.

- barbiturate, carbamazepine, phenytoin, dan primidone, rawatan untuk sawan
- rifampicin, rawatan untuk jangkitan bakteria
- *Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs* (NSAIDs), ubat untuk menahan sakit atau mengurangkan inflamasi
- antikoagulan dan agen thrombolytic, rawatan untuk cairkan darah
- insulin, ubat untuk kencing manis
- diuretik, sebagai pil air
- antasid, rawatan untuk pedih ulu hati, iritasi perut atau ketakcernaan
- aminoglutethimide, ubat untuk rawatan kanser
- ephedrine, ubat untuk melegakan hidung yang tersumbat
- acetazolamide, ubat untuk merawat glaukoma
- suplemen untuk kalium, natrium, dan asid folik
- salicylates (ubat penahan sakit)

Doktor dan ahli farmasi anda mungkin mempunyai lebih banyak maklumat tentang ubat-ubatan untuk berhati-hati atau dielakkan ketika mengambil Dexalone Tablet.

Cara menggunakan Dexalone tablet

- *Berapa banyak harus digunakan*

Dos antara 0.5mg sehingga 9mg sehari sebagai dos tunggal atau dos dibahagikan.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- *Bila perlu digunakan*

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- *Berapa lama perlu digunakan*

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- *Jika terlupa menggunakan*

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini. Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat.

Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- *Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa yang terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan ketakcernaan atau kerengsaan perut, dan kemurungan mental atau psikosis.

Semasa menggunakan Dexalone Tablet

- *Perkara yang perlu dilakukan*

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Dexalone Tablet. Elakkan mengambil alkohol.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- *Perkara yang tidak boleh dilakukan*

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi Dexalone Tablet kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- *Perkara yang perlu diberi perhatian*

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Dexalone Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Pengambilan steroid termasuk *Dexamethasone* boleh menyebabkan masalah mental yang serius.

Kesan-kesan sampingan lain termasuk selera makan meningkat, ketakcernaan,

kegelisahan, masalah untuk tidur, katarak (keruh pada lensa mata), kencing manis, perubahan warna kulit, pening, kemerahan pada muka atau pipi, penumbuhan rambut secara tidak normal pada badan atau muka, alahan, tiba-tiba buta, kekeliruan, keterujaan atau perubahan mood, disorientasi, khayalan, kemurungan mental, paranoia, peningkatan pembekuan darah, osteoporosis, lebam tidak normal, dan penyembuhan luka terjejas.

Dexamethasone boleh menyembunyikan simptom - simptom perkembangan atau pengaktifan semula ulser kolitis tidak spesifik (keradangan usus besar), diverticulitis (keradangan kantung kecil di dalam usus besar), esofagitis (keradangan esofagus), gastritis (keradangan perut) atau ulser peptik (ulser perut atau usus). Jadi pendarahan dalaman dan/atau perforasi (lubang) mungkin berlaku tanpa amaran.

Penghentian atau pengurangan dos mengejut boleh menyebabkan kekurangan adrenal yang menyebabkan rasa tidak selesa, kelemahan otot, sakit otot atau sendi, sakit di bahagian perut atau belakang, pening, pengsan, demam gred rendah, hilang selera makan yang berterusan, mual, muntah, sesak nafas, sakit kepala yang kerap atau tidak dapat dijelaskan, kepenatan atau keletihan yang tidak biasa, hilang berat badan secara mendadak, *hypoglycemia* (gula dalam darah rendah), hipotensi (tekanan darah rendah) dan dehidrasi. Kemunculan semula penyakit boleh berlaku.

Terus beritahu doktor anda jika anda mendapati mana-mana masalah ini, rujuk seorang doktor serta-merta.

Jika anda mendapati reaksi alahan kepada Dexamethasone, jumpa seorang doktor serta-merta.

Reaksi alahan termasuk:

- Apa-apa jenis ruam kulit atau gatal pada kulit
- Kesukaran bernafas atau pengsan

Jika kesan sampingan menjadi serius atau anda mempunyai apa-apa kesan sampingan yang tidak tersenarai dalam risalah ini, beritahu kepada doctor anda secepat mungkin. Dan jika anda mendapati masalah-masalah ini, beritahu doktor atau ahli farmasi anda segera.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (*Public Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety*)

Cara penyimpanan dan pelupusan Dexalone Tablet

Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak. Simpan di tempat yang kering di bawah suhu 30°C.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Dexalone Tablet 0.5mg
Berdiameter 6.5mm, berbentuk bulat, berwarna putih, bergores skor pada permukaan yang rata.

Dexalone Tablet 0.75mg
Berbentuk bujur, berwarna putih dan bergores skor pada permukaannya.

Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:

Sebiji tablet Dexalone Tablet 0.5mg dan 0.75mg mengandungi 0.5mg dan 0.75mg dexamethasone.

- Bahan tidak aktif:

- Corn Starch
- Tween 80
- Lactose
- Isopropyl Alcohol
- Magnesium Stearate

Nombor MAL

Dexalone Tablet 0.5mg:
MAL19870623AZ

Dexalone Tablet 0.75mg:
MAL19870636AZ

Pengilang

Upha Pharmaceutical Mfg (M) Sdn Bhd (53667-M)
Lot 2&4, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, Bandar Baru Bangi, 43650 Selangor Darul Ehsan

Pemegang Pendaftaran Produk

Upha Pharmaceutical Mfg (M) Sdn Bhd (53667-M)
Lot 2&4, Jalan P/7, Section 13, Bangi Industrial Estate, Bandar Baru Bangi, 43650 Selangor Darul Ehsan

Tarikh kemaskini RiMUP
27/10/2017

Nombor Siri
NPRA(R/1)171017/00274