

FUJI MULTIVIT TABLET

Nicotinamide (B3)/ Pyridoxine Hydrochloride (B6)/ Cyanocobalamin (B12)/ Vitamin A/Ascorbic Acid/Vitamin E/ Vitamin D3/ Riboflavine (B2)/Thiamine Hydrochloride (B1)(6.5mg/0.5mg/2mcg/1500IU/50mg/10IU/150IU/0.6mg/0.5mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Fuji Multivit
2. Bagaimana Fuji Multivit berfungsi
3. Sebelum mengambil Fuji Multivit
4. Cara mengambil Fuji Multivit
5. Semasa menggunakan Fuji Multivit
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Fuji Multivit
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RIMUP

Apakah kegunaan Fuji Multivit

Sebagai suplemen makanan untuk kanak-kanak.

Bagaimana Fuji Multivit berfungsi

Fuji Multivit mengandungi sembilan bahan aktif iaitu Nicotinamide (B3), Pyridoxine Hydrochloride (B6), Ascorbic Acid, Cyanocobalamin (B12), Vitamin A, , Vitamin E, Vitamin D3, Riboflavine (B2) dan Thiamine Hydrochloride (B1). Ia dapat mencegah kekurangan vitamin di dalam badan.

Sebelum menggunakan Fuji Multivit

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini sekiranya anda mempunyai alahan kepada mana-mana bahan yang disenaraikan di dalam risalah ini.

-Sebelum menggunakan ubat ini

Berbincang dengan doktor anda sebelum mengambil ubat ini.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini, termasuk mana-mana yang anda dapatkan tanpa preskripsi dari kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan anda.

Cara mengambil Fuji Multivit

-Berapa banyak harus diambil

Sentiasa gunakan Fuji Multivit seperti yang ditetapkan oleh doktor anda. Anda perlu merujuk kepada doktor atau ahli farmasi jika tidak pasti.

Dos biasa

Kanak-kanak

2-6 tahun: 1 tab setiap hari.

6-12 tahun: 1-2 tab setiap hari.

Atau seperti diarahkan oleh doktor.

-Bila perlu diambil

Ambil seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu diambil

Teruskan pengambilan Fuji Multivit seperti yang dicadangkan oleh doktor anda. Jika gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor anda.

-Jika terlupa mengambil

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga sampai masa untuk mengambil dos seterusnya dan abaikan dos yang tertinggal. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa telah terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan Fuji Multivit secara berlebihan mungkin menyebabkan:

- **Vitamin A** - keletihan, mudah marah, hilang selera makan, hilang berat badan, muntah, gangguan gastrousus, demam, kencing berlebihan, pendarahan bibir, kulit kering.
- **Vitamin D**- hilang selera makan, keletihan, loya, muntah, cirit-birit, kehilangan berat badan, kencing berlebihan, kuat berpeluh, sakit kepala, keletihan yang melampau, terasa berpusing, kenaikan tahap kalsium darah.

- **Vitamin E**- Keletihan, lemah, loya, sakit kepala, penglihatan kabur, kembung perut, cirit-birit.

Ketoksikan boleh dipulihkan dengan tidak mengambil vitamin ini dan ia jarang berlaku untuk kumpulan vitamin B & C kerana ia larut dalam air.

Semasa menggunakan Fuji Multivit

-Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Fuji Multivit.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan ambil dos lebih daripada yang disarankan melainkan diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan ambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi Fuji Multivit dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Jauhi ubat daripada kanak-kanak.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Fuji Multivit boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun jarang terjadi apabila digunakan mengikut preskripsi. Sekiranya kesan sampingan berterusan, jangan ambil ubat dan rujuk kepada doktor.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (Public → Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety).

Cara penyimpanan dan pelupusan Fuji Multivit

-Penyimpanan

Simpan di tempat yang dingin & kering. Pastikan penutup ditutup dengan ketat. Lindungi dari cahaya.

FUJI MULTIVIT TABLET

Nicotinamide (B3)/ Pyridoxine Hydrochloride (B6)/ Cyanocobalamin (B12)/ Vitamin A/Ascorbic Acid/Vitamin E/ Vitamin D3/ Riboflavine (B2)/Thiamine Hydrochloride (B1)(6.5mg/0.5mg/2mcg/1500IU/50mg/10IU/150IU/0.6mg/0.5mg)

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Tablet berwarna kuning, bulat, dwicembung dan bergaris pada satu belah.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Nicotinamide (B3), Pyridoxine Hydrochloride (B6), Cyanocobalamin (B12), Vitamin A, Ascorbic Acid, Vitamin E, Vitamin D3, Riboflavine (B2) dan Thiamine Hydrochloride (B1).

- Bahan-bahan tidak aktif

Spirit Chloroform, Tutti Frutti, Aspartame, National starch, Mannitol, Magnesium Stearate, Kollidon PVP dan Microcrystalline Cellulose.

-Nombor MAL

MAL19985584X

Pengilang dan Pemegang

Pendaftaran Produk

KCK Pharmaceutical Industries Sdn. Bhd.
Plot 61, Bayan Lepas Industrial Park
Phase 4, 11900 Penang,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RIMUP

19/12/2017

Nombor Siri

NPRA(R4/1)141117/00315