

MICODERM HC OINTMENT

Miconazole Nitrate / Hydrocortisone Acetate (2%w/w / 1%w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Micoderm HC Ointment
2. Bagaimana Micoderm HC Ointment berfungsi
3. Sebelum menggunakan Micoderm HC Ointment
4. Cara menggunakan Micoderm HC Ointment
5. Semasa menggunakan Micoderm HC Ointment
6. Kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan pelupusan Micoderm HC Ointment
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang pendaftaran
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Micoderm HC Ointment

Micoderm HC Ointment digunakan untuk merawat keadaan radang kulit seperti ekzema dan dermatitis yang mungkin disebabkan oleh jangkitan kulat dan bakteria tertentu. Ia boleh digunakan untuk merawat keadaan seperti ruam napkin dan jangkitan kulit.

Bagaimana Micoderm HC Ointment berfungsi

Miconazole aktif terhadap pelbagai jenis kulat dan juga mempunyai aktiviti anti-bakteria terhadap bakteria tertentu. Hydrocortisone adalah corticosteroid yang digunakan untuk penggunaan topikal dalam rawatan pelbagai masalah kulit.

Sebelum menggunakan Micoderm HC Ointment

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan jika anda alergi kepada Miconazole, Hydrocortisone atau mana-mana bahan-bahan lain dalam produk ini. Tidak sesuai untuk kulit yang berkeadaan tuberkulosis, kudis selesema, cacar lembu dan cacar air. Penggunaan dalam kehamilan tidak digalakkan kecuali manfaat yang dijangkakan melebihi potensi risiko. Penggunaan dalam penyusuan tidak digalakkan.

- Sebelum menggunakan Micoderm HC Ointment

Permohonan hendaklah digunakan dalam jangkitan kulit bakteria tanpa terapi anti-mikrob seiring sesuai.

- Jika mengguna ubat- ubatan lain

Jangan gunakan produk kulit yang lain di kawasan yang terjangkau.

Cara mengguna Micoderm HC Ointment

- Berapa banyak harus digunakan

Sapukan pada ke kawasan yang terjangkau dua kali sehari. Gosok perlahan-lahan. Basuh tangan selepas digunakan.

- Bila perlu diguna

Anda perlu mengikut dos yang disyorkan dan tidak patut menggunakan lebih daripada dos yang ditetapkan.

- Berapa lama perlu diguna

Tempoh rawatan harus terhad kepada 3 hingga 4 minggu sahaja.

- Jika terlupa mengguna

Jika anda terlupa guna Micoderm HC Ointment, gunakannya apabila anda teringat.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Tiada penawar khusus boleh didapati. Sekiranya tersalah makan secara berlebihan, pengguna perlu diperhatikan dan dirawat mengikut keadaan. Hubungi doktor atau hospital terdekat dengan segera untuk nasihat rawatan.

Semasa mengguna Micoderm HC Ointment

- Perkara yang perlu dilakukan

Periksa dengan doktor anda jika simptom berlarutan atau bertambah teruk.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Untuk kegunaan luaran sahaja. Elakkan bersentuhan dengan mata, hidung dan mulut. Tidak boleh diambil. Jangan gunakan Micoderm HC Ointment untuk merawat sebarang keadaan lain kecuali dinasihat oleh doctor dan ahli farmasi.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jangan gunakan di bawah kawasan tertutup kecuali di bawah pengawasan perubatan.

Kesan Sampingan

Kadang-kadang, Micoderm HC Ointment boleh menyebabkan ruam kulit, kerengsaan dan melepuh pada sesetengah orang sensitif. Penyusutan kulit dan tanda peregangan kulit boleh berlaku selepas penggunaan yang panjang.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (Public Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety).

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Micoderm HC Ointment

Penyimpanan

- Simpan di bawah 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya.
- Jauhkan daripada capaian kanak-kanak

Pelupusan

Jangan guna ubat ini selepas tarikh luput. Tarikh luput selalunya dicetak pada label dan kotak ubat.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Micoderm HC Ointment adalah salap putih licin yang tidak berminyak.

- Bahan-bahan

- Bahan-bahan aktif
Miconazole Nitrate 2%w/w dan Hydrocortisone Acetate 1%w/w

- Bahan-bahan tidak aktif
Benzyl alcohol, Hydrogenated Polyisobutene, Menthol, Isopropyl Myristate, Cetomacrogol Emulsifying Wax, White Soft Paraffin, Butylated Hydroxytoluene, Cetostearyl Alcohol, N-methyl-2- pyrrolidone, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Hard Paraffin Wax, Propylene Glycol.

- MAL Number:

MAL08091414AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

WINWA MEDICAL SDN. BHD.
1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,
Taman I.K.S. Bukit Minyak,
14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

21/11/2017

Nomber Siri:

NPRA(R4/1)161117/00319