

SCABEX CREAM

Crotamiton (10% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Scabex Cream.
2. Bagaimana Scabex Cream berfungsi.
3. Sebelum menggunakan Scabex Cream.
4. Cara menggunakan Scabex Cream.
5. Semasa menggunakan Scabex Cream.
6. Kesan-kesan sampingan.
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Scabex Cream.
8. Maklumat lanjut.
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk.
10. Tarikh kemaskini RiMUP.

Apakah kegunaan Scabex Cream

Scabex Cream digunakan untuk melegakan kegatalan pada kulit yang disebabkan oleh pruritus (gatal-gatal), ekzema, ruam panas, gigitan/sengat nyamuk dan serangga-serangga lain.

Bagaimana Scabex Cream berfungsi

Bahan aktif di dalam Scabex Cream digunakan secara meluas dalam rawatan penyakit pruritus (gatal-gatal). Dengan melegakan kegatalan, ia menghalang kerosakan pada kulit akibat daripada tindakan menggaru dan dengan secara langsung mengurangkan risiko kepada jangkitan sekunder. Scabex Cream juga berkesan dalam menyekat pertumbuhan beberapa jenis bakteria gram positif.

Sebelum menggunakan Scabex Cream

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan guna Scabex Cream jika:

- Anda alergi atau hipersensitif pada bahan aktif produk ini.
- Anda mengalami penyakit kulit atau keradangan kulit.
- Ia tidak dipreskripsikan oleh doktor atau ahli farmasi bertauliah kepada anda.
- Anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

- Anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

-Sebelum menggunakan Scabex Cream

Sebelum anda mengguna Scabex Cream anda perlu memaklumkan kepada doktor anda jika:

- Anda alergi pada ubat-ubatan, makanan dan pewarna.
- Anda mengambil ubat-ubatan lain (termasuk yang tidak dipreskripsikan oleh doktor anda).

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan. Ia mungkin selamat bagi anda untuk mengguna Scabex Cream dan doktor akan menentukan apa yang sesuai untuk anda.

Cara menggunakan Scabex Cream

-Berapa banyak harus digunakan

Arahan penggunaan

Sapu pada tempat yang dijangkiti beberapa kali sehari sehingga tiada gatal-gatal lagi.

-Bila perlu digunakan

Doktor anda akan menentukan sekiranya anda perlu mengguna Scabex Cream.

-Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Guna dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu sehingga penggunaan dos seterusnya dan langkau dos yang terlepas.

Jangan guna dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terguna dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Scabex Cream

-Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Scabex Cream.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda disahkan hamil semasa menggunakan ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi Scabex Cream dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

- Elakkan terkena pada mata.
- Krim ini tidak sepatutnya digunakan berhampiran membran mukus atau bahagian kulit yang luka.
- Anda dinasihatkan untuk berjumpa dengan doktor sekiranya tanda-tanda sakit berterusan selama lebih daripada 5 hari.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Scabex Cream boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua

SCABEX CREAM

Crotamiton (10% w/w)

orang mendapatnya. Kesan-kesan sampingan berikut telah dilaporkan:

- Kepekaan kulit.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web np.ra.moh.gov.my (*Public* → *Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Scabex Cream

-Penyimpanan

Jauhkan Scabex Cream dari jangkauan kanak-kanak.

Pastikan bekas tertutup rapat. Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya.

-Pelupusan

Jangan guna Scabex Cream melebihi tarikh luput yang dicetak pada kotak. Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Scabex Cream adalah krim berwarna putih, larut dalam air dan mengandungi menthol.

-Bahan-bahan kandungan

Bahan Aktif:

Crotamiton

Bahan Tidak Aktif:

Cremophor A6, Cremophor A25, Propylene Glycol, Dehydag Wax "O", Purified Water, Benzyl Alcohol, Liquid Paraffin, Menthol Crystal dan Sodium Dihydrogen Phosphate Anhydrous.

-MAL Number

MAL1911424XZ

Pengilang dan pemegang pendaftaran produk

Kotra Pharma (M) Sdn Bhd
No. 1, 2 & 3, Jalan TTC 12,
Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

24/11/2017

Nombor siri

NPRA(R4/1)301017/00297