

# ANTIFLAM RUB

Methyl salicylate (28.3% w/w)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Antiflam
2. Bagaimana Antiflam berfungsi
3. Sebelum menggunakan Antiflam
4. Cara menggunakan Antiflam
5. Semasa menggunakan Antiflam
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Antiflam
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan Antiflam

Ia digunakan untuk melegakan kesakitan sendi dan otot akibat daripada arthritis, sakit belakang, sakit reumatik, terseliuh dan ketegangan.

## Bagaimana Antiflam berfungsi

Methyl salicylate mempunyai sifat mengurangkan keadaan sakit dan inflamatori.

## Sebelum menggunakan Antiflam

### - Bila tidak boleh mengguna

- alahan terhadap methyl salicylate, atau ramuan-ramuan lain dalam Antiflam .

### - Sebelum mula mengguna

Berhati-hati jika anda sensitive kepada acetylsalicylic acid. Kandungan methyl salicylate dalam produk ini akan diserap ke dalam darah melalui kulit apabila disapu. Jika anda sedang mengambil ubat warfarin (untuk menghalang pembekuan darah), penggunaan berlebihan pada kulit untuk sakit sendi atau otot akan meningkatkan kejadian pendarahan.

### - Jika mengambil ubat-ubat lain

Ubat ini adalah untuk kegunaan luar sahaja dan biasanya kurang kesan ke atas ubat-ubat lain. Walaupun demikian, sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika sedang mengambil ubat-ubat lain.

## Cara menggunakan Antiflam

### - Berapa banyak harus diguna

Sapu pada bahagian berkenaan 2 – 3 kali sehari.

### - Bila perlu diguna

Sila ikut nasihat doktor atau ahli farmasi.

### - Berapa lama perlu diguna

Perlu mengikut nasihat doktor atau ahli farmasi.

### - Jika terlupa mengguna

Guna sebaik sahaja teringat. Selepas itu, gunakan semula mengikut jadual biasa anda.

### - Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Jika terlebih dos, hubungi doktor, jabatan kecemasan atau pusat racun dengan segera.

## Semasa menggunakan Antiflam

### - Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor ubat yang sedang diambil.

### - Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengguna ubat sebaik sahaja berasa lega selepas beberapa hari, sambung sehingga jangka rawatan selesai.

### - Perkara yang perlu diberi perhatian

Jikalau hamil atau menyusukan anak, beritahu doktor atau ahli farmasi.

## Kesan-kesan sampingan

Methyl salicylate mungkin menyebabkan simptom sakit kepala, pening, bunyi dalam telinga, kesukaran pendengaran, penglihatan kabur, keletihan, kekeliruan mental, mengantuk, perpeluhan, dahaga, pernafasan cepat, loya, muntah dan kadangkala cirit-birit.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel:03-78835550, atau laman web [npra.moh.gov.my](http://npra.moh.gov.my) (*Public* → *Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety*).

## Cara penyimpanan dan pelupusan Antiflam

### - Penyimpanan

Simpan di tempat yang dingin dan kering. Jauhkan dari cahaya. Jauhkan dari kanak-kanak.

### - Pelupusan

Dapatkan nasihat ahli farmasi cara pelupusan ubat yang ingin dibuang.

## Maklumat lanjut

### - Rupa dan warna produk

Krim warna putih.

### - Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif: methyl salicylate  
- Bahan tidak aktif: menthol, minyak eucalyptusl, cetomacrogol emulsifying wax, tween 80, chlorocresol, hard paraffin, cetostearyl alcohol, sodium citrate, citric acid dan air

### - Nombor MAL:

MAL19986558X

## Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.  
1505, Lorong Perusahaan Utama 1  
Taman Perindustrian Bukit Tengah  
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang,  
Malaysia.

## Tarikh kemaskini RiMUP

04/12/2017

## Nombor siri

NPRA(R4/1)301117/00330