

PEPZEN TABLET

Serratiopeptidase (5mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Pepzen
2. Bagaimana Pepzen berfungsi
3. Sebelum menggunakan Pepzen
4. Cara menggunakan Pepzen
5. Semasa menggunakan Pepzen
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Pepzen
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Pepzen

Ia digunakan sebagai rawatan bersama untuk menghilangkan pembengkakan inflamatori dan pembengkakan dalam keadaan inflamatori sinus, inflamatori selepas kecederaan serious dan membantu pengeluaran kahak dalam inflamatori saluran pernafasan dan asma.

Bagaimana Pepzen berfungsi

Serratiopeptidase ialah enzim daripada microorganisma Serratia sp. Ia menguraikan benalir abnormal dari luka, dan membantu pengaliran pada tempat inflamatori. Ia juga melancarkan pengeluaran kahak, nanah dan bekuan darah dengan menguraikan dan mencairkan rembesan mukus dan bekuan darah.

Sebelum menggunakan Pepzen

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Pepzen jika alergi kepada bahan aktif dan tidak aktif yang terkandung dalam keluaran ini.

- Sebelum menggunakan Pepzen

Beritahu doktor jika mempunyai gangguan bekuan darah atau menyusukan anak. Keselamatan penggunaan dalam ibu yang menyusukan anak belum dipastikan lagi.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda sedang mengambil ubat untuk menghalang bekuan darah, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Pepzen

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: Oral, 1 – 2 tablet tiga kali sehari, atau seperti yang diarahkan. Kanak-kanak: seperti yang diarahkan oleh doktor. Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan(terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan.

Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Pepzen

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor. Maklumkan kepada doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda menggunakan Pepzen. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Pepzen dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Penggunaan Pepzen harus diberi perhatian teliti semasa hamil. Kesan baik dan buruk daripada ubat ini kepada bayi harus dinilai.

Kesan-kesan sampingan

Gangguan gastrousus kadangkala mungkin berlaku. Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan adwers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Adwers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel:03-78835550, atau laman web np.ra.moh.gov.my (Public → Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety).

Cara penyimpanan dan pelupusan Pepzen

- Penyimpanan

Simpan di tempat yang dingin dan kering, bawah suhu 30°C. Jauhkan dari cahaya. Jauhi ubat daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet bulat warna kuning muda, dwicembung dan bersalut enterik.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif: serratiopeptidase.
- Bahan tidak aktif: lactose DC, microcrystalline cellulose, magnesium stearate, eudragit, sodium hydroxide solution, deionised water, talc, titanium dioxide, carbowax, silbione, sunset yellow lake.

- Nombor MAL

MAL19930277X

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.
1505, Lorong Perusahaan Utama 1
Taman Perindustrian Bukit Tengah
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang,
Malaysia.

Tarikh kemaskini

04/12/2017

Nombor siri

NPRA(R4/1)011217/00336