

HUXLEY'S WINTOGENO EXTRA CREAM

Methyl Salicylate/menthol (15% w/w / 4% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Wintogeno
2. Bagaimana Wintogeno berfungsi
3. Sebelum menggunakan Wintogeno
4. Cara menggunakan Wintogeno
5. Semasa menggunakan Wintogeno
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Wintogeno
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Wintogeno

Krim Wintogeno mengandungi aktif adalah menthol dan methyl salicylate.

Wintogeno boleh digunakan untuk melegakan gejala:

- Sakit otot
- Kekakuan
- Sakit lebam
- Terseliuh

Bagaimana Wintogeno berfungsi

Krim Wintogeno adalah analgesik topikal. Ia berfungsi dengan melegakan kesakitan ringan buat sementara waktu.

Sebelum menggunakan Wintogeno

-Bila tidak boleh menggunakan

- Jangan gunakan jika anda mempunyai hipersensitiviti terhadap menthol atau methyl salicylate atau bahan-bahan lain.

-Sebelum mula menggunakan

Beberapa keadaan perubatan boleh berinteraksi dengan krim menthol dan methyl salicylate.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai sebarang masalah kesihatan, terutamanya jika mana-mana daripada yang berikut terjadi pada anda:

- jika anda mengandungi, merancang untuk mengandungi, atau menyusukan bayi

- jika anda mengambil mana-mana ubat yang dipreskripsikan atau tanpa preskripsi, penyediaan herba, atau makanan tambahan
- jika anda mempunyai alahan kepada ubat-ubatan, makanan, atau bahan-bahan lain
- jika anda mempunyai reaksi alahan kepada aspirin atau lain-lain salicylate
- jika anda terluka atau kulit anda tercedera

-Jika menggunakan ubat-ubat lain

Bagi orang yang mengambil warfarin, penggunaan yang berlebihan boleh meningkatkan peluang pendarahan.

Tanya pengamal perubatan kesihatan anda jika krim menthol/methyl salicylate boleh berinteraksi dengan ubat-ubatan lain yang anda ambil. Semak dengan doktor anda sebelum anda bermula, berhenti, atau menukar dos ubat-ubatan.

Cara menggunakan Wintogeno

-Berapa banyak harus digunakan

Sedikit krim Wintogeno perlu diurut ke atas kulit dengan tapak tangan sehingga kawasan itu hampir kering, gunakan lebih krim sekiranya perlu. Kawasan ini perlu sebaik-baiknya ditutup dengan flanel yang kering dan panas.

-Bila perlu digunakan

Krim Wintogeno ini boleh digunakan 2-3 kali sehari.

-Berapa lama perlu digunakan

Ikut tempoh yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda

-Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlepas satu dos krim menthol/methyl salicylate, gunakan ia sebaik sahaja anda ingat. Terus menggunakan ia seperti yang diarahkan oleh doktor anda atau arahan pada label pek.

-Jika menggunakan berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Gejala-gejala penggunaan berlebihan termasuk pening, bunyi deringan, pekak, berpeluh, mual dan muntah, sakit kepala, dan kekeliruan mungkin berlaku.

Semasa menggunakan Wintogeno

-Perkara yang perlu dilakukan

- Produk ini adalah untuk kegunaan luaran sahaja. Jika keadaan menjadi lebih teruk, atau jika gejala berterusan selama lebih dari 7 hari atau sudah sembuh tetapi berlaku sekali lagi dalam masa beberapa hari, sila berhenti penggunaan produk ini dan berjumpa dengan doktor.

- Basuh tangan anda selepas menggunakan krim menthol /methyl salicylate.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan guna pada luka atau kulit yang tercedera.
- Jangan sapu pada kawasan yang luas atau guna di bawah pembalut kedap.
- Jangan gunakan semasa hamil atau semasa menyusui.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Tanya doktor anda apa-apa soalan yang anda mungkin ada tentang bagaimana untuk menggunakan krim menthol / methyl salicylate.

Kesan-kesan Sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Huxley's Wintogeno Extra Cream boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

HUXLEY'S WINTOGENO EXTRA CREAM

Methyl Salicylate/menthol (15% w/w / 4% w/w)

Beberapa kesan sampingan yang mungkin berlaku ialah:

- Iritasi kulit
- kemerahan atau bengkak
- rasa pedih atau menyengat.

Kesan sampingan yang lain yang jarang berlaku, seperti:

- pening
- mual

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (*Public Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety*)

Cara penyimpanan dan pelupusan Wintogeno

-Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C.

Jauhi daripada kanak-kanak.

-Pelupusan

Jangan gunakan ubat itu apabila telah lepas tarikh luputnya.

Sila pulangkan krim yang belum digunakan kepada ahli farmasi anda untuk dilupuskan. Hanya simpan krim jika doktor anda menasihatkannya. Jangan buang ubat tersebut di dalam sisa buangan atau bersama-sama dengan sampah-sarap rumah. Tindakan ini boleh membantu melindungi alam persekitaran.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Krim Wintogeno adalah krim khas, tidak berminyak dan berwarna putih hingga putih kekuningan.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan-bahan aktif

Methyl salicylate 15%w/w,
Menthol 4%w/w

-Bahan bukan aktif

Methyl paraben, Propyl paraben,
White Vaseline, Cetostearyl
alcohol, Isopropyl Myristate,

Cetomacrogol 1000,
Nonivamide, Purified Water.

-Nombor MAL

MAL07021538X

Pengilang

PT Actavis Indonesia
Jl. Raya Bogor Km 28
Jakarta 13710 Indonesia

Pemegang Pendaftaran Produk

Actavis Sdn Bhd
Lot No. 8F-1B, 8th Floor,
Tower 4 @ PFCC, Jalan Puteri
1/2,
Bandar Puteri, 47100 Puchong,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

19/01/2018

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)170118/00016