

Domperidone (1mg/ml)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Motigut Suspension*
2. Bagaimana *Motigut Suspension* berfungsi
3. Sebelum mengambil *Motigut Suspension*
4. Cara menggunakan *Motigut Suspension*
5. Semasa menggunakan *Motigut Suspension*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Motigut Suspension*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan *Motigut Suspension*

Senak dikaitkan dengan refluks gastrik atau keradangan esofagus, kembung perut, sakit perut, pembuangan gas, loya dan muntah, atau pedih ulu hati.

## Bagaimana *Motigut Suspension* berfungsi

*Motigut Suspension* mengandungi domperidone dengan sifat anti-emetik (menghentikan muntah). Ia juga meningkatkan pengosongan gastrik.

## Sebelum mengambil *Motigut Suspension*

- Bila tidak boleh mengambil  
Jangan gunakan *Motigut Suspension* jika:
  - Anda alah kepada domperidone atau mana-mana bahan dalam ubat ini.
  - Anda mempunyai pendarahan, tersumbat atau lubang dalam perut.
  - Anda mempunyai tumor pituitari yang mengeluarkan prolaktin.
  - Anda mempunyai intoleransi *sorbitol*

## Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil *Motigut Suspension* jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil *Motigut Suspension* jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

## - Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika:

- Ia adalah untuk bayi atau kanak-kanak kecil
- Anda mempunyai masalah hati
- Anda mempunyai masalah buah pinggang
- Anda mempunyai penyakit jantung
- Anda mempunyai paras kalium rendah atau tinggi atau tahap magnesium yang rendah.

## - Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Adalah sangat penting untuk memberitahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil mana-mana yang berikut:

- Perencat CYP3A4 (contoh: ketoconazole (antikulat), ritonavir (antiviral) dan erythromycin (antibiotik))
- Ubat yang menjejaskan keputusan ECG

## Cara menggunakan *Motigut Suspension*

### - Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Dewasa dan remaja  $\geq 12$  tahun dan kanak-kanak beratnya  $\geq 35$  kg:

10ml

Bayi dan kanak-kanak  $<12$  tahun, dewasa dan remaja beratnya  $<35$  kg:

0.25 mg/kg

### - Bila perlu digunakan

Perlu diambil 3-4 kali sehari atau ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Bagi orang yang mengalami masalah buah pinggang, kekerapan dos *Motigut* perlu dikurangkan kepada sekali atau dua kali sehari.

Adalah disyorkan untuk mengambil *Motigut* 15-30 minit sebelum makan.

## - Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

## - Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

## - Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan mengantuk, disorientasi dan reaksi *extrapyramidal* (pergerakan otot secara tidak terkawal, kehilangan pergerakan terutamanya kanak-kanak).

## Semasa menggunakan *Motigut Suspension*

### - Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan *Motigut Suspension*

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

### - Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi *Motigut Suspension* dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian  
*Memandu dan menggunakan jentera*  
Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera, Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Ubat suspensi ini mengandungi sorbitol dan mungkin tidak sesuai untuk orang yang tidak toleransi kepada sorbitol.

Berhenti mengambil domperidone dan berbincang dengan doktor anda jika anda mempunyai degupan jantung yang tidak teratur

#### Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, *Motigut Suspension* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan sampingan boleh merangkumi tindak balas alergi, meningkatkan pengeluaran susu, kesan *extrapyramidal*, kekejangan usus sementara, geligata, pembesaran payudara, ketiadaan haid dan lain-lain.

Kesan sampingan yang sangat jarang termasuk degupan jantung yang tidak normal, perubahan ECG, dan kehilangan fungsi jantung yang tiba-tiba.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web <http://npra.moh.gov.my/> (*Public* → *Reporting Side Effects to*

*Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*

#### Cara penyimpanan dan pelupusan *Motigut Suspension*

- Penyimpanan  
Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan dibawah suhu 30°C.

- Pelupusan  
Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

#### Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk  
Ampaian putih berperisa raspberi-pisang yang mempunyai rasa manis, diisi dan dimeterai dalam botol PET amber dengan penutup putih dicetak SQUARE.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif  
Domperidone
- Bahan tidak aktif  
Sorbitol liquid non crystallizable  
Dispersible cellulose (mengandungi microcrystalline cellulose dan carmellose sodium)  
Methyl p-hydroxybenzoate  
Propyl phydroxybenzoate  
Glycerol  
Sodium saccharin  
Polyxyl 40 hydrogenated castor oil  
Banana liquid  
Raspberry liquid  
Purified water

- Nombor MAL  
MAL10120032AZ

#### Pengilang

Square Pharmaceuticals Ltd.  
Square Road, Salgaria,  
Pabna, Bangladesh

#### Pemegang Pendaftaran Produk

Medispec (M) Sdn Bhd  
55 & 57, Lorong Sempadan 2  
11400 Ayer Itam, Penang, Malaysia

**Tarikh kemaskini RiMUP**  
22.2.2018

**Nombor Siri**  
NPRA(R4/1)240118/00022