

Zynor Tablet 5mg: Each tablet contains Amlodipine 5mg (as Amlodipine Besylate)

Zynor Tablet 10mg: Each tablet contains Amlodipine 10mg (as Amlodipine Besylate)

In this leaflet

- *What is Zynor used for*
- *How Zynor works*
- *Before you take Zynor*
- *How to take Zynor*
- *While you are taking Zynor*
- *Possible side effects*
- *How should you keep Zynor*
- *Product description*

What is Zynor used for

It is used to treat high blood pressure (hypertension) and the condition where there is a reduced blood supply of the heart muscle (myocardial ischemia).

How Zynor works

Amlodipine belongs to a group of medicines known as calcium antagonist. It dilates the blood vessels by muscle relaxing. Once the blood vessels are dilated, blood is able to pass through easily and thereby improve blood supply to the heart muscle.

Before you take Zynor

When you must not take it

Do not take this medicine if you:

- are allergic (hypersensitive) to amlodipine, dihydropyridines (a group of medicines where calcium antagonist belonged to) or any of the excipients in this medicines.
- experience cardiogenic shock (the heart is unable to supply sufficient blood to the body).
- have narrowing of the aortic heart valve (aortic stenosis).
- have unstable chest pain (excluding Prinzmetal's angina which occurs at rest, and often without a predictable pattern).

Before start to take it

Tell your doctor or pharmacist if you have:

- severe aortic stenosis.
- heart failure
- impaired liver function
- are pregnant or plan to pregnant.
- are breast feeding or plan to start breast feeding.

Taking other medicines

Tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without prescription.

How to take Zynor

How much to use

Adults

Initial dose of 5 mg once daily, which may be increased to maximum dose of 10mg depending on patient's response.

Not recommended for children.

Your doctor or pharmacists will prescribe other doses based on individual conditions.

When to take it

To be taken with or without food

How long to take it

Follow the prescription from your doctor or pharmacist.

Ask your doctor or pharmacist before prolonged using this medicine.

If you forgot to take it

Take it as soon as you remember, unless it is nearly time for your next dose, skip the missed dose. Then go on as before. Never double up on the next dose to make up for the one missed.

If you take too much

Signs that may occur include excessive blood vessels dilation, abnormal heart beat and severe drop in blood pressure.

Contact a doctor or pharmacist immediately if you have taken too many tablets.

While you are taking Zynor

Things you must do

Always wash your hand before handle the tablets. Take the tablets with water and try to take at the same time each day.

Things you must not do

Do not chew the tablet and swallow it with water.

Do not take this medicine by yourself without prescription from your doctor or pharmacist.

Things to be careful of

Tell your doctor or pharmacist if you:

- are allergic to dihydropyridines, amlodipine and any of the ingredients.
- are pregnant or plan to pregnant.
- are breast-feeding or plan to start breast-feeding.
- have heart and/or liver failure

Possible side effects

- Headache, dizziness or drowsiness
- General swelling (oedema)
- Fatigue
- Nausea
- Abdominal pain
- Abnormal heart beat (palpitation)
- Skin and face redness

Seek immediate medical attention if you experience any side effects or allergic reactions.

How should you keep Zynor

Store at room temperature below 30°C.

Keep out of reach of children

Do not use this medicine after the expiry date.

Product Description

How Zynor looks like

Available in blister strips of 10's in packing of 30 tablets per box

Zynor Tablet 5mg

White colour, oval shape (8.5mm x 5.0mm) normal convex tablet, engraved with "A5" and break line on one side and plain on the reverse.

Zynor Tablet 10mg

White colour, oval shape (11.0mm x 6.0mm) normal convex tablet, engraved with "XS" and break line on one side and plain on the reverse.

What Zynor contains

Both *Zynor Tablet 5mg* and *Zynor Tablet 10mg* contain Amlodipine 5mg and Amlodipine 10mg respectively.

Other ingredients are Colloidal Silicone Dioxide, Maize Starch, Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate.

Manufactured and Marketed by

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd
1-5 Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka,
Malaysia.

Registration Number

Zynor Tablet 5mg: MAL06051322A
Zynor Tablet 10mg: MAL06051323A

Date of revision: 17 August 2012

Zynor Tablet 5mg: Setiap tablet mengandungi Amlodipine 5mg (sebagai Amlodipine Besylate)
Zynor Tablet 10mg: Setiap tablet mengandungi Amlodipine 10mg (sebagai Amlodipine Besylate)

Apakah yang ada pada risalah ini

- *Apakah kegunaan Zynor*
- *Bagaimana Zynor berfungsi*
- *Sebelum mengambil Zynor*
- *Cara mengambil Zynor*
- *Semasa mengambil Zynor*
- *Kesan-kesan sampingan*
- *Cara penyimpanan Zynor*
- *Deskripsi produk*

Apakah kegunaan Zynor

Ia digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi (hipertensi) dan keadaan di mana bekalan darah ke otot jantung berkurangan (*myocardial ischemia*).

Bagaimana Zynor berfungsi

Amlodipine adalah ubat tergolong dalam kumpulan calcium antagonist. Ia mengembangkan saluran darah dengan mengurangkan ketegangan otot. Apabila saluran darah mengembang, darah dapat mengalir dengan mudah dan ini dapat meningkatkan bekalan darah ke otot jantung.

Sebelum mengambil Zynor

Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil ubat ini jika:

- alahan (hipersensitif) terhadap Amlodipine, dihydropyridines (kumpulan ubat calcium antagonis) atau bahan-bahan lain yang terkandung di dalam ubat ini.
- pernah mengalami kejutan kardiogenik (jantung tidak dapat membekalkan darah yang mencukupi ke badan).
- mempunyai masalah penyempitan injap aorta jantung (aortic stenosis).
- mengalami sakit dada yang tidak tetap (tidak termasuk angina Prinzmetal yang berlaku semasa rehat, dan biasanya tidak dapat diramal).

Sebelum mula mengambil

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi sekiranya anda:

- mengalami aortic stenosis yang serius.
- mengalami kegagalan fungsi jantung.
- kerosakan fungsi hati.
- hamil atau merancang untuk hamil.
- sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusukan.

Jika mengambil lain-lain ubat

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang atau kebelakangan ini mengambil ubat lain. Ini termasuk sebarang ubat tanpa preskripsi.

Cara mengambil Zynor

Berapa banyak harus diambil

Dewasa

Dos permulaan 5 mg sekali sehari, di mana boleh ditambah kepada dos maksimum 10mg bergantung kepada respon pesakit.

Ubat ini tidak disyorkan untuk kanak-kanak.

Doktor atau ahli farmasi akan preskrip dos berlainan berdasarkan kepada keadaan individu.

Bila perlu diambil

Diambil sebelum makan atau selepas makan.

Berapa lama perlu diambil

Berdasarkan preskripsi doktor atau ahli farmasi.

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini untuk tempoh masa yang lebih panjang.

Jika anda terlupa mengambil

Ambil secepat mungkin apabila anda teringat. Jika dos seterusnya adalah hampir, ambil dos yang seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

Jika mengambil berlebihan

Tanda-tanda yang mungkin berlaku termasuk pengembangan salur darah berlebihan, denyutan jantung yang tidak normal dan penurunan tekanan darah secara mendadak. Hubungi doktor atau ahli farmasi dengan segera sekiranya anda terambil pil secara berlebihan.

Semasa mengambil Zynor

Perkara yang harus dilakukan

Sentiasa cuci tangan sebelum mengambil tablet. Makan tablet bersama air dan cuba mengambilnya pada waktu yang sama setiap hari.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan kunyah tablet. Telan tablet dengan air. Jangan ambil ubat ini tanpa preskripsi doktor atau ahli farmasi.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- alahan kepada dihydropyridines, amlodipine dan bahan lain yang terkandung di dalam ubat ini.
- hamil atau merancang untuk hamil.

- sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusukan.
- mempunyai masalah kegagalan jantung dan/atau hati.

Kesan-kesan sampingan

- Sakit kepala, pening atau mengantuk.
- bengkak (edema).
- Keletihan.
- Loya.
- Sakit perut.
- Denyutan jantung yang tidak normal (palpitation).
- Kemerahan pada kulit dan muka.

Dapatkan rawatan perubatan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan atau masalah alahan.

Cara penyimpanan Zynor

Simpan di bawah suhu 30°C.

Jauhi dari kanak-kanak.

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput.

Deskripsi produk

Rupa dan warna produk

Terdapat dalam blister strips 10's di dalam kotak bungkusan 30 tablet.

Zynor Tablet 5mg

Tablet putih, berbentuk bujur cembung (8.5mm x 5.0mm), dengan ukiran "A5" dan garis tengah pada satu belah dan tanpa garis pada sebelah yang lain.

Zynor Tablet 10mg

Tablet putih, berbentuk bujur cembung (11.0mm x 6.0mm), dengan ukiran "XS" dan garis tengah pada satu belah dan tanpa garis pada sebelah yang lain.

Bahan-bahan kandungan

Kedua-dua *Zynor Tablet 5mg* dan *Zynor Tablet 10mg* mengandungi Amlodipine 5mg dan Amlodipine 10mg.

Bahan-bahan kandungan lain ialah Colloidal Silicone Dioxide, Maize Starch, Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate.

Dikilangkan dan dipasarkan oleh

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd
1-5 Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka,
Malaysia.

Nombor pendaftaran

Zynor Tablet 5mg: MAL06051322A

Zynor Tablet 10mg: MAL06051323A

Tarikh kemaskini: 17 Ogos 2012