

**Zylova Tablet 50mg:** Each tablet contains Losartan Potassium 50mg.

**Zylova Tablet 100mg:** Each tablet contains Losartan Potassium 100mg.

#### **In this leaflet:**

- *What is Zylova used for*
- *How Zylova works*
- *Before you take Zylova*
- *How to take Zylova*
- *While you are taking Zylova*
- *Possible side effects*
- *How should you keep Zylova*
- *Product description*

#### **What is Zylova used for**

It is used to:

- treat high blood pressure (hypertension)
- Reduce the risk of stroke in patients with high blood pressure and thickening of the left ventricle (one of two large chambers that collect and expel blood received in the heart).
- Protect the kidney in diabetic patients (Type 2, Non-insulin dependent) with high blood pressure.

#### **How Zylova works**

Losartan is in a group of medicines known as angiotensin-II receptor antagonists. Angiotensin-II is the hormone that binds to the receptor in blood vessels, where results in narrowing of blood vessels and subsequently raises blood pressure. Losartan inhibits the binding of angiotensin-II to these receptors.

#### **Before you take Zylova**

##### ***When you must not take it***

Do not take Zylova if you:

- are allergic (hypersensitive) to Losartan Potassium or any ingredients in this medicine.
- are pregnant or plan to pregnant.
- are breast-feeding or plan to start breast-feeding.

##### ***Before start to take it***

Tell your doctor or pharmacist if you:

- are allergic (hypersensitivity) to Losartan Potassium or any ingredients in this medicine.
- have low blood pressure
- have high potassium levels in your blood
- have liver or kidney impairment
- have history of angioedema (swelling of face, eyes, lips, tongue)
- are taking diuretics (drug that tends to increase discharge of urine).

##### ***Taking other medicines***

Tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without prescription.

#### **How to take Zylova**

##### ***How much to take***

##### ***Hypertension:***

The usual starting dose is 50mg once daily. Blood pressure lowering effect should be achieved 3-6 weeks after the treatment. Can be increased to 100mg once daily based on prescription.

##### ***Hypertensive with thickening of left ventricular:***

The usual starting dose is 50mg once daily. Can be increased to 100mg once daily based on prescription.

##### ***Diabetes (Type 2) with kidney abnormality***

The usual starting dose is 50mg once daily. Can be increased to 100mg once daily based on prescription.

##### ***When to take it***

To be taken with or without food.

##### ***How long to take it***

Follow the prescription from your doctor or pharmacist. Ask your doctor or pharmacist before prolonged use of this medicine.

##### ***If you forget to take it***

Take it as soon as you remember, unless it is nearly time for your next dose, skip the missed dose. Then go on as before. Never double up on the next dose to make up for the one missed.

##### ***If you take too much***

Symptoms of overdose include low blood pressure, abnormal heart beat (too fast or too slow).

Seek immediate medical attention if you have taken too much or worried with your conditions.

#### **While you are taking Zylova**

##### ***Things you must do***

Always wash your hand before handle the tablets. Take the tablets with water and try to take at the same time each day.

##### ***Things you must not do***

Do not chew the tablets and swallow it with water.

Do not take this medicine by yourself without prescription from your doctor or pharmacist.

##### ***Things to be careful of***

Tell your doctor or pharmacist if you:

- are allergic (hypersensitivity) to Losartan Potassium or any ingredients in this medicine.

- have increased potassium levels in blood.
- have kidney abnormality.
- are pregnant or plan to pregnant.
- are breast-feeding or plan to start breast-feeding.

#### **Possible side effects**

- Dizziness.
- Weak/ fatigue.
- Low blood pressure.
- High potassium levels in blood.
- Angioedema (swelling of face, eyes, lips, tongue).
- Diarrhoea.
- Abnormal liver function.
- Anaemia (deficiency in red blood cells).
- Muscle and joint pain.
- Cough.
- Skin rashes and itchiness.

Seek immediate medical attention if you experience any side effects or allergic reactions.

#### **How should you keep Zylova**

Store below 30 °C. Protect from light.

Keep out of the reach of the children.

Do not use this medicine after the expiry date.

#### **Product Description**

##### ***How Zylova looks like***

##### ***Zylova Tablet 50mg:***

White, normal convex, oval film-coated tablet.

Available in blister strips of 10's in packing of 10, 30, 60 and 100 tablets per box.

##### ***Zylova Tablet 100mg:***

White, normal convex, round film-coated tablet.

Available in blister strips of 10's in packing of 10, 30, 60 and 100 tablets per box

##### ***What Zylova contains***

Both *Zylova Tablet 50mg* and *Zylova Tablet 100mg* contain Losartan Potassium 50mg and Losartan Potassium 100mg respectively.

Other ingredients are Starch, Microcrystalline Cellulose, Colloidal Silicon Dioxide, Quinoline Yellow, Magnesium Stearate, Opadry II, and Purified Water

##### ***Manufactured and Marketed by***

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd  
1-5 Cheng Industrial Estate,  
75250 Melaka,

Malaysia.

**Registration number**

*Zylova* Tablet 50mg: MAL09102921A

*Zylova* Tablet 100mg: MAL09100239A

**Date of Revision:** 17 August 2012

**Zylova Tablet 50mg:** Setiap tablet mengandung Losartan Potassium 50mg.

**Zylova Tablet 100mg:** Setiap tablet mengandung Losartan Potassium 100mg.

### **Apakah yang ada pada risalah ini:**

- *Apakah kegunaan Zylova*
- *Bagaimana Zylova berfungsi*
- *Sebelum mengambil Zylova*
- *Cara mengambil Zylova*
- *Semasa mengambil Zylova*
- *Kesan-kesan sampingan*
- *Cara penyimpanan Zylova*
- *Deskripsi produk*

### **Apakah kegunaan Zylova**

Ita digunakan untuk:

- merawat tekanan darah tinggi (Hipertensi)
- mengurangkan risiko strok di kalangan pesakit yang mempunyai tekanan darah tinggi dan penebalan ventrikel kiri (satu daripada dua ruang besar di dalam jantung yang bertindak mengumpul dan mengalih darah yang diterima).
- melindungi ginjal bagi pesakit yang mempunyai kencing manis (Type 2, Non-insulin dependent) dan mengalami tekanan darah tinggi.

### **Bagaimana Zylova berfungsi**

Losartan adalah ubat dalam kumpulan angiotensin-II reseptor antagonist. Angiotensin-II adalah hormon yang berpaut pada reseptor di dalam saluran darah, di mana ia menyempitkan saluran darah dan seterusnya meningkatkan tekanan darah. Losartan menghalang angiotensin II berpaut pada reseptor tersebut.

### **Sebelum mengambil Zylova**

***Bila tidak boleh mengambil***

Jangan ambil ubat ini jika anda:

- alahan (hipersensitif) terhadap Losartan Potassium atau bahan lain yang terkandung dalam ubat ini.
- hamil atau merancang untuk hamil.
- sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusu.

### **Sebelum mula mengambil**

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- alahan (hipersensitif) terhadap Losartan Potassium atau bahan lain yang terkandung dalam ubat ini.
- mempunyai tekanan darah yang rendah
- mempunyai paras potassium yang tinggi dalam darah
- mempunyai kerosakkan hati atau ginjal
- pernah mengalami angioedema (bengkak pada muka, mata, bibir, lidah)

- sedang mengambil diuretik (ubat yang meningkatkan penguapan air kencing).

### ***Jika mengambil lain-lain ubat***

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang atau kebelakangan ini mengambil ubat lain. Ini termasuk sebarang ubat tanpa preskripsi.

### **Cara mengambil Zylova**

***Berapa banyak harus diambil***

***Hipertensi:***

Dos permulaan biasanya adalah 50mg sekali sehari. Penurunan tekanan darah harus dicapai dalam tempoh masa 3 hingga 6 minggu selepas rawatan. Dos boleh ditingkatkan kepada 100mg sekali sehari berdasarkan preskripsi.

***Hipertensi dengan penebalan ventrikular kiri:***

Dos permulaan biasanya adalah 50mg sekali sehari. Dos boleh ditingkatkan kepada 100mg sekali sehari berdasarkan preskripsi.

***Kencing manis (Type 2, Non-insulin dependent) dengan fungsi ginjal yang tidak normal***

Dos permulaan biasanya adalah 50mg sekali sehari. Dos boleh ditingkatkan kepada 100mg sekali sehari berdasarkan preskripsi.

***Bila perlu diambil***

Diambil sebelum atau selepas makan.

***Berapa lama perlu diambil***

Berdasarkan preskripsi doktor atau ahli farmasi. Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini untuk tempoh masa yang lebih panjang.

***Jika anda terlupa mengambil***

Ambil secepat mungkin apabila anda teringat. Jika dos seterusnya adalah hampir, ambil dos yang seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

***Jika mengambil berlebihan***

Simptom-simptom dos berlebihan termasuk tekanan darah rendah dan denyutan jantung yang tidak normal (terlalu cepat atau terlalu perlahan). Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda terambil secara berlebihan atau bimbang dengan keadaan yang dialami.

### **Semasa mengambil Zylova**

***Perkara yang harus dilakukan***

Sentiasa cuci tangan sebelum mengambil tablet. Makan tablet bersama air dan cuba mengambilnya pada waktu yang sama setiap hari.

***Perkara yang tidak harus dilakukan***

Jangan kunyah tablet. Telan tablet dengan air. Jangan ambil ubat ini tanpa preskripsi doktor atau ahli farmasi.

***Perkara yang perlu diberi perhatian***

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- alahan (hipersensitif) terhadap Losartan Potassium atau bahan lain yang terkandung dalam ubat ini.
- mempunyai peningkatan paras kalium di dalam darah.
- mempunyai fungsi ginjal yang tidak normal.
- hamil atau merancang untuk hamil.
- sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusu.

### **Kesan-kesan sampingan**

- Pening
  - Lemah / keletihan
  - Tekanan darah yang rendah
  - Paras kalium yang tinggi dalam darah
  - angioedema (bengkak pada muka, mata, bibir, lidah)
  - Cirit-birit
  - Fungsi hati yang tidak normal
  - Anaemia (kurang sel darah merah)
  - Sakit otot dan sendi
  - Batuk
  - Ruam pada kulit dan gatal-gatal
- Dapatkan rawatan perubatan dengan secepat mungkin jika anda mengalami sebarang kesan sampingan atau masalah alahan.

### **Cara penyimpanan Zylova**

Simpan di bawah 30°C. Lindungi dari cahaya.

Jauhi dari kanak-kanak.

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput.

### **Deskripsi produk**

***Rupa dan warna produk***

***Zylova Tablet 50mg:***

Tablet putih berbentuk bujur cembung dan bersalut lapis. Didapati dalam blister strips 10's di dalam kotak bungkusan 10, 30, 60 dan 100 tablet.

***Zylova Tablet 100mg:***

Tablet putih berbentuk bulat cembung dan bersalut lapis. Didapati dalam blister strips 10's di dalam kotak bungkusan 10, 30, 60 dan 100 tablet.

***Bahan-bahan kandungan***

Kedua-dua *Zylova Tablet 50mg* and *Zylova Tablet 100mg* masing-masing mengandungi Losartan Potassium 50mg dan Losartan Potassium 100mg.

Bahan-bahan kandungan lain ialah Starch, Microcrystalline Cellulose, Colloidal Silicon Dioxide, Quinoline Yellow, Magnesium Stearate, Opadry II, and Purified Water

***Dikilangkan dan dipasarkan oleh***

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd  
1-5 Cheng Industrial Estate,  
75250 Melaka,  
Malaysia.

***Nombor pendaftaran***

*Zylova Tablet 50mg*: MAL09102921A  
*Zylova Tablet 100mg*: MAL09100239A

***Tarikh kemaskini***: 17 Ogos 2012