

# INFLAFEN TABLET

Ibuprofen (200mg)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Inflafen Tablet
2. Bagaimana Inflafen Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Inflafen Tablet
4. Cara menggunakan Inflafen Tablet
5. Semasa menggunakan Inflafen Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Inflafen Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan Inflafen Tablet

Ibuprofen adalah kandungan aktif Inflafen Tablet.

Ibuprofen digunakan dalam rawatan kesakitan jenis ringan hingga sederhana dalam keadaan seperti senggugut, migrain, sakit selepas pembedahan, osteoarthritis (penyakit sendi), arthritis reumatoid (gangguan keradangan sistemik yang menjelaskan sendi), *ankylosing spondylitis* (penyakit radang kronik tulang), dan lain-lain gangguan otot tulang dan sendi seperti terseluh dan ketegangan.

## Bagaimana Inflafen Tablet berfungsi

Ibuprofen adalah sejenis “non-steroidal anti-inflammatory drug” (NSAID). Ia berfungsi dengan mengurangkan sejenis hormon yang dipanggil *prostaglandin* yang menyebabkan keradangan dan kesakitan dalam badan. Ia membantu badan manusia mengurangkan demam, kesakitan dan keradangan.

## Sebelum menggunakan Inflafen Tablet

### Bila tidak boleh menggunakan

- Jika anda hipersensitif terhadap ibuprofen atau bahan-bahan kandungan lain dalam Inflafen Tablet.
- Jika anda sensitif terhadap aspirin atau NSAIDs lain iaitu pada pesakit yang mengalami *bronchospasm* (pengecupan otot licin yang tidak normal pada bronkus), *angiodema* (bengkak di bawah permukaan kulit), polip hidung (ketumbuhan dalam hidung) atau urtikaria (gatal-gatal) dengan ubat atau orang-orang yang mempunyai sejarah asma.
- Jika anda mempunyai pendarahan aktif pada perut dan usus atau terdapat ulser pada perut.
- Jika anda hamil atau menyusu.

### Sebelum menggunakan Inflafen Tablet

Anda mesti beritahu doktor anda jika:

- Anda mempunyai gangguan pendarahan.
- Anda mempunyai penyakit jantung atau strok.
- Anda mempunyai penyakit buah pinggang atau hati.
- Anda menghidapi atau pernah menghidapi ulser, pendarahan atau penembusan pada perut dan usus.
- Anda menerima mana-mana ejen penipisan darah seperti *coumarin anticoagulant*.
- Anda mempunyai masalah penglihatan.
- Anda alergi terhadap mana-mana ubat-ubatan yang diambil sebelum ini untuk merawat keadaan sekarang.

- Anda hamil, sedang cuba untuk hamil atau berfikir anda mungkin hamil.
- Anda sedang menyusukan bayi. Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk nasihat sebelum mengambil sebarang ubat.

### Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor anda atau ahli farmasi jika anda sedang atau telah mengambil ubat berikut baru-baru ini:

- *ACE inhibitors*, ubat-ubatan untuk tekanan darah tinggi.
- *Cyclosporin*, ubat yang digunakan untuk pemindahan organ.
- *Lithium*, ubat untuk kemurungan.
- *Methotrexate*, sejenis ubat yang digunakan untuk merawat arthritis rheumatoid, serta beberapa jenis kanser.
- *4-Quinolone antibacterial*, ubat-ubatan untuk jangkitan.
- *Sulphonylureas*, ubat-ubatan untuk kencing manis.

Sentiasa beritahu doktor dan ahli farmasi anda jika anda mengambil ubat-ubatan lain, termasuk tonik herba, makanan tambahan dan ubat-ubatan yang anda beli tanpa preskripsi.

## Cara menggunakan Inflafen Tablet

Sentiasa mengambil ubat ini seperti yang diberitahu oleh doktor. Anda sepatutnya merujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda tidak pasti.

### Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: 1.2g-1.8g sehari secara pembahagian dos

Dos pengekalan: 0.6-1.2g sehari

Jika anda mempunyai masalah buah pinggang, doktor mungkin menetapkan dos yang lebih rendah untuk anda.

<p>Ibuprofen tidak boleh digunakan sebagai rawatan kendirian untuk kanak-kanak yang berumur kurang daripada 12 tahun melainkan di bawah nasihat doktor.</p>	<p>darah) dan tindak balas terhadap rangsangan sakit sahaja.</p>	<p>platelet darah rendah) pernah sekali-sekala diperhatikan.</p>
<p><b><u>Bila perlu digunakan</u></b> Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.</p>	<p><b>Semasa menggunakan Inflafen Tablet</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Risiko pada perut dan usus, ulcer, pendarahan, dan penembusan dengan NSAIDs.</b></li> </ul>
<p>Inflafen tablet boleh diambil dengan makanan atau susu untuk mengurangkan gangguan perut dan usus.</p>	<p>- <b><u>Perkara yang perlu dilakukan</u></b> Hubungi doktor jika anda bertambah buruk atau tiada perubahan.</p>	<p>Ketoksikan yang serius pada perut dan usus seperti pendarahan, pengulseran dan perforasi boleh berlaku pada bila-bila masa, dengan atau tanpa simptom amaran, dalam pesakit-pesakit yang dirawat dengan NSAID.</p>
<p><b><u>Berapa lama perlu digunakan</u></b> Terus menggunakan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.</p>	<p>- <b><u>Perkara yang tidak boleh dilakukan</u></b> Hubungi doktor sekiranya anda menjadi hamil semasa mengambil Inflafen Tablet.</p>	<p>Sekiranya mana-mana kesan sampingan betambah serius, atau anda mengalami kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.</p>
<p><b><u>Jika terlupa menggunakan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sekiranya anda terlupa satu dos, ambil dos itu sebaik sahaja anda teringat.</li> <li>Tetapi, sekiranya telah hampir masa untuk dos berikutnya, abaikan dos yang terlepas.</li> <li>Jangan mengambil dos berganda untuk menggantikan dos yang dilupa.</li> </ul>	<p>- <b><u>Perkara yang perlu diberi perhatian</u></b> Jangan beri Inflafen Tablet kepada orang lain walaupun simptom-simptom atau keadaan mereka serupa seperti anda. Doktor anda mempreskrib Inflafen Tablet untuk anda dan keadaan anda.</p>	<p>Berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai keraguan atau untuk maklumat selanjutnya.</p>
<p><b><u>Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)</u></b> Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan di hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.</p>	<p><b>Kesan-sampingan</b> Seperti ubat-ubat lain, Inflafen Tablet mempunyai kesan sampingan walaupun bukan semua orang mendapatnya. Kesan-sampingan berikut mungkin akan terjadi dengan ubat ini:</p>	<p>Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web <a href="http://portal.bpfk.gov.my">portal.bpfk.gov.my</a> (<i>Consumers→Reporting</i>)</p>
<p>Pengambilan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan mengantuk, <i>nystagmus</i> (pergerakan bola mata dengan pesat secara tidak sukarela), <i>apnea</i> (berhenti nafas), <i>cyanosis</i> (kulit biru kerana kekurangan oksigen di dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paling biasa: sakit perut.</li> <li>Lain-lain: sakit kepala, pening, gemuruh, gatal-gatal ringan atau ruam, perubahan pendengaran (seperti nada dalam telinga), bengkak pada pergelangan kaki/kaki/tangan, kemurungan, mengantuk, <i>insomnia</i> dan penglihatan kabur dan reaksi mata yang lain.</li> <li>Reaksi hipersensitiviti, ujian fungsi hati yang tidak biasa, kemerosotan fungsi buah pinggang, <i>agranulocytosis</i> (pengurangan sel darah putih) dan <i>thrombocytopenia</i> (kiraan</li> </ul>	<p>Cara penyimpanan dan pelupusan Inflafen Tablet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Penyimpanan</b> Jangan guna selepas tarikh tamat tempoh yang dinyatakan pada bungkusan. Tarikh tamat tempoh merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut.</li> </ul>

**Jauhi dari kanak-kanak.****Pelupusan**

Ubat-ubatan tidak seharusnya dilupuskan melalui sisa air atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda cara-cara pelupusan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini

akan membantu melindungi alam sekitar.

**Maklumat lanjut**

- Rupa dan warna produk  
Tablet ini berwarna putih, cembung, berbentuk bulat, diameter 9mm dengan garis skor serta tanda ‘MPI’.
- Bahan-bahan kandungan
  - Bahan aktif - Setiap biji tablet mengandungi 200mg Ibuprofen.
  - Bahan-bahan tidak aktif - Bahan-bahan kandungan lain termasuklah *microcrystalline cellulose pH10I*, *potato starch*, *sodium starch glycolate*, *stearic acid powder*, *colloidal silicone dioxide* dan *talc*.
- Nombor MAL  
MAL19900497AZ

**Pengilang dan Pemegang  
Pendaftaran Produk**

Malaysian Pharmaceutical Industries Sdn Bhd.  
Plot 14, Lebuhraya Kampung Jawa,  
11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang,  
Malaysia

**Tarikh kemaskini RiMUP**

30/10/2015

Nomborsiri:  
BPFK(R4/1)211015/00380