

LEVOQUIN FILM COATED CAPLET

Levofloxacin hemihydrates (250mg, 500mg)

Apa yang terdapat dalam risalah ini?

1. Apakah kegunaan Levoquin
2. Bagaimana Levoquin berfungsi
3. Sebelum mengambil Levoquin
4. Cara menggunakan Levoquin
5. Semasa menggunakan Levoquin
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Levoquin
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Levoquin?

Levoquin diperlukan untuk rawatan jangkitan yang disenaraikan di bawah.

- Sinus
- Paru-paru, dalam orang dengan masalah pernafasan jangka panjang atau pneumonia (radang paru-paru yang menyebabkan sesak nafas, batuk dan peningkatan suhu badan)
- Saluran kencing, termasuk ginjal atau pundi kencing anda
- Kelenjar prostat, komplikasi daripada jangkitan pada saluran kencing (ringan dan sederhana)
- Kulit dan di bawah kulit, termasuk otot. Ini kadang-kadang dipanggil tisu lembut

Bagaimana Levoquin berfungsi?

Levoquin film coated caplet mengandungi sesuatu ubat yang dikenali sebagai levofloxacin. Ia merupakan kumpulan ubat yang dikenali sebagai antibiotik. Levofloxacin adalah sesuatu ‘quinolone’ antibiotik. Ia berfungsi dengan membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan dalam badan anda.

Sebelum mengambil Levoquin

Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil ubat ini jika anda alergi terhadap levofloxacin atau antibakteria quinolone yang lain, atau mana-mana komponen produk ini.

Sebelum anda mula mengambil

Maklumkan pembekal khidmat kesihatan tentang segala keadaan perubatan anda, termasuk jika anda:

- mempunyai masalah tendon;
- mempunyai masalah sistem saraf pusat (seperti epilepsi);
- mempunyai atau sesiapa dalam keluarga anda mempunyai denyutan jantung yang tidak teratur; terutamanya keadaan yang dikenali sebagai “pemanjangan QT”;
- mempunyai masalah hati;
- mempunyai cirit-birit yang berkaitan dengan *Clostridium difficile*
- mempunyai neuropati periferal (saraf *peripheral nervous system* (mengandungi saraf selain daripada saraf di dalam otak dan tulang belakang) yang merosot)
- mempunyai masalah glukosa darah.

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan mengambil ubat ini jika:

- Anda mengandung, mungkin menjadi mengandung atau anda ingat anda berkemungkinan mengandung.
- Anda sedang menyusu atau merancang untuk menyusu.

Tanya doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil sebarang ubat jika anda mengandung atau sedang menyusu bayi.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan pembekal khidmat kesihatan tentang ubat yang anda sedang mengambil atau telah mengambil baru-baru ini, sebab levofloxacin boleh mempengaruhi fungsi ubat-ubat lain. Sesetengah ubat-ubat lain boleh mempengaruhi fungsi levofloxacin juga.

Terutamanya beritahu pembekal khidmat kesihatan anda jika anda mengambil:

- Tablet zat besi, magnesium atau antasid yang mengandungi aluminium atau sucrlafate. Ubatan ini harus diambil 2 jam sebelum atau selepas levofloxacin diambil.
- Theophylline – memanjangkan masa penghapusan separuh hayat mengakibatkan tahap theophylline dalam darah tinggi.
- Warfarin – mengakibatkan pendarahan.
- Cyclosporin – tiada pelarasan dos diperlukan.
- Ubat yang mempengaruhi denyutan jantung anda seperti digoxin.
- Probenecid – digunakan untuk gout, dan cimetidine – digunakan untuk ulser dan pedih ulu hati.
- Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDS) – boleh meningkatkan risiko rangsangan system saraf dan sawan.
- Antidiabetik - gangguan glukosa darah.

Cara menggunakan Levoquin?

Berapa banyak harus diambil

Ambil Levoquin dengan tepat seperti yang dipreskripsi oleh pembekal khidmat kesihatan. Label atasnya biasanya memberitahu anda berapa banyak dan berapa kerap harus diambil. Sila tanya doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

Bila perlu diambil

- Ambil Levoquin pada masa yang lebih kurang sama setiap hari.
- Minum air yang banyak semasa mengambil Levoquin.
- Tablet Levoquin boleh diambil dengan atau tanpa makanan.

Berapa lama perlu diambil

Jangan melangkau sebarang dos, atau berhenti mengambil Levoquin walaupun anda mula berasa lebih sihat, sehingga anda menghabiskan

LEVOQUIN FILM COATED CAPLET

Levofloxacin hemihydrates (250mg, 500mg)

rawatan yang dipreskripsi kan, kecuali:

- Anda mempunyai masalah tendon.
- Anda mempunyai reaksi alergi yang serius atau pembekal khidmat kesihatan memaklumkan anda untuk berhenti.

Jika terlupa mengambil

Jika anda terlepas satu dos Levoquin, ambilnya sebaik saja anda ingat.

Jangan ambil lebih daripada satu dos dalam sehari.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil terlalu banyak, hubungi pembekal khidmat kesihatan atau dapatkan bantuan perubatan segera.

Semasa menggunakan Levoquin

Perkara yang perlu dilakukan

Ambil Levoquin seperti yang dipreskripsi kan oleh doktor atau ahli farmasi anda sehingga anda menghabiskan rawatan yang dipreskripsi kan.

Levoquin boleh menyebabkan kulit anda sensitif terhadap matahari (fotosensitiviti) dan cahaya daripada sunlamps dan tanning bed. Anda harus menggunakan sunscreen dan memakai topi dan baju yang boleh melindungi kulit anda jika anda perlu berada bawah matahari.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika keadaan anda tidak bertambah baik atau anda mengalami kesan-kesan sampingan semasa mengambil Levoquin.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Levoquin boleh menyebabkan anda merasa pening dan rasa hendak pitam. Jangan memandu, mengendalikan mesin atau melakukan aktiviti-aktiviti lain yang memerlukan kewaspadaan mental atau penyelarasang sehingga anda tahu bagaimana Levoquin mempengaruhi anda. Tarikh luput produk perubatan ini dicetakkan atas

kotak dan blister foil. Jangan menggunakan produk perubatan ini selepas tarikh luput.

Perkara yang harus diambil perhatian

Jika simptom anda tidak bertambah baik dalam tempoh beberapa hari, atau jika simptom menjadi lebih teruk, hubungi doktor anda. .

Kesan-kesan sampingan

Rasa kurang selesa (loya) dan cirit-birit.

Peningkatan dalam paras enzim hati dalam darah anda.

Sila beritahu doktor atau Ahli Farmasi anda sekiranya anda mengalami sebarang kesan sampingan lain yang tidak diingini.

Cara penyimpanan dan pelupusan Levoquin

Penyimpanan

Lindungi daripada cahaya (di bawah 30°C).

Jauhkan Levoquin dan semua ubat daripada kanak-kanak.

Pelupusan

Ubat ini tidak boleh dilupuskan melalui air buangan isi rumah. Sila bertanya kepada ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi persekitaran.

Maklumat Lanjut

Rupa dan warna produk

Levoquin 250mg caplet bersalut film kelihatan sebagai caplet bersalut film yang berwarna kuning, terukir "P" pada satu sisi. Dimensi caplet ialah 15.8 x 8.0 (mm) (Panjang x Lebar).

Levoquin 500mg caplet bersalut film kelihatan sebagai caplet bersalut film yang berwarna kuning, terukir "P" pada satu sisi.

Bahan-bahan kandungan

Setiap Levoquin 250mg film coated caplet mengandungi Levofloxacin hemihydrate yang bersamaan dengan levofloxacin 250mg.

Setiap Levoquin 500mg film coated caplet mengandungi Levofloxacin hemihydrate yang bersamaan dengan levofloxacin 500mg.

Ramuan lain: Maize starch, lactose, croscarmellose sodium, povidone, magnesium stearate, HPMC, colloidal silicon dioxide, PEG 6000, titanium dioxide, quinoline yellow, sodium starch glycolate, purified water.

No. MAL:

Levoquin 250mg film coated caplet:

MAL12095077AZ

Levoquin 500mg film coated caplet:

MAL12095080AZ

Pengilang

PYMEPHARCO

(Pymepharco is a subsidiary of
STADA Arzneimittle AG)

166-170 Nguyen Hue Str, Tuy Hoa City, Phu Yen Province, VietNam.

Pemegang Pendaftaran Produk

STADPHARM SDN BHD

E-9-01, Oasis Square,
Ara Damansara,
No. 2, Jln PJU 1A/7A,
Selangor Darul Ehsan

Tarikh Kemaskini RiMUP

10/03/2017

Nombor Siri:

BPFK(R4/1)100317/00026