

Tajuk PIL : SUTENT
Tarikh PIL : 21 September 2017
Negara : Malaysia
Rujukan : Kapsul 12.5 mg dan 25 mg LPD Malaysia bertarikh 25 April 2017
Sebab : Untuk diselaraskan dengan LPD yang berkuat kuasa sekarang

SUTENT® CAPSULE

Sunitinib malate (12.5 mg, 25 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan SUTENT
2. Bagaimana SUTENT berfungsi
3. Sebelum mengambil SUTENT
4. Cara menggunakan SUTENT
5. Semasa menggunakan SUTENT
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan Pelupusan SUTENT
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan SUTENT

SUTENT digunakan untuk merawat orang dewasa yang menghidap jenis kanser berikut:

Gastrointestinal stromal tumour (GIST), sejenis kanser perut dan usus, selepas penyakit bertambah teruk atau, di mana imatinib (ubat antikanser lain) tidak lagi berkesan atau anda tidak boleh mengambil imatinib.

Advanced renal cell carcinoma, sejenis kanser buah pinggang yang telah merebak ke bahagian lain badan.

Pancreatic neuroendocrine tumour (pNET), tumor pada sel yang menghasilkan hormon dalam pankreas yang menjadi semakin teruk atau tidak boleh dikeluarkan dengan pembedahan.

Bagaimana SUTENT berfungsi

SUTENT digunakan untuk merawat kanser dengan mencegah aktiviti sekumpulan protein khas yang diketahui terlibat dalam pertumbuhan dan perebakan sel kanser.

Sebelum mengambil SUTENT

Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil SUTENT

Jika anda alah kepada sunitinib atau kepada mana-mana ramuan lain dalam SUTENT.

Mengandung dan menyusukan anak

Tiada kajian mengenai wanita hamil yang menggunakan sunitinib. Jika anda hamil atau berpendapat anda mungkin hamil, beritahu doktor anda. SUTENT tidak boleh diambil semasa kehamilan melainkan jika benar-benar diperlukan. Doktor anda akan berbincang dengan anda mengenai risiko jika mengambil SUTENT semasa hamil. Jika anda mungkin akan hamil, anda hendaklah menggunakan langkah-langkah pencegah kehamilan yang berkesan semasa rawatan dengan SUTENT.

Jika anda sedang menyusukan anak, beritahu doktor anda. Jangan menyusukan anak semasa rawatan dengan SUTENT.

-Sebelum mula mengambi

Sila berbincang dengan doktor anda sebelum mengambil SUTENT:

- jika anda mengalami atau pernah mengalami masalah hati dan buah pinggang (protein di dalam air kencing anda). Doktor anda harus menjalankan ujian fungsi hati dan analisis air kencing sebelum memulakan SUTENT;
- jika anda mengalami masalah jantung atau ritma jantung yang luar biasa yang dikenali sebagai “prolonged QT interval”. Doktor anda perlu menjalankan ujian fraksi ejeksi jantung anda (peratusan isipadu darah yang dipam keluar oleh jantung anda setiap kali jantung berdegup) sebelum memulakan SUTENT;
- jika anda menghidap penyakit kencing manis atau mempunyai sejarah masalah gula darah, doktor anda akan memeriksa secara kerap tahap gula darah anda untuk menentukan jika ubat kencing manis anda perlu dilaraskan bagi mengelakkan tahap gula darah rendah (hipoglisemia).
- jika anda sedang menerima atau pernah menerima ubat yang dipanggil bisphosphonates intravena.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan. Sesetengah ubat boleh meningkatkan atau mengurangkan kepekatan SUTENT dalam darah anda. Anda seharusnya memberitahu doktor anda jika anda sedang mengambil ubat & makanan tambahan yang mengandungi bahan di bawah:

- ketoconazole, itraconazole (yang digunakan untuk merawat jangkitan kulat);
- erythromycin, clarithromycin, rifampin (yang digunakan untuk merawat jangkitan);
- ritonavir (yang digunakan untuk merawat *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*);
- dexamethasone (sejenis kortikosteroid yang digunakan untuk pelbagai penyakit);
- phenytoin, carbamazepine, phenobarbital (digunakan untuk merawat epilepsi dan penyakit saraf lain);
- sediaan herba yang mengandungi St. John's Wort (*Hypericum perforatum*) (yang digunakan untuk merawat kemurungan dan keresahan).
- jus limau gedang

Cara menggunakan SUTENT

-Berapa banyak harus digunakan

Iikut arahan doktor dan ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Doktor anda akan mempreskripsikan dos yang betul untuk anda, bergantung pada jenis kanser anda yang sedang dirawat. Jika anda sedang dirawat untuk GIST atau *advanced renal cell carcinoma*, dos lazim ialah 50 mg diambil satu kali setiap hari selama 28 hari (4 minggu), diikuti dengan 14 hari (2 minggu) rehat (tiada

ubat), dalam kitaran 6 minggu. Jika anda sedang dirawat untuk pNET, dos lazim ialah 37.5 mg diambil satu kali setiap hari tanpa tempoh rehat.

Doktor anda akan menentukan dos yang sesuai untuk anda dan juga menentukan jika anda perlu menghentikan rawatan anda dengan SUTENT.

-Bila perlu digunakan

Iikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

SUTENT boleh diambil dengan atau tanpa makanan.

-Berapa lama perlu digunakan

Teruskan pengambilan SUTENT untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlepas satu dos, ambil dos yang terlepas itu sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, anda hendaklah mengambil dos lazim yang telah ditentukan pada hari berikutnya. Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti mengenai apa yang perlu dilakukan.

Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda fikir anda atau orang lain terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan SUTENT

-Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil SUTENT.

Maklumkan kepada doktor anda dengan segera:

- jika anda hamil semasa mengambil SUTENT;
- jika anda mengalami tindak balas kulit yang teruk (ruam kulit, kadang kala dengan lepuh);
- jika anda mengalami masalah perdarahan berlebihan (contohnya, hidung berdarah, batuk berdarah, darah dalam najis atau air kencing anda) SUTENT boleh meningkatkan risiko pendarahan anda kerana ia boleh mengakibatkan perubahan dalam beberapa sel tertentu dalam darah anda, yang menjelaskan keupayaan darah anda membeku. Ia juga boleh mengurangkan sel darah merah anda. Doktor anda akan menjalankan ujian darah dan pemeriksaan fizikal rutin untuk menentukan kiraan darah lengkap anda;
- jika anda mengalami masalah gastrousus (termasuk kudis mulut, ketakcernaan, cirit-birit atau loya). Doktor anda mungkin akan memberikan tablet antimuntah atau anticirit-birit bagi mengawal simptom tersebut;
- jika anda mengalami sakit dalam kawasan perut (abdomen atas), loya, muntah dan demam. Ini mungkin tandanya keradangan pankreas (pankreatitis) atau tanda-tanda keradangan pundi hempedu (kolesistitis), di mana doktor anda mungkin akan membuat keputusan untuk menghentikan SUTENT.
- jika anda mengalami peningkatan tekanan darah secara mendadak. Doktor anda mungkin perlu merawat tekanan darah anda secara berasingan. Jika tekanan darah anda sangat tinggi, doktor anda mungkin mempertimbangkan untuk menghentikan SUTENT buat sementara waktu.
- jika anda menunjukkan tanda-tanda aktiviti tiroid yang berkurangan atau tiroid yang terlalu aktif. Doktor anda mungkin perlu merawat tiroid anda secara berasingan. Doktor anda lazimnya akan menjalankan ujian fungsi tiroid sebelum anda memulakan rawatan.

- jika anda akan menjalani prosedur pembedahan besar, atau telah menjalani prosedur pembedahan baru-baru ini. SUTENT boleh menjelaskan cara luka anda pulih. Doktor anda mungkin perlu menghentikan rawatan SUTENT anda buat sementara waktu sehingga anda pulih daripada pembedahan anda.
- jika anda mengalami sawan, beritahu doktor anda.
- jika anda mengalami sakit mulut, gigi dan /atau rahang, bengkak atau lepuh dalam mulut, kebas atau berasa tekanan dalam rahang, atau gigi longgar. Ini mungkin tanda dan simptom kerosakan tulang rahang (osteonekrosis);
- jika anda perlu menjalani rawatan pergigian invasif atau pembedahan pergigian. Doktor anda harus meminta anda menjalani pemeriksaan pergigian dan memastikan anda telah menjalani pencegahan masalah pergigian yang sewajarnya sebelum rawatan dengan SUTENT;

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil SUTENT kecuali diarahkan oleh doktor anda. Jangan mula mengambil sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor anda.

Jangan memberi SUTENT kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Tiada kajian yang telah dijalankan mengenai kesan terhadap keupayaan memandu atau mengendalikan jentera. Anda mungkin berasa pening semasa rawatan dengan SUTENT.

Kesan-sesan Sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, SUTENT boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas mengambil ubat ini. Kesan sampingan serius yang paling penting yang dikaitkan

dengan rawatan SUTENT bagi tumor pejal adalah darah beku dalam paru-paru (menyebabkan sakit dada dan sesak nafas), pengurangan bilangan platelet (sejenis sel darah), demam dengan bilangan neutrofil yang rendah (sejenis sel darah putih), pendarahan tumor, dan tekanan darah tinggi.

Kesan sampingan amat biasa yang dilaporkan adalah seperti berikut:

- Jangkitan yang diiringi dengan demam dan menggigil
- Aktiviti kelenjar tiroid yang berkurangan (*hypothyroidism*)
- Selera makan yang berkurangan
- Kesukaran tidur
- Sesak nafas
- Deria rasa berubah
- Sakit kepala
- Hidung berdarah
- Cirit-birit, loya, muntah, sembelit
- Sakit perut, ulser mulut
- Ketakceranaan
- Ruam, kulit kering, penyahwarnaan kulit, perubahan warna rambut, penyakit tangan-kaki yang mengakibatkan kemerahan, bengkak dan sakit
- Sakit sendi, sakit pada lengan dan kaki
- Kelesuan
- Keradangan mukosa (bibir dan mulut)
- Bengkak
- Demam

Kesan sampingan biasa yang dilaporkan adalah seperti berikut:

- Gula darah rendah
- Dehidrasi
- Kemurungan
- Pening
- Terasa kesemutan dan mencucuk
- Bengkak di sekeliling mata, bengkak pada kelopak mata, pengeluaran air mata yang bertambah
- Pengurangan aliran darah ke jantung
- Pengurangan keupayaan jantung mengepam darah keluar
- Darah dalam kahak
- Sakit kerongkong
- Angin berlebihan dalam perut atau usus
- Sakit dalam mulut, pendarahan dalam perut atau usus, keradangan esofagus, pedih ulu hati, lidah berasa pedih, mulut berasa kering, perut kembung, pendarahan gusi

- Kulit menggelupas, keguguran rambut, kemerahan kulit, kegatalan, luka pada kulit, tindak balas kulit, masalah kuku, pembentukan lepuh
- Sakit otot
- Kegagalan ginjal, air kencing berwarna tidak normal, kehilangan protein dalam air kencing
- simptom seperti demam selesema (menggigil, demam, sakit tekak, kelenjar bengkak), pengurangan bilangan platelet, sel darah merah, sel darah putih (contohnya, limfosit)
- pengurangan bilangan platelet, sel darah merah, sel darah putih (contohnya, limfosit)- ujian darah yang tidak normal termasuk enzim pankreas yang meningkat, tahap asid urik yang meningkat di dalam darah dan peningkatan sejenis enzim tisu yang dipanggil *creatinine phosphokinase*
- Penurunan berat badan

Ini bukanlah semua kesan sampingan bagi SUTENT. Jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan tersebut yang tidak sembah, beritahu doktor anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web npra.moh.gov.my (Public → Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety).

Cara Penyimpanan dan Pelupusan SUTENT

-Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Jangan simpan melebihi suhu 30°C.

-Pelupusan

Ubat tidak seharusnya dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

-Rupa dan warna produk

Kapsul 12.5 mg

Kapsul gelatin keras dengan penutup jingga dan badan jingga, dicetak dengan dakwat putih "Pfizer" pada penutup dan "STN 12.5 mg" pada badan.

Kapsul 25 mg

Kapsul gelatin keras dengan penutup karamel dan badan jingga, dicetak dengan dakwat putih "Pfizer" pada penutup dan "STN 25 mg" pada badan.

Sesetengah dos mungkin tidak dipasarkan di negara anda.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:

Sunitinib malate

- Bahan tidak aktif:

Kandungan kapsul:

Mannitol, Croscarmellose Sodium, Povidone, Magnesium Stearate.

Kulit kapsul:

12.5 mg

Gelatin, Titanium Dioxide, Red Iron Oxide.

25 mg

Gelatin, Titanium Dioxide, Red Iron Oxide, Black Iron Oxide, Yellow Iron Oxide.

Dakwat cetak:

Shellac, Dehydrated Alcohol, Isopropyl Alcohol, Butyl Alcohol, Titanium Dioxide, Propylene Glycol, Sodium Hydroxide, Povidone.

-Nombor MAL:

Sutent capsule 12.5 mg-
MAL20071632AZ

Sutent capsule 25 mg-
MAL20071633AZ

Pengilang

Dikilang oleh:

Pfizer Italia S.r.l.
Ascoli Piceno, Itali

Di bawah hak,
Pfizer Inc.
New York, N.Y.
U.S.A.

Pemegang Pendaftaran Produk

Pfizer (Malaysia) Sdn. Bhd.
Level 9-2, 10 & 11
Wisma Averis, Tower 2
Avenue 5, Bangsar South
No. 8, Jalan Kerinchi
59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Tarikh Kemaskini RiMUP

- 21/09/17

PIL-SUTENT-0917

Serial Number:

NPRA(R4/1)290817/00231