

SYNAMOX CAPSULES

Amoxicillin (250mg, 500mg)

Apakah yang ada pada risalah ini	Sebelum mengambil Synamox Capsules	Synamox	<u>Jika mengambil ubat-ubat lain</u>
1. Apakah kegunaan Synamox Capsules	<u>- Bila tidak boleh diambil</u>	Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi jika anda sedang atau telah mengambil ubat-ubat lain, termasuk yang tidak mempunyai preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.	
2. Bagaimana Synamox Capsules berfungsi	Anda dilarang mengambil Synamox Capsules dan mesti rujuk doktor atau ahli farmasi jika anda:		
3. Sebelum mengambil Synamox Capsules	<ul style="list-style-type: none"> • alah terhadap penisilin, antibiotik jenis penisilin termasuk <i>Cephalosporins</i>, <i>Cephamycins</i>, <i>Griseofluvin</i> dan <i>Penicillamine</i> atau bahan lain yang terkandung dalam produk ini seperti yang tersenarai di bahagian bawah risalah ini 		
4. Cara pengambilan Synamox Capsules	<ul style="list-style-type: none"> • mengalami masalah buah pinggang dimana anda mungkin memerlukan dos yang lebih rendah 		
5. Semasa mengambil Synamox Capsules	<ul style="list-style-type: none"> • mempunyai sejarah penyakit gastrousus terutama sekali kolitis ulceratif atau kolitis disebabkan oleh antibiotik (radang usus besar) 		
6. Kesan-kesan sampingan			
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Synamox Capsules			
8. Maklumat lanjut			
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk			
10. Tarikh Kemaskini RiMUP			

Apakah kegunaan Synamox Capsules

Synamox Capsules mengandungi Amoxicillin sebagai bahan aktif. Amoxicillin tergolong dalam kelas antibiotik "penisilin". Ubat ini digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria yang sensitif terhadap Amoxicillin termasuk:

- Jangkitan telinga, hidung dan tekak
- Jangkitan ginekologi dan saluran kencing
- Gonorea
- Jangkitan kulit dan tisu lembut

Bagaimana Synamox Capsules berfungsi

Amoxicillin dalam Synamox Capsules melawan bakteria dan menghentikan tumbesaran bakteria dengan menghalang kekuatan dan ketekalan dinding sel. Ini membunuh bakteria dan menolong merawat jangkitan.

Sebelum mengambil Synamox Capsules

- Bila tidak boleh diambil

Anda dilarang mengambil Synamox Capsules dan mesti rujuk doktor atau ahli farmasi jika anda:

- alah terhadap penisilin, antibiotik jenis penisilin termasuk *Cephalosporins*, *Cephamycins*, *Griseofluvin* dan *Penicillamine* atau bahan lain yang terkandung dalam produk ini seperti yang tersenarai di bahagian bawah risalah ini
- mengalami masalah buah pinggang dimana anda mungkin memerlukan dos yang lebih rendah
- mempunyai sejarah penyakit gastrousus terutama sekali kolitis ulceratif atau kolitis disebabkan oleh antibiotik (radang usus besar)
- mempunyai penyakit lain seperti leukimia atau jangkitan HIV dimana keadaan ini akan menyebabkan anda lebih berkemungkinan untuk mengalami ruam kulit

Hamil dan menyusukan bayi

Jika anda hamil, menyusukan bayi atau merancang untuk hamil, sila rujuk doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil apa-apa ubat.

Amoxicillin boleh terbias ke dalam susu ibu. Synamox Capsules boleh diambil oleh ibu yang menyusukan bayi jika disarankan oleh doktor.

Sebelum anda mula mengambil

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi jika anda mempunyai:

- Alahan kepada ubat-ubat lain, makanan, bahan pengawet atau pencelup
- Mana-mana penyakit yang tersenarai di atas

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi jika anda sedang atau telah mengambil ubat-ubat lain, termasuk yang tidak mempunyai preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat-ubatan mungkin menyebabkan interaksi apabila diambil bersama Synamox Capsules termasuk:

- Ubat untuk cirit birit
- Ubat yang mengandungi *Chloramphenicol*, *Erythromycins*, *Sulphonamides* atau *Tetracyclines*.
- Ubat probenecid

Cara pengambilan Synamox Capsules

Sentiasa ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda berkaitan pengambilan Synamox Capsules. Jika anda musykil dengan arahan pada label, rujuk dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Ianya perlu diambil pada selang waktu yang tetap bergantung kepada arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Berapa banyak yang harus digunakan

Ikuti semua arahan doktor atau ahli farmasi dengan betul. Arahan mereka mungkin berbeza dengan maklumat yang terdapat pada risalah ini.

Jika anda musykil dengan arahan pada label, rujuk doktor atau ahli farmasi anda.

Dewasa:

Dos dewasa: 250 – 500mg setiap 8 jam.
Dos maksima sehingga 4.5g sehari.

Bagi orang yang mempunyai penyakit jangkitan seksual (*Gonorrhoea*) perlu mendapatkan nasihat dari doktor atau ahli farmasi untuk pengambilan

Synamox Capsules dengan ubat probenecid.

Perlu diingatkan bahawa antibiotik mesti dihabiskan walaupun anda telah merasa sihat. Ini adalah perlu bagi menghalang bakteria daripada membina ketahanan antibiotik. Jika anda tidak menhabiskan antibiotik, jangkitan mungkin berulang dan lebih payah untuk diubati.

- Bila perlu diambil

Ambil seperti mana arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Synamox Capsules boleh diambil semasa perut kosong atau perut penuh.

- Berapa lama perlu diambil

Ambil ubat ini selama mana arahan doktor atau ahli farmasi anda. Jika tiada perubahan, sila berjumpa doktor anda.

- Jika terlupa mengambilnya

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda ingat. Jika ianya sudah hampir waktu untuk pengambilan seterusnya, tunggu sahaja untuk pengambilan tersebut dan abaikan dos yang tertinggal. Jangan gandakan dos bagi mengantikan pengambilan yang tertinggal.

- Jika mengambil dos berlebihan

Antara simptom dos berlebihan ialah mual, muntah dan cirit-birit dan boleh dirawat dengan pengambilan air dan bendalir.

Jika anda atau orang lain telah ambil terlebih dos, dapatkan rawatan perubatan di Bahagian Kecemasan hospital berdekatan dengan segera.

Semasa mengambil Synamox Capsules

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat seperti mana arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Sekiranya anda ingin mendapatkan rawatan perubatan lain, maklumkan kepada semua doktor, doktor pergigian

dan ahli farmasi yang anda sedang mengambil Synamox Capsules.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti ambil Synamox Capsules kecuali atas nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Synamox Capsules kepada orang lain walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera
Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor dengan segera.

Kesan-sesan sampingan

Seperi mana ubat-ubat lain, Synamox Capsules boleh menyebabkan kesan sampingan kepada sesetengah pengguna.

Sesetengah pengguna mungkin akan mengalami tindakbalas alahan terhadap Synamox Capsules. Simptom-simptom termasuk:

- Ruam kulit dan gatal-gatal
- Sembelit atau kejang pad bahagian abdominal atau perut
- Kembung perut atau demam
- Loya, muntah
- Sakit atau bengkak mulut atau lidah
- Cirit birit beserta kehadiran darah

Berhenti pengambilan Synamox Capsules dan segera hubungi doktor anda jika anda mengalami simptom yang berikut:

- Reaksi alahan yang serius termasuk Reaksi Ubat bersama *Eosinophilia* dan simptom sistemik (DRESS). Permulaan simptom DRESS seperti simptom seakan-akan selsema dengan

ruam di muka diikuti dengan ruam berpanjangan, suhu yang tinggi dan pembesaran kelenjar limfa.

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi dengan segera jika anda mengalami kesan sampingan lain selepas mengambil ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550 atau laman web npra.moh.gov.my (*Public → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) /Vaccine (AEFI)*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Synamox Capsules

- Penyimpanan

Simpan semua ubat-ubatan dari penglihatan dan jangkauan kanak-kanak.

Simpan ubat-ubatan di tempat yang kering dan dingin dan bersuhu di bawah 25°C.

Jauhi dari cahaya.

Jangan guna ubat ini selepas tarikh luput yang tertera di kotak. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir pada bulan tersebut.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak boleh dibuang melalui air buangan atau buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda cara untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak diperlukan. Langkah-langkah ini boleh membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Synamox Capsules 250mg

Kapsul yang bersih, kering, berbentuk seakan teleskop, bersinar, tidak comot atau melekat dengan kapsul lain. Tertera

perkataan ‘SYNAMOX 250mg’ dan ‘Idaman’

Kapsul berwarna ungu dan kelabu legap, saiz no.2, berbau seakan penicillin. Serbuk kasar di dalam kapsul berwarna putih kekuningan.

Synamox Capsules 500mg

Kapsul yang bersih, kering, berbentuk seakan teleskop, bersinar, tidak comot atau melekat dengan kapsul lain. Tertera perkataan ‘SYNAMOX 500mg’ dan ‘Idaman’

Kapsul berwarna ungu dan putih legap, saiz no.0, berbau seakan penicillin. Serbuk kasar di dalam kapsul berwarna putih kekuningan.

- Bahan-bahan kandungan

Synamox Capsules 250mg

Bahan aktif:

Amoxicillin trihydrate

- Bahan tidak aktif

Sodium Lauryl Sulphate, Lactose, Magnesium Stearate, Talc.

Synamox Capsules 500mg

Bahan aktif:

Amoxicillin trihydrate

- Bahan tidak aktif

Sodium Lauryl Sulphate, Magnesium Stearate, Talc.

- Nombor MAL:

Synamox Capsules 250mg

MAL19890331AZ

Synamox Capsules 500mg

MAL198900332AZ

Pengilang

Idaman Pharma Manufacturing Sdn Bhd
(661901-P)

Lot 120, Taman Farmaseutikal, 32610
Bandar Seri Iskandar, Perak Darul Ridzuan, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Idaman Pharma Manufacturing Sdn Bhd
(661901-P)
Lot 120, Taman Farmaseutikal, 32610
Bandar Seri Iskandar, Perak Darul Ridzuan, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

23/4/2018

Nombor Siri

NPRA(R4/1)230418/00117