

# WINGESIC 500 TABLET

Paracetamol (500mg)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Wingsic 500 Tablet
2. Bagaimana Wingsic 500 Tablet berfungsi
3. Sebelum mengambil Wingsic 500 Tablet
4. Cara mengambil Wingsic 500 Tablet
5. Semasa mengambil Wingsic 500 Tablet
6. Kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan pelupusan Wingsic 500 Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan Wingsic 500 Tablet

Wingsic 500 Tablet digunakan untuk melegakan demam dan kesakitan ringan dan sederhana termasuk sakit kepala, sakit sinus, sakit gigi dan sakit badan yang berkaitan dengan selesema dan flu.

## Bagaimana Wingsic 500 Tablet berfungsi

Wingsic 500 Tablet yang mengandungi Paracetamol merupakan sejenis ubat yang termasuk dalam kategori analgesia dan antipiretik yang dijadikan ubat penahan sakit dan penurunan panas. Ia diserap dengan cepat dan sempurna selepas administrasi dan menunjukkan kesannya dalam masa 30 minit ke 2 jam. Kesan ini akan kekal selama 3 hingga 4 jam.

## Sebelum mengambil Wingsic 500 Tablet

### - Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil produk ini jika anda alergi (hipersensitiviti) terhadap Paracetamol atau bahan-bahan lain yang terkandung dalam produk ini.

### - Sebelum mula mengambil

Produk ini harus diberi dengan perhatian kepada penderita gangguan fungsi hati dan buah pinggang atau mereka yang sedang mengambil ubat yang mengancam kesihatan hati.

### - Jika mengambil ubat- ubatan lain

Sila periksa dengan doktor anda sekiranya anak anda sedang mengambil ubat-ubat seperti berikut:

- Ubat antikoagulan (Warfarin)
- Metoclopramide (ubat masalah perut)
- Propantheline (ubat merawat ulser peptik)
- Antidepresan dengan sifat antikolinergik dan analgesik narkotik
- Chloramphenicol (antibiotik)
- Enzim seperti alkohol dan agen anticonvulsant
- Probenecid (ubat merawat gout)
- Cholestyramine (ubat mengurangkan kolesterol)

## Cara mengambil Wingsic 500 Tablet

### - Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak melebihi 12 tahun:

Ambil 1 hingga 2 tablet setiap 4 hingga 6 jam. (Jangan melebihi 8 tablet dalam sehari)

### - Bila perlu diambil

Boleh diambil dengan atau tanpa makanan.

### - Berapa lama perlu diambil

Sila mengikuti nasihat doktor atau ahli farmasi.

### - Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa beri Wingsic 500 Tablet kepada anak anda, berikannya secepat mungkin apabila anda teringat. Jangan cuba beri dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

### - Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Gejala-gejala termasuk muntah, sakit abdomen, tekanan darah rendah dan berpeluh. Sekiranya terambil berlebihan, rawatan khusus segera adalah penting. Sila menghubungi Pusat Racun Negara (1800 888 099) atau doktor anda, ataupun pergi ke unit kecemasan hospital yang terdekat secepat mungkin.

## Semasa mengambil Wingsic 500 Tablet

### - Perkara yang perlu dilakukan

Jangan melebihi dos yang disyorkan dan penggunaan berterusan tidak boleh melebihi 5 hari pada satu masa (10 hari untuk dewasa), tanpa nasihat doktor. Jika simptom berlarutan, sila dapatkan nasihat doktor.

### - Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan ambil ubat ini untuk keadaan lain kecuali diarahkan oleh doktor anda.

### - Perkara yang perlu diberi perhatian

Sediaan ini mengandungi Paracetamol. Jangan mengambil sediaan lain yang juga mengandungi Paracetamol pada masa yang sama.

## Kesan Sampingan

Tanda alahan: Paracetamol boleh menyebabkan alahan kulit yang teruk termasuk kemerahan kulit, lepuh atau ruam. Ini boleh menjadi tanda-tanda keadaan serius. Jika tindak-balas ini berlaku, berhenti menggunakannya dan dapatkan rawatan segera.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-7883 5549, atau laman web [npra.moh.gov.my](http://npra.moh.gov.my) (Public → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF or Vaccines (AEFI))).

## Cara Penyimpanan dan Pelupusan Wingsic 500 Tablet

### - Penyimpanan

- Simpan di bawah 30°C.
- Jauhkan daripada cahaya.
- Tutupkan botol dengan ketat.
- Jauhkan daripada capaian kanak-kanak

### - Pelupusan

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput. Tarikh luput selalunya dicetak pada label dan kotak ubat.

## Maklumat lanjut

### - Rupa dan warna produk

Wingsic 500 Tablet adalah tablet merah jambu berbentuk bulat dan tidak bersalut..

### - Bahan-bahan

Bahan-bahan aktif  
Setiap tablet mengandungi Paracetamol 500mg

Bahan-bahan tidak aktif  
Gelatin, Magnesium Stearate, Corn Starch, Carmoisine lake, Sodium Starch Glycolate, Vinyl Pyrrolidone (Plasdone S630), Aerosil 200

### - Nombor MAL:

MAL08051671XZ

## Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

WINWA MEDICAL SDN. BHD.  
1952, Lorong I.K.S. Bukit Minyak 3,  
Taman I.K.S. Bukit Minyak,  
14000 Bukit Mertajam,  
Pulau Pinang, Malaysia.

## Tarikh kemaskini RiMUP

14/5/2018

Nombor siri:

NPRA(R4/1)140518/00145