

ALESONE CREAM

Mometasone furoate (0.1% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Alesone
2. Bagaimana Alesone berfungsi
3. Sebelum mengguna Alesone
4. Cara menggunakan Alesone
5. Semasa menggunakan Alesone
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Alesone
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Alesone

Ia digunakan untuk melegakan keradangan dan kegatalan keadaan kulit di mana steroid adalah berkesan.

Bagaimana Alesone berfungsi

Mometasone furoate, sejenis steroid yang mempunyai sifat mengurangkan keradangan dan kegatalan. Ia disapu atas kulit untuk mengurangkan kemerahan dan kegatalan akibat daripada sesetengah masalah kulit.

Sebelum mengguna Alesone

- Bila tidak boleh mengguna

- alahan terhadap mometasone, steroid lain lain dan ramuan-ramuan lain produk.
-
- ### - Sebelum mula mengguna
- Awas penggunaan dekat dengan mata atau muka kerana kemungkinan iritasi.
 - Kesan sistemik mungkin berlaku jika disapu pada kawasan luas, terutamanya apabila kulit luka yang dibalut atau tidak.
 - Berhati-hati jika diguna berpanjangan.
 - Berhati-hati semasa penggunaan pada kanak-kanak kerana risiko lebih tinggi mengalami perencutan kelenjar hipotalamik-pituitari-adrenal dan sindrom Cushing menyebabkan perubahan hormon.
 - Terdapat risiko gangguan adrenal, kemungkinan tanda regangan kulit luar biasa, tambahan berat badan yang lambat dan rencatan tumbesaran kanak-kanak.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Ubat ini adalah untuk kegunaan luar sahaja dan biasanya kurang kesan ke atas ubat-ubat lain. Walaupun demikian, sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika sedang mengambil ubat-ubat lain.

Cara menggunakan Alesone

- Berapa banyak harus diguna

Disapu pada bahagian berkenaan sekali sehari.

- Bila perlu diguna

Sila ikut nasihat doktor atau ahli farmasi.

- Berapa lama perlu diguna

Diguna sehingga sembah atau untuk 3 minggu, yang mana lebih singkat.

- Jika terlupa mengguna

Guna sebaik sahaja teringat. Kemudian, guna seperti biasa.

- Jika menggunakan berlebihan(terlebih dos)

Jika terlebih dos, hubungi doktor, jabatan kecemasan atau pusat racun segera. Jika steroid diguna berlebihan dan berpanjangan, fungsi pituitari-adrenal akan terganggu, mengakibatkan paras tinggi hormon cortisol, termasuk sindrom Cushing. Dalam kes toksisiti berlarutan, hentikan penggunaan ubat secara beransur-ansur.

Semasa menggunakan Alesone

- Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor ubat yang sedang diambil. Jika iritasi dan sensitasi berlaku, hentikan penggunaan dan dapatkan nasihat doktor. Untuk keadaan jangkitan, ubat antikulat atau antibakteria perlu digunakan. Jika tidak berkesan, penggunaan dihentikan sehingga jangkitan terkawal.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat sebaik sahaja berasa lega selepas beberapa hari, sambung sehingga jangka rawatan selesai.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jikalau hamil atau menyusukan anak, elak gunakan ubat kecuali atas arahan doktor.

Kesan-kesan sampingan

Pedih, gatal, kulit bertambah nipis, tanda merah dengan ruam panas dan keradangan folikel rambut mungkin berlaku. Jangkitan sekunder, jerawat, warna kulit luntur, pertumbuhan rambut terlampau banyak dan tanda regangan mungkin berlaku.. Jika berlaku sebarang kesan sampingan serius atau tidak tertera dalam risalah ini, sila hubungi doktor atau ahli farmasi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel:03-78835550, atau laman web

npra.moh.gov.my (Public → Reporting Medicinal Problems / Side Effects / AEFI / Vaccine Safety).

Cara penyimpanan dan pelupusan Alesone

- Penyimpanan

Simpan di tempat yang dingin dan kering, bawah 30°C. Jauhkan dari cahaya. Jauhkan dari kanak-kanak.

- Pelupusan

Dapatkan nasihat ahli farmasi cara pelupusan ubat yang tidak diperlukan lagi.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Krim warna putih.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif: mometasone furoate
- Bahan tidak aktif: liquid paraffin, cetomacrogol emulsifying wax, white soft paraffin, chlorocresol, citric acid, sodium citrate dan air.

- Nombor MAL:

MAL20040076AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Prime Pharmaceutical Sdn. Bhd.
1505, Lorong Perusahaan Utama 1
Taman Perindustrian Bukit Tengah
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

20/06/2017

Nombor Siri

BPK(R4/1)160617/00135