

WELLSEN TABLET

Vitamin A / Vitamin B1 (Thiamine HCl) / Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) / Vitamin B12 (Cyanocobalamin) / Vitamin C (Ascorbic Acid) / Vitamin D3 / Nicotinamide / Calcium-D-Pantothenate (500 IU / 3.5 mg / 1 mg / 2 mcg / 50 mg / 50 IU / 15 mg / 4 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan WELLSEN TABLET
2. Bagaimana WELLSEN TABLET berfungsi
3. Sebelum menggunakan WELLSEN TABLET
4. Cara menggunakan WELLSEN TABLET
5. Semasa menggunakan WELLSEN TABLET
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan WELLSEN TABLET
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan WELLSEN TABLET

Digunakan sebagai suplemen diet harian.

Bagaimana WELLSEN TABLET berfungsi

Sebagai suplemen diet untuk memberi nutrisi dan menyokong kesihatan badan.

Sebelum menggunakan WELLSEN TABLET

- Bila tidak boleh menggunakan

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil WELLSEN TABLET.

- Sebelum mula menggunakan WELLSEN TABLET

Beritahu doktor jika anda mempunyai masalah-masalah berikut:

- Alergi kepada salah satu atau lebih pada komponen.
- Pengambilan vitamin A atau D yang berlebihan yang boleh menyebabkan kesan toksik.
- Hypercalcemia (paras kalsium melebihi normal).
- Kegagalan buah pinggang.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan WELLSEN TABLET

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak 7 tahun dan ke atas: 1 hingga 2 tablet.

Arahan yang diberikan mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Untuk diambil setiap hari atau seperti yang diarahkan oleh doktor. Tablet sebaiknya diambil dengan makanan. Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan WELLSEN TABLET untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos yang berganda untuk mengantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan WELLSEN TABLET

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan WELLSEN TABLET.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan
Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan beri WELLSEN TABLET kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian
Dos tidak boleh melebihi dos yang disyorkan atau dinasihatkan oleh doktor.

Kesan-kesan sampingan

Kesan-kesan sampingan dan reaksi advers adalah jarang sekali berlaku walaupun dengan penggunaan yang lama.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini. Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835549, atau laman web npra.moh.gov.my (Public → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan WELLSEN TABLET

- Penyimpanan

Jauhi ubat daripada kanak-kanak Lindungi daripada cahaya Simpan di tempat kering di bawah 25°C Pastikan bekas ditutup rapat

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Bujur, tablet bersalut berwarna coklat.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Vitamin A, Vitamin B1 , Vitamin B6,
Vitamin B12, Vitamin C , Vitamin D3,
Nicotinamide, Calcium-D-
Pantothenate.

- Bahan-bahan tidak aktif

Deionised Water, Opadry II Brown
85G86538, Starch, White Base &
Magnesium Stearate.

- Nombor MAL

MAL19911861X

Pengilang & Pemegang Pendaftaran

Produk

Dynapharm (M) Sdn. Bhd.
2497, Mk 1, Lorong Perusahaan Baru 5,
Kawasan Perusahaan Perai 3, 13600
Perai, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

20/08/2018

Nombor siri:

NPRA(R4/1)200818/00247