



APABILA MENGGUNAKAN

PARACETAMOL

Ubat yang biasanya digunakan untuk mengurangkan demam dan kesakitan ringan

SEPERTI UBATAN YANG LAIN,
PARACETAMOL BOLEH MENYEBABKAN
KESAN SAMPINGAN

Kesan sampingan serius pada kulit juga boleh berlaku termasuk pada kanak-kanak pada kekerapan yang sangat rendah.



AMBIL PERHATIAN

Berwaspada terhadap tanda-tanda dan gejala awal berikut

kemerahan kulit



lepuh



ruam



kerengsaan mata



APA PERLU ANDA LAKUKAN?



Jika sebarang kesan sampingan di atas berlaku, **BERHENTI menggunakan ubat** serta merta dan **dapatkan rawatan perubatan secepat mungkin.**

SILA LAPORKAN

Laporkan **SEBARANG** kesan sampingan yang dialami.

Anda boleh melaporkan:

- melalui ahli farmasi atau doktor anda, **ATAU**
- terus kepada NPRA melalui **pos atau emel** di fv@npra.gov.my. Imbas kod QR untuk memuat turun borang pelaporan.



Laporan anda akan membantu NPRA mengambil langkah untuk mengurangkan risiko.

Pertanyaan?

Sila emelkan kepada kami:
fv@npra.gov.my



Bahagian Regulatori Farmasi Negara
Kementerian Kesihatan Malaysia

