

CAPTOHEXAL® TABLET

Captopril

Patient Information Leaflet

CAPTOHEXAL® 12.5 COR TABLET CAPTOHEXAL® 25 TABLET CAPTOHEXAL® 50 TABLET

Captopril

Read this entire leaflet before you start taking the medication.

- Keep this leaflet. You may need to read again.
- Ask your doctor or pharmacist if you need more information or advice.
- This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.
- If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

WHAT IS IN THIS LEAFLET?

1. What Captoprenal is used for
2. How Captoprenal works
3. Before you take Captoprenal
4. How to take Captoprenal
5. Possible side effects
6. While you are using Captoprenal
7. How to store Captoprenal
8. Product description
9. Marketing authorization holder and manufacturer

1. WHAT CAPTOHEXAL IS USED FOR

Captoprenal is used to treat:

- high blood pressure (hypertension).
- heart failure
- patient recently suffered from heart attack
- kidney disease in patients with diabetes.

2. HOW CAPTOHEXAL WORKS

Captoprenal belongs to the group of medicines called angiotensin-1 converting enzymes (ACE) inhibitors. It works by widening your blood vessels, which reduces pressure in the vessels. This makes it easier for the heart to pump blood around your body, and helps your kidneys work better.

3. BEFORE YOU TAKE CAPTOHEXAL

When you must not take it

Do not take Captoprenal if you:

- Are pregnant, planning to become pregnant or are breast feeding,
- Have ever had allergic reaction to captopril, the active ingredient, or to any other ingredients in Captoprenal or to any other similar medicines such as ACE Inhibitors,
- Have ever had a reaction which included swelling of the hands, lips, face or tongue with unknown causes,
- Suffer from renovascular disease (narrowing or blockade of blood vessels to kidney),
- Suffer from obstruction of the left ventricular outflow due to problem with the valves of the heart,
- Suffer from problems with the aortic valve of the heart (aortic stenosis).

If you are not sure whether you should start taking this medicine, consult your doctor.

Before you start to take it:

Tell your doctor if you have allergies to any other medicines, foods, preservatives or dyes.

Tell your doctor if you:

- Suffer from kidney disease,
- Suffer from liver disease,
- Undergoing dialysis,
- Suffer from heart disease, in particular problems with the valves of the heart,
- Have low blood pressure,
- Have diabetes,
- Have neutropenia (low white blood cell count),
- Recently suffered from excessive vomiting or diarrhea,
- Are receiving immunosuppressant therapy,
- Have a family history of swelling of the face, lips, tongue, throat, hands or feet.

Taking / using other medicines

Inform your doctor or pharmacist if you are

taking or if you have recently taken any other medicines, including medicines obtained without a prescription.

Some medicines and Captoprenal may interfere with each other. It is important to tell your doctor or pharmacist if you are taking:

- Diuretic tablet, also known as water tablet, such as frusemide,
- Potassium supplements, salts substitute containing potassium or potassium-sparing diuretic such as spironolactone and amiloride,
- Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for pain relief,
- Immunosuppressant (eg. cyclosporin),
- Medicines for gout (eg. allopurinol),
- Medicines for diabetes,
- Medicine to treat mental problem including depression (eg. lithium, amitriptyline),
- Other medicines used to treat high blood pressure,
- Any medicine that may be used during and after a heart attack.

Pregnancy and breast-feeding

Do not take Captoprenal if you are pregnant; think you are pregnant or planning to become pregnant, as medicines like Captoprenal may caused growth defects or death to the developing baby.

If you are breastfeeding, you should not take Captoprenal as it will become present in the breast milk.

4. HOW TO TAKE CAPTOHEXAL

Always take Captoprenal exactly according to the instructions given to you by your doctor or pharmacists. If you are unsure, check with your doctor or pharmacist.

How much to take

The dose given by your doctor may differ from this leaflet.

CAPTOHEXAL[®] TABLET

Captopril

Patient Information Leaflet

Usual Dosage:

Treatment of high blood pressure:

The usual starting dose is 12.5mg taken 2 or 3 times a day. Your doctor may gradually increase the dose up to 100 – 150mg a day. Other medicines may be given together with Captopril to lower your blood pressure.

In heart failure:

The usual starting dose is 12.5mg taken 2 or 3 times a day, which will then be increased by your doctor up to 150mg a day.

After a heart attack:

The usual starting dose is 6.25mg, which will then be increased by your doctor up to 150mg a day.

Treatment of diabetic patient with kidney disease:

The usual dose is 75 – 100mg 2 or 3 times a day.

When to take it

Take Captopril at the same time everyday for the best effect. The interval between each dose is approximately 12 hours if you are taking 2 times a day and approximately 8 hours if you taking 3 times a day

Taking with food and drink

Captopril should be taken on empty stomach, preferably 1 hour before meal.

How long to take it

Continue to take your medicines as long as your doctor tells you. This medicine helps to control your condition, but does not cure it. It is important to keep taking your medicine even if you feel well.

If you forget to take it

Take your dose as soon as you remember and continue to take it as you would normally. If it is time for your next dose, skip the dose you missed and take your next dose when you are meant to.

Do not take a double dose to make up for the dose you missed.

If you take too much (overdose)

If you or anyone else takes too many tablets, you should immediately go to your nearest hospital emergency department or tell your doctor. Do this even if there are no signs of discomfort or poisoning. Take the carton or any remaining tablets you have with you.

Symptoms of an overdose may include light-headedness, dizziness, or fainting.

If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor or pharmacist.

5. POSSIBLE SIDE EFFECTS

All medicines can have side effects. Captopril may cause unwanted side effects although not everybody gets them.

Tell your doctor or pharmacist if you notice the following side effects and they worry you:

- Light-headedness or dizziness
- Headache
- Tiredness
- Dry cough
- Muscle cramps
- Mild stomach upsets such as feeling sick, diarrhea or stomach pains
- Difficulty in sleeping (insomnia) or strange dreams
- Changes in the way things taste or loss of taste

The above list is the more common side effects of the medicine.

Tell your doctor as soon as possible if you notice any of the following:

- Unusually fast or irregular heartbeats,
- Swelling of the hands, face, lips or tongue,
- Yellowing of the skin and/or eyes (jaundice),
- Sudden, unexpected rash or burning, red or peeling skin,
- Signs of frequent infection such as sore throat, fever or ulcers in mouth or tongue,

- Signs of anemia such as tiredness, shortness of breath, and looking pale,
- Bruising more easily than normal,
- Passing less urine than normal,
- Severe dizziness or fainting,
- Chest pain or feeling tightness, pressure or heaviness in the chest,
- Wheeziness due to tightness in the chest.

The above list is the more serious side effects that require medical attention. These side effects are rare.

Tell your doctor or pharmacist if you notice anything else that make you feel unwell. Other side effects not listed above may also occur in some people.

6. WHILE YOU ARE USING CAPTOHEXAL

Things you must do

- Always follow your doctor's instruction carefully.
- Have your blood pressure checked periodically to make sure Captopril is working.
- If you feel any light-headedness or dizziness after you take your first dose of Captopril or if your dose is increased, tell your doctor immediately. If you feel light-headed, dizzy or faint, get up slowly when getting out of bed or standing up.
- You may also feel light-headed or dizzy if you are also taking a diuretic or other high blood pressure medicines. This may be because your blood pressure is falling suddenly. If you experience this, stand up slowly, especially when you get up from bed or chairs. It will help your body to get used to the change in position and blood pressure. If the problem gets worse or continues, talk to your doctor.
- If you become pregnant, or plan on becoming pregnant while taking Captopril, tell your doctor immediately.
- If you are about to be started on a new medicine, remind your doctor and pharmacist that you are taking Captopril.

CAPTOHEXAL[®] TABLET

Captopril

Patient Information Leaflet

- Inform any other doctors, dentists and pharmacists who treat you that you are taking Captopril.
- If you are due to have surgery, tell your doctor or dentist that you are taking Captopril before surgery and anesthesia as there may be a sudden fall in your blood pressure.
- If you are about to take any blood tests, tell your doctor that you are taking Captopril. It may interfere with the results of some tests.
- Tell your doctor if you have excessive vomiting and/or diarrhea. This may cause you to lose too much water and salt, and may cause your blood pressure to drop.
- Go to your doctor regularly for check-up. Your doctor may occasionally do a blood test to check your potassium level in your blood and to see how your kidneys are working.

Things you must not do

- Do not stop taking Captopril without your doctor's permission.
- Do not take Captopril to treat any other complaint unless your doctor tells you to.
- Do not give this medication to anyone else, even if they have the same condition as you.

Things to be careful of

- Be careful when driving or operating machinery while you are taking Captopril. Taking Captopril may cause dizziness or light-headedness, particularly at the first dose or after dose is increased. Drinking alcohol may worsen the symptoms. If you have any of these symptoms, do not drive or operate any machinery.

7. HOW TO STORE CAPTOHEXAL

Do not store above 25°C. Store in original package to protect from heat, moisture, and light.

Do not store Captopril or any other

medicines in the bathroom, near a sink or leave it at the window sill or in the car.

Keep out of the reach and sight of children.

Disposal

Do not use Captopril after the expiry date which is stated on the carton and blister.

If your doctors tell you to stop taking Captopril or the expiry date has passed, ask your pharmacist what to do with the remaining medicines.

8. PRODUCT DESCRIPTION

What Captopril[®] looks like and contents of the pack.

Captopril[®] 12.5 COR Tablet: Round tablet, side one convex, side two scored (snap-tab) with uniform white surface.

Captopril[®] 25 Tablet: Round tablet of a cloverleaf form with facet and a crossed break mark on both sides with uniform white surface.

Captopril[®] 50 Tablet: Round tablet of a cloverleaf form with facet and a crossed break mark on both sides with uniform white surface.

Packing

Captopril[®] 12.5 COR Tablet is packed in blister pack of 20, 50, and 100 tablets in a box.

Captopril[®] 25 Tablet is packed in blister pack of 20, 50, 100 and 1000 tablets in a box.

Captopril[®] 50 Tablet is packed in blister pack of 20, 50, and 100 tablets in a box.

What Captopril[®] contains

The active ingredient is:

Captopril[®] 12.5 COR Tablet – 12.5mg Captopril

Captopril[®] 25 Tablet – 25mg Captopril

Captopril[®] 50 Tablet – 50mg Captopril

The other ingredients are:

Microcrystalline cellulose, maize starch, lactose and stearic acid.

Registration Number

Captopril[®] 12.5 COR Tablet:

MAL20002450AC

Captopril[®] 25 Tablet: MAL20002451AC

Captopril[®] 50 Tablet: MAL20002452AC

9. MARKETING AUTHORISATION HOLDER AND MANUFACTURER

CAPTOHEXAL[®] 12.5 COR TABLET & CAPTOHEXAL[®] 25 TABLET:

Marketing Authorisation Holder:

Idaman Pharma Sdn. Bhd.

17, Jalan Wangsa Delima 1A,

Seksyen 5, Pusat Bandar Wangsa Maju,

53300 Kuala Lumpur.

Authorised Importer & Distributor:

IMEKS Pharma Sdn. Bhd.

No. 1 & 2, Jalan 6/33B,

MWE Commercial Park,

52000 Kuala Lumpur. Malaysia

CAPTOHEXAL[®] 50 TABLET:

Marketing Authorisation Holder & Distributor:

IMEKS Pharma Sdn. Bhd.

No. 1 & 2, Jalan 6/33B,

MWE Commercial Park,

52000 Kuala Lumpur. Malaysia

MANUFACTURER:

Manufactured by:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1,

39179 Barleben, Germany.

For:

HEXAL AG

Industriestraße 25,

83607 Holzkirchen, Germany

CAPTOHEXAL® TABLET

Captopril

CAPTOHEXAL® 12.5 COR TABLET
CAPTOHEXAL® 25 TABLET
CAPTOHEXAL® 50 TABLET
Captopril

Baca seluruh risalah ini sebelum anda mula ambil ubat ini.

- Simpan risalah ini. Anda mungkin perlu membacanya lagi.
- Sekiranya anda perlu maklumat lanjut, sila rujuk doktor atau ahli farmasi anda.
- Ubat ini dipreskribkan kepada anda. Jangan berikan kepada orang lain. Ini mungkin membahayakan kesihatan mereka walaupun tanda-tandanya adalah sama dengan anda.
- Sekiranya apa-apa kesan sampingan menjadi serius, atau anda perasan apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila maklumkan doktor atau ahli farmasi anda.

APAKAH YANG ADA PADA RISALAH INI?

1. Apakah Kegunaan Captopril
2. Bagaimana Captopril berfungsi
3. Sebelum mengambil Captopril
4. Cara menggunakan Captopril
5. Kesan-kesan sampingan
6. Semasa menggunakan Captopril
7. Cara penyimpanan Captopril
8. Maklumat lanjut
9. Pemegang pendaftaran dan pengilang

1. APAKAH KEGUNAAN CAPTOHEXAL

Captopril digunakan dalam penguatkuasaan:

- Tekanan darah tinggi
- Kegagalan jantung (*heart failure*)
- Pesakit yang baru mengalami serangan sakit jantung
- Pesakit kencing manis dengan penyakit ginjal.

2. BAGAIMANA CAPTOHEXAL BERFUNGSI

Captopril adalah dari kumpulan ubat yang dipanggil '*angiotensin-1 converting enzymes*

(*ACE inhibitors*)'. Ia berfungsi untuk menurunkan tekanan darah dengan melebarkan saluran darah. Ini membolehkan jantung untuk mengepam darah ke seluruh badan dengan lebih mudah dan ia juga membantu ginjal untuk berfungsi dengan lebih baik.

3. SEBELUM MENGAMBIL CAPTOHEXAL

Anda tidak boleh mengambil Captopril sekiranya anda:

- Mengandung, bercadang untuk mengandung atau sedang menyusu bayi,
- Pernah mengalami alahan terhadap bahan aktif captopril, atau kepada bahan-bahan lain dalam Captopril ataupun kepada ubat-ubatan lain yang sama seperti *ACE inhibitors*.
- Pernah mengalami reaksi seperti bengkak pada tangan, bibir, muka atau lidah tanpa mengetahui puncanya.
- Mempunyai penyakit '*renovascular*' (salur darah ke ginjal menjadi sempit atau terhalang),
- Mengalami masalah penghalangan dalam aliran darah pada ventrikel kiri jantung disebabkan masalah injap jantung,
- Mengalami masalah injap '*aorta*' pada jantung (aortic stenosis).

Bincang dengan doktor sekiranya anda tidak pasti sama ada anda patut mengambil ubat ini.

Sebelum mula mengambil Captopril:

Beritahu doktor anda sekiranya anda mengalami alahan terhadap ubat-ubatan lain, makanan, bahan pengawet atau bahan pewarna.

Beritahu doktor anda sekiranya anda:

- Mempunyai penyakit ginjal,
- Mempunyai penyakit hati,
- Menjalani dialisis,
- Mempunyai penyakit jantung, terutamanya masalah yang melibatkan injap jantung,

Risalah Maklumat Ubat Pengguna

- Mempunyai tekanan darah rendah,
- Mempunyai penyakit kencing manis,
- Mempunyai keadaan '*neutropenia*' (jumlah sel darah putih rendah),
- Pernah mengalami keadaan muntah atau cirit-birit serius pada kebelakangan ini,
- Sedang menjalani imunosupresan,
- Ahli-ahli keluarga anda pernah mengalami keengkakan pada muka, bibir, lidah, kerongkong, tangan atau kaki.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya anda ada mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat-ubat yang didapatkan tanpa preskripsi.

Sesetengah ubat boleh berinteraksi dengan Captopril. Adalah penting untuk anda memberitahu doktor atau ahli farmasi sekiranya anda ada mengambil:

- Ubat diuretik, juga dikenali sebagai ubat kurangkan air badan, seperti *furosemide*,
- Suplemen potassium, garam gantikan yang mengandungi potassium, atau ubat diuretik "potassium-sparing" seperti *spironolactone* dan *amiloride*,
- Ubat '*Non-steroidal anti-inflammatory drugs*' (NSAIDs) untuk melegakan kesakitan,
- '*Immunosuppressant*' (cth. cyclosporin),
- Ubat untuk *gout* (cth. allopurinol),
- Ubat untuk kencing manis,
- Ubat untuk masalah mental termasuk kemurungan (cth. lithium, amitriptyline),
- Ubat-ubat lain untuk tekanan darah tinggi,
- Apa-apa ubat yang mungkin digunakan semasa atau selepas serangan sakit jantung.

Semasa Mengandung dan Menyusu Bayi

Jangan ambil Captopril sekiranya anda mengandung, beranggapan anda telah mengandung atau bercadang untuk mengandung. Ubat-ubat seperti Captopril mungkin menyebabkan masalah kepada perkembangan bayi atau boleh menyebabkan kematiannya.

CAPTOHEXAL[®] TABLET

Captopril

Risalah Maklumat Ubat Pengguna

Sekiranya anda sedang menyusu, anda tidak sepatutnya mengambil Caporil kerana ia akan hadir dalam susu ibu.

4. CARA MENGGUNAKAN CAPTOHEXAL

Sentiasa ambil Captopril sepertiimana yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Jika anda tidak pasti, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

Berapa banyak harus diambil

Dos yang diberikan oleh doktor anda mungkin berlainan dengan risalah ini.

Dos biasa:

Rawatan tekanan darah tinggi:

Biasanya, dos permulaan adalah 12.5mg, diambil 2 atau 3 kali sehari. Doktor anda mungkin akan menambahkan dos anda sehingga 100 – 150mg sehari. Ubat lain mungkin juga akan diberikan bersama Captopril untuk mengawal tekanan darah anda.

Rawatan kegagalan jantung:

Dos permulaan biasa adalah 12.5mg diambil 2 atau 3 kali sehari. Kemudiannya, ia akan ditambah sehingga 150mg sehari.

Selepas serangan sakit jantung:

Dos permulaan biasa adalah 6.25mg, dimana ia akan ditambah sehingga 150mg sehari.

Rawatan pesakit kencing manis dengan penyakit ginjal:

Dos biasa adalah 75 – 100mg sehari diambil 2 atau 3 kali sehari.

Bila perlu diambil

Untuk kesan ubat yang terbaik, ambil Captopril pada waktu yang sama setiap hari. Anda harus mengambil Captopril kira-kira setiap 12 jam untuk 2 kali sehari dan setiap 8 jam untuk 3 kali sehari.

Diambil dengan makanan dan minuman

Captopril patut diambil dengan perut kosong, sebolehnya, 1 jam sebelum makan.

Berapa lama perlu diambil

Teruskan pengambilan ubat ini selagi anda diarahkan oleh doktor. Ubat ini bertujuan untuk mengawal masalah kesihatan anda tetapi bukan untuk menyembuhkannya. Adalah penting untuk anda terus mengambil ubat ini walaupun anda berasa sihat.

Jika terlupa mengambil

Ambil dos anda segera apabila anda ingat dan teruskan mengambil Captopril seperti biasa. Jika hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang terlupa dan ambil dos seterusnya seperti yang diperlukan.

Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang anda terlupa.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda, atau sesiapa telah mengambil ubat ini secara berlebihan, anda hendaklah segera pergi ke Bahagian Rawatan Kecemasan Hospital terdekat atau maklumkan kepada doktor anda. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang tanda ketidakselesaan atau keracunan. Bawa bersama bungkusan atau baki ubat biji yang selebihnya dengan anda.

Antara simptom terlebih dos adalah termasuk kepeningan, pitam atau pengan.

Tanya doktor atau ahli farmasi anda, sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut mengenai penggunaan ubat ini.

5. KESAN-KESAN SAMPINGAN

Semua ubat mempunyai kesan sampingan. Captopril mungkin menyebabkan kesan sampingan, tetapi, bukan setiap individu akan mengalaminya.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mengalami kesan-kesan sampingan yang merunsingkan anda seperti berikut:

- Pitam atau pening
- Sakit kepala

- Keletihan
- Batuk kering
- Kejang otot
- Gangguan perut ringan seperti rasa tidak sihat, cirit-birit atau sakit perut,
- Sukar untuk tidur (*insomnia*) atau mengalami mimpi aneh,
- Perubahan pada deria rasa atau hilang keupayaan untuk merasa.

Senarai di atas adalah antara kesan-kesan sampingan umum ubat ini.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda dengan SEGERA sekiranya anda mengalami kesan-kesan sampingan berikut:

- Degupan jantung cepat atau luar biasa,
- Bengkak pada tangan, muka, bibir atau lidah,
- Kekuningan pada kulit dan/atau mata (*jaundice*),
- Ruam atau kulit berasa perit, merah atau mengelupas yang berlaku secara tiba-tiba atau tidak dijangka.
- Tanda jangkitan yang kerap seperti sakit kerongkong, demam atau ulser pada mulut atau lidah.
- Tanda kekurangan darah (*anemia*) seperti keletihan, sesak nafas dan kelihatan pucat,
- Mudah lebam daripada biasa,
- Kencing kurang daripada biasa,
- Kepeningan atau pitam yang serius,
- Sakit dada atau dada terasa tegang, tertekan atau berat,
- Kesusakan nafas berserta bunyi termengah-mengah (seperti bersiul) disebabkan rasa tegang pada dada.

Senarai di atas merupakan kesan-kesan sampingan serius dan memerlukan perhatian perubatan. Kesan-kesan sampingan ini jarang berlaku.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mengalami reaksi lain yang menyebabkan anda berasa tidak sihat. Kesan-kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan mungkin juga akan dialami oleh sesetengah orang.

CAPTOHEXAL[®] TABLET

Captopril

Risalah Maklumat Ubat Pengguna

6. SEMASA MENGGUNAKAN CAPTOHEXAL

Perkara yang perlu dilakukan

- Ikut arahan doktor anda.
- Periksa tekanan darah anda dari masa ke semasa untuk pastikan pengambilan Captohexal berhasil.
- Jika anda terasa pening atau pitam selepas mengambil dos Caporil pertama atau selepas dos ditambahkan, maklumkan kepada doktor dengan segera. Jika terasa pening atau pitam, bangun perlahan-lahan daripada katil atau semasa berdiri.
- Sekiranya anda mengambil ubat diuretik atau ubat darah tinggi lain, anda mungkin juga akan terasa pening atau pitam. Ini mungkin disebabkan oleh tekanan darah anda yang turun dengan mendadak. Jika anda mengalami keadaan ini, bangun atau berdiri dengan perlahan-lahan, terutamanya ketika bangun daripada katil atau kerusi. Ini membolehkan badan anda menyesuaikan dengan pertukaran posisi dan perubahan tekanan darah. Beritahu doktor anda jika masalah ini bertambah teruk atau berlarutan.
- Beritahu doktor anda dengan segera sekiranya anda telah mengandung, atau bercadang untuk mengandung semasa mengambil Captohexal.
- Jika anda akan mula mengambil ubat baru, ingatkan doktor dan ahli farmasi bahawa anda sedang mengambil Captohexal.
- Sebelum menjalankan pembedahan atau pelalian (*anesthesia*) dijalankan, beritahu doktor atau doktor gigi bahawa anda sedang mengambil Captohexal kerana ia mungkin menyebabkan penurunan mendadak dalam tekanan darah anda.
- Sebelum menjalankan ujian darah, beritahu doktor bahawa anda sedang mengambil Captohexal kerana ia mungkin mengganggu keputusan sesetengah ujian.
- Beritahu doktor anda sekiranya anda mengalami muntah atau/dan cirit-birit yang berlebihan. Ini boleh menyebabkan anda kehilangan air dan garam secara

berlebihan dan akan menyebabkan penurunan tekanan darah anda.

- Sentiasa jumpa doktor anda untuk pemeriksaan rutin. Doktor anda mungkin akan menjalankan ujian darah untuk mengetahui kandungan garam potassium dalam darah dan sama ada ginjal anda berfungsi dengan baik.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti mengambil Captohexal tanpa kebenaran doktor anda.
- Jangan ambil Captohexal untuk merawat masalah kesihatan yang lain tanpa diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan beri ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai masalah kesihatan yang sama dengan anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

- Berhati-hati ketika memandu atau mengoperasikan mesin semasa anda mengambil Captohexal. Captohexal boleh menyebabkan anda pening atau pitam, terutamanya semasa pengambilan dos pertama atau selepas dos ditambahkan. Minuman alkohol boleh memburukkan simptom ini. Sekiranya anda mendapat simptom-simptom ini, jangan memandu kenderaan atau mengoperasikan sebarang mesin.

7. CARA PENYIMPANAN CAPTOHEXAL

Jangan simpan melebihi suhu 25°C. Simpan dalam bungkusan asal untuk melindungi daripada haba, kelembapan dan cahaya.

Jangan simpan Captohexal atau ubat-ubat lain di dalam tandas, berdekatan dengan sinki atau ditinggalkan di tepi tingkap atau di dalam kereta.

Jauhi daripada kanak-kanak.

Pelupusan

Jangan guna Captohexal yang melebihi tarikh luput yang dicetak pada kotak/strip.

Jika anda diarahkan oleh doktor untuk berhenti mengambil Captohexal, atau ia telah melebihi tarikh luput, tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk mengendalikan baki ubat tersebut.

8. MAKLUMAT LANJUT

Rupa dan kandungan Captohexal.

Captohexal[®] 12.5 COR Tablet: Tablet bulat berwarna putih dengan permukaan cembung pada satu belah dan permukaan rata berserta tanda belahan (*snap-tab*) pada permukaan yang satu lagi.

Captohexal[®] 25 Tablet: Tablet bulat berwarna putih dalam bentuk daun semanggi (*'cloverleaf'*) dengan permukaan rata dan tanda belahan salib pada kedua-dua belah permukaan tablet.

Captohexal[®] 50 Tablet: Tablet bulat berwarna putih dalam bentuk daun semanggi (*'cloverleaf'*) dengan permukaan rata dan tanda belahan salib pada kedua-dua belah muka tablet.

Bungkusan

Captohexal[®] 12.5 COR Tablet dibungkus dalam pek blister dalam 20, 50, dan 100 biji tablet sekotak.

Captohexal[®] 25 Tablet dibungkus dalam pek blister dalam 20, 50, 100 dan 1000 biji tablet sekotak.

Captohexal[®] 50 Tablet dibungkus dalam pek blister dalam 20, 50, dan 100 biji tablet sekotak.

Apakah kandungan Captohexal

Bahan aktif Captohexal adalah Captopril. Captohexal[®] 12.5 COR Tablet – 12.5mg Captopril
Captohexal[®] 25 Tablet – 25mg Captopril
Captohexal[®] 50 Tablet – 50mg Captopril

Bahan-bahan lain:

Microcrystalline cellulose, kanji jagung, laktosa, dan *stearic acid*.

CAPTOHEXAL[®] TABLET

Captopril

Risalah Maklumat Ubat Pengguna

Nombor pendaftaran

Captohexal[®] 12.5 COR Tablet:

MAL20002450AC

Captohexal[®] 25 Tablet: MAL20002451AC

Captohexal[®] 50 Tablet: MAL20002452AC

9. PEMEGANG PENDAFTARAN DAN PENGILANG

CAPTOHEXAL[®] 12.5 COR TABLET & CAPTOHEXAL[®] 25 TABLET:

Pemegang Pendaftaran Produk:

Idaman Pharma Sdn. Bhd.

17, Jalan Wangsa Delima 1A,

Seksyen 5, Pusat Bandar Wangsa Maju,

53300 Kuala Lumpur.

Pengimport & Pengedar Terlantik:

IMEKS Pharma Sdn. Bhd.

No. 1 & 2, Jalan 6/33B,

MWE Commercial Park,

52000 Kuala Lumpur. Malaysia

CAPTOHEXAL[®] 50 TABLET:

Pemegang Pendaftaran Produk &

Pengedar:

IMEKS Pharma Sdn. Bhd.

No. 1 & 2, Jalan 6/33B,

MWE Commercial Park,

52000 Kuala Lumpur. Malaysia

PENGILANG:

Dikilangkan oleh:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1,

39179 Barleben, Germany.

Untuk:

HEXAL AG

Industriestraße 25,

83607 Holzkirchen, Germany