

MALARONE TABLETS

Atovaquone and proguanil hydrochloride

What is in this leaflet

1. What Malarone is and what it is used for
2. Before you take Malarone Tablets
3. How to take Malarone Tablets
4. Possible side effects
5. Storing Malarone Tablets
6. Further Information

What Malarone is used for

Malarone has two uses:

- To prevent malaria
- To treat malaria

How Malarone works

Malarone belongs to a group of medicines called antimalarials. Each tablets contains two active ingredients, atovaquone and proguanil hydrochloride. Malaria is spread by the bite of an infected mosquito, which passes the malaria parasite (*Plasmodium falciparum*) into the bloodstream. Malarone prevents malaria by killing this parasite. For people who are already infected with malaria, Malarone also kills these parasites.

Before you take Malarone

When you must not take it
Do not take Malarone:

- If you are allergic (*hypersensitive*) to atovaquone, proguanil hydrochloride or any ingredient
 - For preventing malaria, if you have severe kidney disease
- Tell your doctor if any of these apply to you.

Pregnancy and breast feeding

If you are pregnant, do not take Malarone unless your doctor recommends it.

Ask your doctor or pharmacist for advice before taking Malarone.

Do not breast feed while taking Malarone, as the ingredients of

Malarone may pass into breast milk and may harm your baby.

Before you start to take it

Follow the instructions listed in the sections below before you start taking Malarone Tablets.

Taking other medicines

Tell your doctor or pharmacist if you're taking any other medicines, or has recently taken any, including medicines bought without a prescription.

Some medicines can affect the way Malarone works, or Malarone itself can strengthen or weaken the effectiveness of other medicines taken at the same time. These include:

- Metoclopramide, used to treat nausea and vomiting
 - The antibiotics, tetracycline, rifampicin and rifabutin
 - Efavirenz or certain highly active protease-inhibitors used to treat HIV
 - Warfarin and other medicines that stop blood clotting
 - Etoposide used to treat cancer
- Tell your doctor or pharmacist if you are taking any of these.

Your doctor may decide that Malarone isn't suitable for you, or that they need extra check ups while taking it.

Remember to tell your doctor if you start taking any other medicines while taking Malarone.

How to take Malarone Tablets

How much to take

To prevent malaria

The usual dose for adults is 1 tablet once a day, taken as below.

Not for children, talk to your doctor.

Not recommended for preventing malaria in children, or in adults who weigh less than 40kgs.

There may be a different type of Malarone tablet available for children in your country.

To prevent malaria in adults:

- Start taking Malarone 1 to 2 days before travelling to an area which has malaria
- Continue taking it every day during your stay
- Continue taking it for another 7 days after your return to a malaria-free area

To treat malaria

The usual dose for adults is 4 tablets once a day for 3 days.

For children the dose depends on their bodyweight:

- 11-20kg – 1 tablet once a day for 3 days
- 21-30kg – 2 tablets once a day for 3 days
- 31-40kg – 3 tablets once a day for 3 days
- Over 40kg – dose as for adults

Not recommended for treating malaria in children who weigh less than 11 kgs.

For children who weigh less than 11kg talk to your doctor.

There may be a different type of Malarone tablet available in your country.

When to take it

Always give Malarone exactly as your doctor has told you.

Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Take Malarone with food or a milky drink, where possible.

This will increase the amount of Malarone your body can absorb, and make the treatment more effective. It is best to take Malarone at the same time each day.

How long to take it

Keep taking Malarone for 7 days after you return to a malaria-free area. Take the full course of Malarone for maximum

protection. Stopping early puts you at risk of getting malaria, as it takes 7 days to ensure that any parasites that may be in your blood following a bite from an infected mosquito are killed. Do not take Malarone for longer than 37 days. If you are expecting your child to stay in area with malaria for more than 28 days check with your doctor before travelling. Malarone may not be suitable.

If you forget to take it

It is very important that you take the full course of Malarone. If you forget to take a dose, don't worry. Just take your next dose as soon as you remember. Then continue your treatment as before. Don't take a double dose to make up for a missed dose.

If you take too much (overdose)

Contact a doctor or pharmacist for advice. If possible show them the Malarone pack.

While you are using Malarone

Things you must do

If you have serious side effects, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, tell your doctor or pharmacist.

Things you must not do

This medicine has been prescribed for you personally. Don't pass it on to other people – It may harm them even if their symptoms seem to be the same as yours.

Things to be careful of Protecting yourself from catching malaria

People of any age can get malaria. It is a serious disease, but is preventable. As well as taking Malarone, it is very important that you also take steps to avoid being bitten by mosquitoes.

- Use insect repellent on exposed areas of the skin

- Wear light coloured clothing that covers most of the body, especially after sunset as this is the time when mosquitoes are most active
- Sleep in a screened room or under a mosquito net impregnated with insecticide
- Close windows and doors at sunset, if they are not screened
- Consider using an insecticide (mats, spray, plug-ins) to clear a room of insects or to deter mosquitoes from entering the room

If you need further advice, talk to your doctor or pharmacist. It is still possible to get malaria after taking the necessary precautions. Some types of malaria infection take a long time to cause symptoms, so the illness may not start until several days, weeks or even months after returning from abroad. See a doctor immediately if your child gets symptoms after returning from abroad – such as high temperature, headache, shivering and tiredness.

Driving and using machines

If you feel dizzy, do not drive. Malarone makes some people feel dizzy. If this happens to you, do not drive, use machines or take part in activities where you may put yourself or others at risk.

If you are sick (vomit):

For preventing malaria:

- if you are sick (vomit) within 1 hour of taking Malarone, take another dose straight away
- It is important to take the full course of Malarone. If you have to take extra tablets due to sickness, you may need another prescription.
- If you have been vomiting, it is especially important to use extra protection, such as repellants and bednets. Malarone may not be as

effective, as the amount absorbed will be reduced.

For treating malaria:

- If you have vomiting and diarrhea tell your doctor, you will need regular blood tests. Malarone will not be as effective, as the amount absorbed will be reduced. The tests will check whether the malaria parasite is being cleared from your blood.

Side Effects

Like all medicines, Malarone can cause side effects, although not everybody gets them. Look out for the following severe reactions. They have occurred in a small number of people, but their exact frequency is unknown.

Severe allergic reactions – signs include:

- Rash and itching
- Sudden wheezing, tightness of the chest or throat, or difficulty breathing
- Swollen eyelids, face, lips, tongue or other part of the body

Contact a doctor immediately if you get any of these symptoms. Stop taking Malarone.

Severe skin reactions

- Skin rash which may blister and looks like small targets (central dark spots, surrounded by paler area with a dark ring around the edge) (*erythema multiforme*)
- Severe widespread rash with blisters and peeling skin, particularly occurring around the mouth, nose, eyes and genitals (*Stevens-Johnson syndrome*)

If you notice any of these symptoms contact a doctor urgently.

Most of the other side effects reported have been mild and have not lasted very long.

Very common side effects

These may affect more than 1 in 10 people:

- Headache
- Feeling sick and being sick (*nausea and vomiting*)
- Stomach pain
- Diarrhea

Common side effects

These may affect up to 1 in 10 people:

- Dizziness
- Sleeping problems (*insomnia*)
- Strange dreams
- Depression
- Loss of appetite
- Fever
- Rash which may be itchy
- Cough

Common side effects which may show up in blood tests are:

- Reduced numbers of red blood cells (*anaemia*) which can cause tiredness, headaches and shortness of breath
- Reduced numbers of white blood cells (*neutropenia*) which may make you more likely to catch infections
- Low levels of sodium in the blood (*hyponatraemia*)
- An increase in liver enzymes

Uncommon side effects

These may affect up to 1 in 100 people:

- Anxiety
- An unusual awareness of abnormal beating of the heart (*palpitations*)
- Swelling and redness of the mouth
- Hair loss

Uncommon side effects that might show up in blood tests:

- An increase in amylase (*an enzyme produced in the pancreas*)

Other side effects

Other side effects have occurred in a small number of people but their exact frequency is unknown.

- Inflammation of the liver (*hepatitis*)

- Blockage of the bile ducts (*cholestasis*)
- Increased heart rate (*tachycardia*)
- Inflammation of the blood vessels (*vasculitis*) which may be visible as red or purple raised spots on the skin, but can affect other parts of the body
- Fits (seizures)
- Panic attacks, crying
- Seeing or hearing things that are not there (*hallucinations*)
- Nightmares
- Mouth ulcers
- Blisters
- Peeling skin
- Increased sensitivity of the skin to sunlight

Other side effects, which may show up in blood tests are:

- A decrease in all types of blood cells (*pancytopenia*)

If you get any side effects

If any of the side effects gets serious or troublesome, or if you notice any side effects not listed in this leaflet: Tell a doctor or pharmacist.

Ingredients

The active ingredients are:
250mg of atovaquone and
100mg of proguanil hydrochloride in each tablet.

The other ingredients are:
polyethylene glycol 8000,
povidone K30, poloxamer 188,
low substituted hydroxypropyl cellulose, pink colour
concentrate OY-S-24972,
magnesium stearate, macrogol 400, sodium starch glycollate,
ethanol, microcrystalline cellulose.

Tell your doctor, without taking Malarone if you might be allergic to any of these ingredients.

MAL20014470AR

Manufacturer

GlaxoSmithKline Inc. 7333,
Mississauga Road North,
Mississauga, Ontario L5N 6L4m
Canada

Date of Revision

16 April 2012

Storage and Disposal of Malarone

Keep Malarone out of the reach and sight of children.

Do not take Malarone after the expiry date printed on the carton.

Store below 30°C.

If you have any unwanted Malarone tablets, don't dispose of them in your waste water or household rubbish. Take them back to your pharmacist who will dispose of them in a way that won't harm the environment.

Product Description

What it looks like

Malarone tablets are round, pink film-coated tablets, engraved 'GX CM3' on one side. They are supplied in blister packs containing 12 tablets.

TABLET MALARONE

Atovaquone dan proguanil hydrochloride

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah dia Tablet Malarone dan apakah kegunaannya
2. Sebelum anda mengambil Tablet Malarone
3. Bagaimana untuk mengambil Tablet Malarone
4. Kesan-kesan sampingan yang mungkin berlaku
5. Bagaimana untuk menyimpan Tablet Malarone
6. Maklumat lanjut

Apakah kegunaan Malarone

Malarone mempunyai dua kegunaan:

- Untuk mencegah malaria
- Untuk merawat malaria

Bagaimana Malarone berfungsi

Malarone tergolong dalam kumpulan ubat yang dipanggil ubat anti malaria. Setiap biji mengandungi dua bahan aktif, atovaquone dan proguanil hydrochloride. Malaria disebarluaskan melalui gigitan nyamuk yang dijangkiti, yang menyebarkan parasit malaria (*Plasmodium falciparum*) ke dalam saluran darah. Malarone mencegah malaria dengan membunuh parasit ini. Bagi orang yang telah dijangkiti malaria, Malarone juga membunuh parasit ini.

Sebelum mengambil Malarone

Bila tidak boleh mengambil Jangan mengambil Malarone :

- **Jika anda alah (hipersensitif)** kepada atovaquone, proguanil hydroklorida atau mana-mana bahan di dalamnya.
- **Untuk mencegah malaria, jika anda mempunyai penyakit buah pinggang yang teruk.**

Beritahu doktor anda jika anda mengalami mana-mana perkara tersebut.

Kehamilan dan penyusuan

Jika anda hamil, jangan mengambil Malarone kecuali disyorkan oleh doktor anda. Minta nasihat doktor anda atau ahli farmasi sebelum mengambil Malarone.

Jangan menyusukan bayi semasa pengambilan Malarone, kerana bahan-bahannya mungkin akan masuk ke dalam susu badan dan boleh membahayakan bayi anda.

Sebelum mula mengambil

Rujuk bahagian yang berkaitan sebelum mula mengambil ubat ini.

Jika mengambil ubat-ubat lain Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubatan lain atau ada mengambil sebarang ubatan lain kebelakangan ini, termasuk ubatan yang dibeli tanpa preskripsi.

Sesetengah ubatan boleh memberi kesan kepada fungsi Malarone , atau Malarone itu sendiri boleh menguatkan atau melemahkan keberkesanan ubatan lain yang diambil pada masa yang sama. Ini termasuk:

- **Metoclopramide**, digunakan untuk merawat mual dan muntah-muntah.
- Ubatan antibiotik, **tetracycline, rifampicin** dan **rifabutin**
- **Efavirenz** atau **perencat protease tertentu yang sangat aktif**, digunakan untuk merawat HIV
- **Warfarin** dan ubatan cair darah yang lain
- **Etoposide**, digunakan untuk merawat kanser.

Beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil mana-mana ubatan ini. Doktor anda boleh

memutuskan bahawa Malarone tidak sesuai kepada anda atau anda memerlukan pemeriksaan tambahan semasa mengambil ubat ini.

Ingat untuk memberitahu doktor anda jika anda mula mengambil mana-mana ubatan semasa anda mengambil Malarone .

Cara menggunakan Malarone

Berapa banyak harus diambil Untuk mencegah malaria

Dos yang biasa untuk dewasa adalah 1 biji sekali sehari, diambil seperti di bawah.

Bukan untuk kanak-kanak, bincang dengan doktor anda.

Tidak disyorkan untuk mencegah malaria pada kanak-kanak, atau orang dewasa yang mempunyai berat badan kurang daripada 40 kg.

Mungkin terdapat jenis tablet Malarone yang lain untuk kanak-kanak di negara anda. Untuk mencegah malaria pada orang dewasa:

- Mulakan mengambil Malarone 1 hingga 2 hari sebelum pergi ke tempat yang terdapatnya malaria.
- Teruskan mengambilnya setiap hari semasa di sana.
- Teruskan mengambilnya untuk 7 hari selepas anda pulang ke tempat yang bebas malaria.

Untuk merawat malaria

Dos yang biasa untuk orang dewasa adalah 4 biji sekali sehari selama 3 hari.

Untuk kanak-kanak, dos bergantung kepada berat badan:

- 11-20 kg – 1 biji sekali sehari selama 3 hari
- 21-30 kg – 2 biji sekali sehari selama 3 hari
- 31-40 kg – 3 biji sekali sehari selama 3 hari

- Lebih 40 kg – dos seperti orang dewasa.

Tidak disyorkan untuk merawat malaria pada kanak-kanak yang mempunyai berat badan kurang daripada 11 kg.

Untuk kanak-kanak yang mempunyai berat badan kurang daripada 11 kg, sila bincang dengan doktor anda. Mungkin terdapat pil Malarone yang berbeza di negara anda.

Bila perlu diambil
Malarone harus diberikan mengikut arahan doktor dengan tepat. Semak dengan doktor atau ahli farmasi anda jika tidak pasti.

Kalau boleh, ambil Malarone bersama makanan atau minuman bersusu. Ini akan menjadikan tubuh anda mampu menyerap lebih banyak Malarone, dan menjadikan rawatan lebih berkesan. Tablet harus ditelan keseluruhannya. Adalah paling baik untuk memberikan Malarone pada waktu yang sama setiap hari.

Berapa lama perlu diambil
Teruskan mengambil Malarone untuk 7 hari selepas anda pulang ke tempat yang bebas malaria. Habiskan kursus rawatan penuh Malarone untuk mendapat perlindungan maksimum. Berhenti sebelum menghabiskannya akan menyebabkan anda berisiko dijangkiti malaria, ini kerana 7 hari diperlukan untuk memastikan parasit dalam darah anda yang dijangkiti melalui gigitan nyamuk telah mati. Jangan ambil Malarone lebih daripada 37 hari. Jika anda menjangkakan berada di sesuatu tempat terdapatnya malaria lebih daripada 28 hari, semak dengan doktor anda sebelum pergi. Malarone mungkin tidak sesuai untuk anda.

Jika terlupa mengambil
Adalah penting untuk anda mengambil siri rawatan penuh tablet Malarone .

Jangan risau jika anda terlupa mengambil satu dos. Ambil dos seterusnya serta-merta apabila anda teringat. Kemudian teruskan rawatan seperti sebelumnya.

Jangan mengambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor atau ahli farmasi untuk nasihat. Kalau boleh, tunjukkan mereka bungkus Malarone tersebut.

Semasa menggunakan Malarone
Perkara yang perlu dilakukan
Jika anda mengalami kesan sampingan yang serius, atau jika anda menyedari sebarang kesan sampingan yang tidak tersenarai di dalam risalah ini, beritahu doktor anda atau ahlifarmasi.

Perkara yang tidak boleh dilakukan
Ubat ini telah dipreskripsikan untuk kegunaan peribadi anda. Jangan berikan kepada orang lain – ubat ini mungkin membahayakan mereka walaupun simptom-simptom yang mereka alami sama seperti anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Lindungi diri anda daripada dijangkiti malaria

Sesiapa sahaja tidak kira umur, boleh dijangkiti malaria. Malaria adalah penyakit yang serius, tetapi boleh dicegah. Selain dari mengambil Malarone, adalah sangat penting untuk anda mengambil langkah-langkah untuk mengelak daripada digigit nyamuk.

- **Gunakan penghalau serangga pada permukaan kulit yang terdedah.**
- **Pakai pakaian berwarna cerah dan menutupi seluruh tubuh,** terutamanya selepas senja memandangkan inilah waktu nyamuk-nyamuk paling aktif.

Tidur di dalam bilik yang berpelindung atau di bawah kelambu yang dilapisi racun serangga.

Tutup tingkap dan pintu pada waktu senja, jika tidak berpelindung.

Racun serangga (lingkaran ubat nyamuk, ubat nyamuk semburan, ubat nyamuk elektrik) boleh juga digunakan untuk menghalau serangga dan menghalang nyamuk daripada masuk ke bilik.

Jika anda memerlukan nasihat lanjut, berbincanglah dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Malaria masih lagi boleh menjangkiti walaupun setelah anda mengambil langkah berjaga-jaga. Sesetengah jenis jangkitan malaria mengambil masa yang lama untuk menyebabkan simptom-simptom, maka penyakit mungkin tidak bermula sehingga beberapa, minggu atau bulan selepas pulang dari sesuatu tempat.

Jumpa doktor segera jika anda mempunyai simptom-simptom selepas pulang dari sesuatu tempat - seperti demam, sakit kepala, menggilir dan keletihan.

Memandu dan mengedalikan mesin

Jika anda rasa pening, jangan memandu. Malarone menyebabkan sesetengah orang terasa pening. Jika ini berlaku kepada anda, jangan memandu, mengendalikan mesin atau mengambil bahagian dalam mana-mana aktiviti yang boleh membahayakan diri anda.

Jika anda muntah:**Untuk mencegah malaria:**

- Jika anda muntah dalam masa 1 jam selepas mengambil Malarone , ambil satu lagi dos dengan segera.
- Adalah penting untuk mengambil kursus rawatan penuh Malarone . Jika anda memerlukan pil tambahan kerana muntah, anda mungkin memerlukan preskripsi lain.
- Jika anda muntah-muntah, adalah penting untuk mengenakan perlindungan tambahan, seperti bahan penghalau nyamuk dan kelambu. Malarone mungkin tidak begitu berkesan kerana jumlah Malarone yang diserap oleh tubuh adalah berkurangan.

Untuk merawat malaria:

- Jika anda mengalami muntah-muntah dan cirit-birit beritahu doktor anda. Anda akan memerlukan ujian darah yang tetap. Malarone mungkin tidak begitu berkesan, kerana jumlah yang diserap oleh tubuh adalah berkurangan. Ujian ini akan memeriksa samada parasit malaria sedang dikeluarkan dari darah anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubatan lain, Malarone boleh mengakibatkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya. Ambil perhatian terhadap tindakbalas teruk seperti berikut. Ia berlaku kepada sebilangan kecil pesakit, tetapi kekerapan sebenar tidak diketahui.

Tindakbalas alahan yang teruk – simptom-simptom termasuk:

- Ruam dan gatal-gatal
- Nafas yang berdehit secara tiba-tiba, sesak dada atau tekak atau susah bernafas
- Bengkak pada kelopak mata, muka, bibir, lidah atau bahagian badan lain.

Hubungi doktor serta merta jika anda mengalami mana-mana gejala ini. Berhenti mengambil Malarone .

Tindakbalas kulit yang teruk

- Ruam kulit, yang boleh menjadi lepuh dan kelihatan seperti kelompok kecil (bintik-bintik gelap di tengah, dikelilingi kawasan yang lebih pucat dengan lingkaran gelap di luarnya) (eritema multiforme)
- Ruam yang teruk merebak dengan lepuh dan kulit mengelupas, terjadi terutamanya di sekeliling mulut, hidung, mata dan alat kelamin (sindrom Stevens-Johnson)

Jika anda menyedari sebarang simptom-simptom yang tersebut, hubungi doktor dengan segera. Kebanyakan kesan sampingan lain yang dilaporkan adalah amat sederhana dan tidak kekal lama.

Kesan sampingan yang paling biasa berlaku

Ini boleh berlaku kepada lebih daripada 1 dalam 10 orang:

- Sakit kepala
- Rasa mual dan muntah
- Sakit perut
- Cirit-birit

Kesan sampingan yang biasa berlaku

Ini boleh berlaku kepada 1 dalam 10 orang:

- Pening
- Masalah tidur (insomnia)
- Mimpi aneh
- Kemurungan
- Hilang selera makan
- Demam
- Ruam yang mungkin gatal
- Batuk

Kesan sampingan yang biasa, yang mungkin dapat dilihat melalui ujian darah adalah:

- Sel darah merah berkurang (anemia) yang boleh mengakibatkan keletihan, sakit kepala dan sukar bernafas

- Sel darah putih berkurang (neutropenia) yang akan menjadikan anda lebih mudah terkena jangkitan

- Paras natrium dalam darah rendah (hiponatremia)
- Enzim hati meningkat

Kesan sampingan yang tidak biasa berlaku

Ini boleh terjadi kepada 1 dalam 100 orang:

- Keresahan
- Degupan jantung luarbiasa yang disedari (palpitasi)
- Mulut bengkak dan kemerahan
- Keguguran rambut

Kesan sampingan yang tidak biasa berlaku yang mungkin dapat dikesan melalui ujian darah:

- Tahap Amilase meningkat (sejenis enzim yang dikeluarkan oleh pankreas)

Kesan sampingan lain

Kesan sampingan lain pernah berlaku kepada sejumlah orang tetapi bilangan yang tepat tidak diketahui.

- Radang hati (hepatitis)
- Duktus hempedu tersumbat (kolestatis)
- Dengungan jantung meningkat (takikardia)
- Radang salur darah (vaskulitis) yang kelihatan seperti tompukan merah atau ungu yang timbul pada kulit, tetapi boleh memberi kesan pada bahagian badan yang lain
- Sawan
- Serangan cemas, menangis
- Melihat atau mendengar benda yang tidak wujud (halusinasi)
- Mimpi ngeri
- Ulser mulut
- Lepuh
- Kulit mengelupas
- Kulit lebih sensitif kepada cahaya matahari

Kesan sampingan lain, yang dapat dikesan melalui ujian darah:

- Bilangan semua jenis sel darah menurun (pansitopenia)

Jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi lebih serius atau mengganggu atau jika anda menyedari sebarang kesan sampingan yang tidak tersenarai di dalam risalah ini: Beritahu doktor atau ahli farmasi

Cara penyimpanan dan pelupusan Tablet Malarone

Jauhkan Malarone dari capaian dan penglihatan kanak-kanak. Jangan menggunakan Malarone selepas tarikh luput yang dicetak pada bungkusan. Simpan di bawah suhu 30°C. Jika anda mempunyai Malarone yang tidak diperlukan, jangan lupuskan dalam buangan air atau buangan sampah. Berikan semula kepada ahli farmasi anda yang akan melupuskannya dengan cara yang tidak membahayakan persekitaran.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Tablet Malarone adalah bulat, bersalut filem merah jambu terukir ‘GX CM3’ di dalam satu sisi. Malarone dibekalkan dalam bungkusan timbul mengandungi 12 biji.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif adalah 250mg atovaquone dan 100mg proguanil hydrochloride dalam setiap biji.

Bahan-bahan tidak aktif adalah: polyethylene glycol 8000, povidone K30, poloxamer 188, low substituted hydroxypropyl cellulose, warna merah jambu pekat OY-S-24972, magnesium stearat, macrogol 400, glikolat kanji natrium, ethanol, selulosa mikrokristalin.

Beritahu doktor anda, tanpa mengambil tablet Malarone, sekiranya ada kemungkinan

anda mempunyai alahan kepada mana-mana bahan di atas.

MAL20014470AR

Pengilang

GlaxoSmithKline Inc. 7333,
Mississauga Road North,
Mississauga, Ontario L5N 6L4m
Canada

Tarikh kemaskini RiMUP

16 April 2012